° 药剂与工艺 °

葛根芩连汤不同配伍对葛根素含量的影响

戴开金, 罗佳波, 谭晓梅, 吴昭晖*

(第一军医大学 中药制剂研究重点实验室, 广东 广州 510515)

摘要:目的 建立 HPLC 测定葛根芩连汤各配伍组合中葛根素含量的方法, 研究配伍对葛根素含量的影响。方法采用 $L_8(2^7)$ 正交设计及统计软件 SPSS 10.0 统计分析, 以 HPLC 测定葛根素的含量。结果 黄芩、黄连、甘草对方中葛根素含量的影响差异不存在显著性, 两两交互作用差异不具有显著性。实验中观察到凡是黄连与葛根的配伍组合中皆有沉淀产生, 并且发现沉淀中含有一定量的葛根素。结论 黄芩、黄连、甘草对葛根素的含量没有显著性影响。含黄连和葛根配伍煎液产生的沉淀中含葛根素可能与 pH 值的改变有关。

关键词: 葛根芩连汤; 配伍; 葛根素; 高效液相色谱

中图分类号: R283.2; R284.2; R286.02 文献标识码: A 文章编号: 0253-2670(2003)06-0506-03

Influence of various compatibilities on puerarin content in Gegen Qinlian Decoction

DAI Kai-jin, LUO Jia-bo, TAN Xiao-mei, WU Zhao-hui

(Key Laboratory of Pharmaceutical Research of TCM, First Military Medical University, Guangzhou 510515, China)

Abstract Object To set up the quantitative method for determining the puerarin in Gegen Qinlian Decoction (GQD) by RP-HPLC and to study the change of puerarin contents in various combinations of GQD. **Methods** $L_8(2^7)$ orthogonal design and statistic analysis (SPSS 10.0) were used, the puerarin contents in the samples were determined by HPLC. **Results** Influence of *Radix Scutellaria*, *Rhizoma Coptidis* and *Radix Glycyrrhizae Preparata* on the puerarin content in GQD was insignificant. And interactions between two of three were insignificant too. In this experiment, puerarin in the sedimentation was found in the compatible decoction of *Rhizoma Coptidis* and *Radix Puerariae*. **Conclusion** The puerarin content is not markedly influenced by *Radix Scutellaria*, *Rhizoma Coptidis* and *Radix Glycyrrhizae Preparata*. Maybe, the change of pH is relevant to the sedimentation in the compatible decoction contained *Rhizoma Coptidis* and *Radix Puerariae*.

Key words Gegen Qinlian Decoction (GQD); compatibility; puerarin; HPLC

葛根芩连汤由葛根、黄连、黄芩、甘草 4 味药组成, 出自《伤寒论·太阳篇》, 有解表清里、升清止利之功, 经过长期临床应用, 疗效显著。该方配伍对主要化学成分的影响研究报道较少, 本实验主要研究了配伍对葛根素含量的影响, 并对加入黄连和葛根所产生的沉淀物进行了分析, 为从事该方的研究提供一些参考资料。

1 仪器与试药

美国惠普 HP-1100 高效液相色谱仪, G1315A 紫外-可见光二级管阵列检测器; 410A 型 pH 计 (美国 ORION); 甲醇 (分析纯, 色谱纯), 乙腈 (色谱纯); 葛根素对照品 (中国药品生物制品检定所); 葛根、黄芩、黄连、甘草药材由广东省药材公司提供, 经本校中药鉴定教研室刘传明讲师鉴定, 分别为豆科植物野葛 *Pueraria lobata* Ohwi, 唇形科植物黄芩

Scutellaria baicalensis Georgi 干燥根茎, 毛茛科植物黄连 *Coptis chinensis* Franch. 干燥根茎, 豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch. 干燥根茎 (经蜜制)。

2 方法与结果

2.1 葛根芩连汤中葛根素含量测定方法的建立^[1,2]

2.1.1 色谱条件: 色谱柱: Zorbax SB-C₁₈ 柱 (250 mm × 4 mm, 5 μm); 流动相: 甲醇-乙腈-水 (12: 8: 80); 流速: 1.0 mL/min; 柱温: 室温; 检测波长: 250 nm 色谱图见图 1

2.1.2 标准曲线: 精密称取葛根素对照品约 10 mg, 置 50 mL 容量瓶中, 加流动相溶解, 定容制成对照品溶液。精确吸取溶液 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 mL 于 10 mL 容量瓶中, 用流动相定容。以浓度对峰面积进行线性回归, 得到方程: $Y = 38.7452X - 2.1845$,

* 收稿日期: 2002-09-23

基金项目: 国家自然科学基金面上重点项目 (39970886)

1-葛根素 2-葛根芩连汤 3-葛根芩连汤沉淀物 4-缺葛根阴性
 1-puerarin 2-GQD 3-GQD sedimentation
 4-sample without *Radix Puerariae*

图 1 HPLC 色谱图

Fig. 1 HPLC chromatograms

$r = 0.9999$ 结果表明葛根素在 $10.01 \sim 160.16 \mu\text{g/mL}$ 线性关系良好。

2.1.3 供试品溶液及缺葛根阴性液的制备^[3]: 按处方配比取葛根芩连汤各味药 (葛根 15 g, 黄芩 9 g, 黄连 9 g, 甘草 6 g) 饮片 3 份及缺葛根阴性 3 份, 加水 400 mL, 先煎葛根 20 min, 余药共煎 30 min, 煎两次, 趁热粗过滤, 合并滤液 90°C 定容至 1 000 mL, 取 10 mL, 放冷, 加甲醇 35 mL, 超声 10 min, 过滤, 用相同比例醇水溶液洗涤, 定容至 50 mL, 取 5 mL 水浴蒸干, 用流动相溶解, 定容至 10 mL, 膜过滤, 即得。每个样品进样 3 次, 测定, 计算得葛根素含量为 0.4283 g/剂 , RSD 为 2.02%。

2.1.4 精密度试验: 取葛根素对照品溶液重复进样 5 次, 葛根素峰面积的 $RSD = 0.62\%$ 。取全方样品液重复进样 5 次, 葛根素峰面积的 $RSD = 0.99\%$ 。结果表明, 精密度较好。

2.1.5 稳定性考察: 取葛根素对照品和样品液各一份, 在制备后 4, 8, 12, 16, 24 h 测定葛根素的浓度, 其 RSD 分别为 0.18%, 0.44%。结果表明在 24 h 内溶液稳定。

2.1.6 回收率试验: 精密量取缺葛根阴性液 10 mL, 置 50 mL 量瓶中, 加入葛根素对照品约 6 mg, 按 2.1.3 项下“加甲醇 35 mL……”起, 同法制得供试样品, 进样, 测定葛根素浓度, 计算回收率。求得平均回收率为 98.97%, $RSD = 0.53\%$ ($n = 4$)。

2.2 配伍对葛根芩连汤中葛根素含量的影响: 以黄芩、黄连、甘草为因素, 用药和不用药为水平, 采用 $L_8(2^3)$ 正交表设计试验, 因素水平及结果见表 1, 2。

采用 SPSS10.0 统计分析软件, 结果表明在 0.05 水平下, 黄连、黄芩、甘草对葛根素含量的影响差异无显著性 (P 值分别为 0.208 0.506 0.208), 且两两交互作用影响差异也不显著。

表 1 因素水平表

Table 1 Factors and levels of orthogonal design

水平	因素		
	A 黄芩	B 黄连	C 甘草
1	用药	用药	用药
2	不用药	不用药	不用药

表 2 $L_8(2^7)$ 正交设计及结果

Table 2 $L_8(2^7)$ orthogonal design and result

试验次数	A	B	A $\times$ B	C	A $\times$ C	B $\times$ C	空白	葛根素含量 / ($\text{g} \cdot \text{剂}^{-1}$)
1	1	1	1	1	1	1	1	0.4356
2	1	1	1	2	2	2	2	0.4371
3	1	2	2	1	1	2	2	0.4634
4	1	2	2	2	2	1	1	0.4508
5	2	1	2	1	2	1	2	0.4456
6	2	1	2	2	1	2	1	0.4466
7	2	2	1	1	2	2	1	0.4761
8	2	2	1	2	1	1	2	0.4406

2.3 含黄连、葛根煎液的 pH 值及沉淀物中葛根素的含量测定: 在实验过程中发现凡含黄连和葛根的各配伍均有沉淀产生, 故对沉淀进行考察。各配伍药液的煎法按 2.1.3 项下至“……合并滤液”, 滤液放冷, 离心, 用 pH 计测上清液 pH 值。沉淀用水洗 3 次, 60°C 干燥至恒重, 研细称重, 精确称取约 0.05 g, 甲醇 40 mL 超声提取 0.5 h, 过滤, 洗涤 3 次, 定容至 50 mL, 取 5 mL 吹干, 加流动相溶解, 定容至 10 mL, 微孔滤膜过滤, 测定, 结果见表 3。

表 3 配伍溶液 pH 值及沉淀中葛根素的含量

Table 3 pH of compatible decoctions and puerarin content in sedimentation

配伍组合	pH 值	葛根素含量 / ($\text{g} \cdot \text{剂}^{-1}$)
葛根	5.23	< 0.001
黄连	3.73	-
黄连+ 葛根	4.39	0.020
黄连+ 黄芩+ 葛根	4.36	0.029
黄连+ 葛根+ 甘草	4.15	0.072
葛根芩连汤	4.25	0.031

从表 3 可以看出, pH 值从低到高的顺序为: 黄连煎液的 pH 值 < 含黄连、葛根配伍煎液的 pH 值 < 葛根单煎液的 pH 值。含葛根与黄连配伍的煎液沉淀物中葛根素含量远大于葛根单煎液。

3 讨论

3.1 实验结果表明黄连与葛根合煎产生沉淀, 并且发现沉淀中含有一定量的葛根素, 约占煎液中葛根素总量的 5% ~ 20%。葛根素沉淀的原因可能是黄连的存在导致合煎液的 pH 值降低, 降低了葛根素的溶解度, 从而在较低温 (90°C 以下) 下析出。亦有可能是沉淀过程中的包含、夹带所致。产生沉淀的

机制及沉淀物中是否含有新的物质,该物质是否具有药理作用有待进一步的研究

3.2 本实验采用正交设计及统计软件对该方进行实验设计及分析,结果表明,在 0.05 水平下,黄芩、黄连、甘草对葛根素的含量的影响差异无显著性,说明黄芩、黄连、甘草在该汤中对葛根素的含量没有影响,但是由于黄连与葛根合煎能产生沉淀,因此在制剂过程中要加以注意

3.3 在本实验中所采用的高效液相色谱条件下,各配伍煎液中没有发现新物质的色谱峰

References

- [1] *Ch P* (中国药典) [S]. 2000 ed. Vol I
- [2] Wu Z H, Tan X M, Luo J B. Determination of puerarin in Gegen Qinlian Micropill by HPLC [J]. *Chin J Exp Tradit Med Form* (中国实验方剂学杂志), 1999, 5(6): 10-12
- [3] Fan B T. *Pharmacy of TCM* (中药药剂学) [M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Publishers, 1999.

止眩颗粒剂的提取工艺研究

文红梅¹,李伟¹,彭国平¹,朱荃¹,张正行^{2*}

(1. 南京中医药大学,江苏 南京 210029; 2 中国药科大学,江苏 南京 210009)

摘要:目的 优选止眩颗粒剂的制备工艺。方法 以 23-乙酰泽泻醇 B、白术内酯 I 提取率和固形物得率为指标,采用正交试验法对止眩颗粒剂的提取工艺进行优选,并以小鼠镇静作用的药效学验证。结果 优化工艺为:泽泻、白术先以 12 倍量 70% 乙醇分 2 次回流提取,每次 2 h;再以 14 倍量水分 2 次煎煮,每次 2 h。提取物对小鼠有明显的镇静作用。结论 该工艺合理,有效成分提取效率高。

关键词: 止眩颗粒剂;正交试验;23-乙酰泽泻醇 B;白术内酯 I;镇静作用

中图分类号: R284. 2; R286. 02; R286. 13 文献标识码: A 文章编号: 0253-2670(2003)06-0508-03

Study on extraction technology of Zhixuan Granula

WEN Hong-mei¹, LI Wei¹, PENG Guo-ping¹, ZHU Quan¹, ZHANG Zheng-xing²

(1. Nanjing University of TCM, Nanjing 210029, China; 2. China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China)

Abstract Object To optimize the preparation procedure for Zhixuan Granula (ZXG). **Methods**

The optimum extracting conditions of ZXG were selected by orthogonal test with the active components 23-acetate alisol B, atractylenolide I, and dried extract as the index, it mice sedation of ZXG was clarified by pharmacodynamics. **Results** The optimum preparation procedure was as follows: *Rhizoma Alismatis* and *Rhizoma Atractylodis Macrocephalae* were extracted with alcohol first, adding 12-fold 70% alcohol by refluxing, extracting twice, 2 h once, then extracted with water, adding 14-fold water, extracting twice, 2 h once. The extract showed the obvious effect on sedation of mice. **Conclusion** The optimum preparation procedure is reliable, with higher extracting ratio of the active components.

Key words Zhixuan Granula (ZXG); orthogonal test; 23-acetate alisol B; atractylenolide I; sedation

止眩颗粒剂处方源于《金匱要略》中的“泽泻汤”,由泽泻和白术两味中药组成。具利水除饮、健脾制水之功,用于饮停心下、头目眩晕、胸中痞满、咳逆水肿等症。由于泽泻中含有泽泻醇类物质,该类成分具有利水渗湿作用,与泽泻主要药效相吻合;白术中含有白术内酯类成分,该类成分与泽泻汤的健脾制水的功效相吻合。又考虑到两味药的水提液中富含多糖、氨基酸等成分。因此,本实验采用正交试验法设计先醇提再水煎工艺,以泽泻、白术的活性成分为

指标,再通过药效学试验验证,优化出泽泻、白术共煎的最佳工艺

1 实验材料

泽泻购于福建省药材公司,经本校中药鉴定教研室王春根教授鉴定,为泽泻科植物泽泻 *Alisma orientale* (Sam.) Juzep. 的干燥块茎。白术购于浙江省磐安县药材公司,经鉴定为菊科植物白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 的干燥根茎,符合《中华人民共和国药典》标准

* 收稿日期: 2002-12-13

基金项目: 国家中医药管理局青年基金项目 (97Y014)

作者简介: 文红梅 (1965-),女,山东蓬莱人,副教授,中国药科大学 2000 级博士生,从事药物分析研究。Tel (025) 6798188