白或变褐;转入新鲜继代培养在 25 ℃ 下培养 15 d 时,愈伤组织存活率仅 0.6%。在 B、C 条件下,愈伤组织生长较快,多为浅黄色的颗粒状愈伤组织,少数为白色或变褐,并生有少量的芽和不定根,转入 25 ℃ 下继代培养 15 d 时,愈伤组织存活率高达 78%,而散射光照对愈伤组织生长影响不大。

将在(12±3) ℃ 下培养 3 个月后的愈伤组织转入 25 ℃ 下培养,其生长和分化并没有显著变化。在(12±3) ℃ 下生长的培养物每次继代后,与对照(25 ℃ 下继代培养)相比有 30% 左右愈伤组织块死亡,但因在(12±3) ℃ 下愈伤组织仍在生长,故数量不断增加。采用降温保存组织培养物在一些植物中已取得成效^[3]。但不同植物材料降温保存的最适温度不同。实验表明,川西獐牙菜愈伤组织在低温下(12±3) ℃ 继代培养,可有效减少继代次数和所需的物质,有利于川西獐牙

菜在适宜季节大量再生植株。

a、b、c-分别为 A、B、C 条件下培养后的愈伤组织存活率

图 2 愈伤组织降温培养后的存活率

参考文献

- 1 向凤宁,等. 中草药,1996;27(8):492
- 2 Flick C E. Organogenesis In: Handbook of Plant Cell Culture, macmillan Co, New York, 1983:13
- 3 倪德祥译. 国外作物组织培养,1983;16:44

(1997-09-30 收稿)

海金沙的引种及栽培[△]

贵州省植物园(贵阳 550004) 魏德生* 曾莉莉 王用平 龙青 冯芳
贵州省理化测试分析研究中心 梁可

摘要 报道了海金沙的引种驯化、孢子繁殖、田间管理措施、产地加工等技术。

关键词 海金沙 引种驯化 孢子繁殖

海金沙 *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. 为海金沙科蕨类植物,又称左转藤,铁线藤、蛤蟆藤等。以孢子及全草入药^[1],具清热利湿功能,为治疗淋症要药^[2]。主产于广东、浙江、江苏、江西、湖南、湖北、广西、云南、四川、贵州、陕西、河南等省。多系野生,少有栽培。1995 年~1997 年,我们对海金沙进行了引种驯化研究,成功地进行了引种繁殖,掌握了孢子繁殖技术,现将结果报道如下。

1 植物学特征及生物学特性

海金沙为多年生草质藤本。根状茎横生,根须状,叶二型,纸质,不育叶尖三角形,能育叶卵状三角形,小羽片边缘着生流苏状的孢子囊穗,孢子成熟后,从孢子囊中散出,暗褐色,形如细沙。

海金沙在贵州全省分布,主产于罗甸、赤水等地。多生于路边、山坡灌丛、林缘、溪谷丛林中,常缠绕生长于其它较大型的植物上。喜

* Address: Wei Desheng, Guizhou Provincial Garden of Botany, Guiyang

△ 贵州省自然科学年度计划项目,编号(1995)2115 号

温暖湿润环境、空气相对湿度 60% 以上;喜散射光,忌阳光直射,喜排水良好的沙质壤土,为酸性土壤的指示植物^[3]。贵州罗甸分布区,海拔 440 m,年均温 19.6 ℃,1 月均温 10.1 ℃,7 月均温 27 ℃,年降水量 1 166 mm,无霜期 336 d,年日照时数 1 509 h,为亚热带温暖湿润气候。海金沙在低海拔、气候温暖地区能正常产生孢子,如罗甸、赤水(海拔 293 m、年均温 18.1 ℃)等地;在高海拔、较冷凉地区,如贵阳(海拔 1 070 m、年均温 15.3 ℃),孢子常不成熟。

2 繁殖方法

用分株和孢子繁殖。高海拔较冷凉地区多采用分株繁殖,因孢子常不成熟,低海拔、气候温暖、采用孢子繁殖。

2.1 分株繁殖:冬、春季,选择约 3 年~4 年生植株,挖出其横走横茎,剪成 10 cm 左右的小节,或按植株自然生产状,分成若干小丛,每丛具 3 节~5 节或 2 株~3 株小苗。剪去部分地上茎,种植于备好的植地上。植地可利用土层深厚,肥沃的山坡灌丛、林间或田边地角、或种植于围篱芭边,利用篱芭作为其攀援的支撑物。种植密度以行株距 1 m~1.5 m 为好,种植时每穴施土杂肥 1 kg,栽苗 1 丛,填土压实,浇透定根水即可。为经济利用土地,可先将分株苗栽于苗床上,仿株距 10 cm~15 cm,苗床上搭荫棚,培育 1 年后,再出圃移植。

2.2 孢子繁殖

2.2.1 孢子的采集:试验用孢子采自罗甸分布区的成熟孢子。9 月~11 月海金沙孢子相继成熟。孢子成熟后,将能育叶片分批剪下,装于硫酸纸袋内,封好口、放于通风干燥处,2 d~3 d 后,孢子从孢子囊中自然弹出掉入袋内,抖出叶片,立即播种。如不能立即播种,可装于试管或小广口瓶内,放于 4 ℃ 冰箱内保存至翌春播种。

2.2.2 播种基质的准备及处理:用过筛腐殖土拌 1/3 酸性过筛园土,装于 18 cm~20 cm 花盆内或播种箱内(自制),用手摇动,使盆土

稍紧实,平整,盆土至盆容量的 2/3 即可,然后放一层吸水纸(也可不放),用沸水浇透盆土,以杀死种子植物、苔藓、藻类、菌类及其它蕨类植物的孢子。用平板玻璃或塑料膜盖住盆口,以防其它杂物进入。

2.2.3 播种及管理:待盆土充分冷却后,将硫酸纸袋内的孢子均匀地播入盆内,播种量以基质上隐约可见褐色孢子(含囊壳)为限。播种后再用平板玻璃或塑料膜盖住盆口,以保湿和防止其它杂物进入。将播种盆放于无阳光直射而散射光充裕的地方培育。培育期内应经常保持一定的土壤湿度,可将盆放于浅水中浸润,也可用细孔喷壶小心喷淋。在温度 18 ℃~24 ℃ 时,15 d 左右可见到孢子萌发,见到丝状体,30 d~35 d 可见到绿色原叶体,继而发育为幼孢子体。此间应经常喷水保湿,以增加盆土湿润度和空气湿度,以原叶体表面具适当水雾为好。培育 5 月~6 月,根据苗势,便可分批移栽。

2.2.4 幼孢子体移栽:选择肥沃、疏松的沙质壤土、充分细碎,作成 1 m 宽的平畦或高畦,畦面放一层 5 cm 厚的过筛腐殖土,与表土拌匀。畦土应松软细碎,因幼孢子体根系非常细小,土壤颗粒太粗,会影响根系的固着。移栽前 10 d~15 d,将盆覆盖物逐步打开、以炼苗,使幼孢子体逐步适应外界环境。移栽时用小木棍或其它物在松软的畦面上划或压深约 1 cm~1.5 cm 的横沟,行距 10 cm~15 cm,用镊子将幼孢子体夹放于沟内,每隔 5 cm 放一小丛,用沟土使其稳正,用喷壶小心喷淋湿润。搭棚遮明,使透光度 60%~70%,培育 4 月~5 月,便可单株出圃移栽。

3 田间管理

3.1 中耕除草:幼苗期,植物生长缓慢,易滋生杂草,应适时中耕除草,保持地面疏松无杂草,为海金沙生长提供良好的生长条件。

3.2 设支柱:海金沙为攀援性植物,人工栽培应设支柱并引蔓上柱,使其攀援生长,增加光合营养面积。

3.3 施肥:冬、春二季应各施一道肥,每次每

株施 1 kg~2 kg 人畜粪水。冬春季植物萌发前剪去干枯植株,以利来年生长。

4 采收、产地加工与贮藏

立秋前后,孢子成熟时,选晴天清晨露水未干时,摘下孢子叶,放于衬有纸或布的管内,于避风处晒干,然后轻轻搓揉、抖动,使孢子弹出,再用细筛筛出叶片即得孢子(海金沙);采收金沙藤可从地面割下茎叶,用铡刀或剪刀剪成 2 cm~3 cm 长的短节,晒干或烘干即可。

干品金沙藤打包存放于通风干燥处,注意防潮、霉变;海金沙(孢子)装于罐或塑料袋内,置于通风干燥处。

参考文献

- 1 全国中草药汇编编写组. 全国中草药汇编. 上册. 北京:人民卫生出版社,1983:646
- 2 崔树德. 中药大全. 哈尔滨:黑龙江科技出版社,1989
- 3 邵莉楣,等. 观赏蕨类的栽培与用途. 北京:金盾出版社,1994:70

(1998-03-01 收稿)

升麻与腺毛马蓝的比较鉴别研究

贵州遵义市红花岗区药品监督检验所(563000) 董 书*

摘 要 报道了升麻和腺毛马蓝的比较鉴别,明确指出了相同点和不同点。

关键词 升麻 腺毛马蓝 绿升麻

升麻系临床常用中药,也是容易出问题的中药。正品升麻为毛茛科植物大三叶升麻 *Cimicifuga heracleifolia* Kom.、兴安升麻 *C. dahurica* (Turcz.) Maxim. 或升麻 *C. foetida* L. 的干燥根茎。我们在工作中多次发现不能将升麻与爵床科植物腺毛马蓝 *Strobilanthes forrestii* Didls 的干燥根茎正确区分的情况,为此,我们就两者在鉴别特征上作了比较研究,为真伪鉴别提供了依据。

1 药材性状鉴别

1.1 外形:药典描述升麻“为不规则的长形块状,多分枝,呈结节状,长 10 cm~20 cm,直径 2 cm~4cm”^[1]。文献^[2]记载“腺毛马蓝呈不规则长形块状或 2 分枝~3 分枝的结节状,长 5 cm~10 cm,直径 0.8 cm~2 cm”。实际情况有比升麻大的腺毛马蓝。

药典描述升麻表面“粗糙不平,有坚硬的细须根残留,上面有数个圆形空洞的茎基痕,

洞内壁显网状沟纹;下面凹凸不平,具须根痕。”升麻茎基内壁显网状沟纹;腺毛马蓝茎基内壁不显网状沟纹。另外,对样品的观察结果:正品升麻断面遍布裂隙或呈网络状,皮厚约 0.5 mm,而腺毛马蓝结构致密,皮部厚薄不等,厚 1 mm~2 mm,两者区别明显。

1.2 颜色:升麻的外表颜色为黑褐色或棕褐色^[1],腺毛马蓝的颜色为灰褐色^[2],另外,也见到外表颜色为黑褐色的腺毛马蓝。文献记载腺毛马蓝“皮部深蓝色,木部灰蓝色或灰白色,髓部灰白色柔软”^[2]。另外,也见到有的标本除髓部灰蓝色外,其余部分均显灰黄色、纤维化。正品升麻断面有裂隙、纤维化,黄绿色或淡黄白色。

2 显微鉴别

2.1 取腺毛马蓝饮片置于 10 mm×150 mm 试管中,加 5% KOH 溶液适量,加热至玻璃棒挤压能离散为度,倾去碱液,水洗后供用。

* Address: Dong Shu, Honghuagang Institute for Drug Control, Zunyi

董 书 1985 年于贵阳中医学院中药系毕业,获学士学位。从事药品监督检验工作至今。现任主管中药师。