

H. C. Fu, 叶为长三角形或披针状三角形, 质厚, 下面疏被腺点及短毛, 叶柄具翅; 总苞较狭窄。硬
叶乌苏凤毛菊 var. *frima* kitag., 叶枝后密, 下面无毛, 疏被蛛丝状毛以致密被棉毛, 呈灰白色)

- 26(21). 基生叶或茎下部叶基部楔形, 圆形或截形。
27(28). 总苞片顶端长尾状渐尖, 反卷; 叶质薄 14. 山凤毛菊 *S. umbrosa*
28(27). 总苞片顶端尖或钝, 不反卷。
29(30). 叶下面绿色或灰绿色, 无毛或近无毛 15. 小花凤毛菊 *S. parviflora*.
30(29). 叶下面被白色毡毛或灰白色蛛丝状毛。
31(32). 茎中部叶披形或条状披针形, 总苞宽 8~15 mm 16. 龙江凤毛菊 *S. amurensis*
32(31). 茎中部叶椭圆形或矩圆状椭圆形; 总苞宽 4~5 mm
..... 17. 蚤汗凤毛菊 *S. alpina* var. *manhanschanensis*

4 小结与讨论

4.1 内蒙古凤毛菊属药用植物资源丰富。贮藏量在千吨以上。做药用的有 16 种 7 变种。目前尚未做为商品收购使用, 仍自采自用, 或部分种做为牧草被啃食。鉴于药用资源初步调查清楚, 可以有计划地加以利用。做兽药更有意义。

4.2 凤毛菊属植物含有愈创木内酯型化合物, 大多味苦。因此, 在进行化学和药理工作时, 可以首先选取影响牧草质量, 贮藏量大的种, 如 *S. runcinata*, *S. laciniata*, *S. amara*, *S. japonica*, *S. nivea*, *S. parviflora* 等。同时, 在蜜源植物作保健品方面, 也是资源开发的途径之一。

4.3 内蒙古凤毛菊亚属植物在草原和沙漠边缘遍布, 对这一带的环境影响有利的方面在于防风、固沙、消碱, 不利方面是影响牧草质量。对其生态的研究也有重要的现实意义, 这样使得在药用开发、饮料评价和环境保护统筹兼顾。

参 考 文 献

1 S. Lipschitz Genus Saussurea D C. (Asteraceae). Lenipoli. 1979
2 马毓朱主编. 内蒙古植物志. 第六卷. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 1982: 227
3 朱亚民主编. 内蒙古植物志. 第三卷. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 1989: 301
4 中华人民共和国卫生部药典委员会编. 中华人民共和国卫生部药品标准(藏药). 第一册. 1995: 123
(1998-11-09 收稿)

蒙药材巴沙嘎的本草考证

内蒙古医学院蒙药系(通辽 028041)	布日额*
内蒙古兴安盟残疾人蒙医学校	浩比斯嘎拉图
内蒙古哲盟查全台农场卫生院	包国材

摘 要 我国蒙药资源十分丰富。目前已查实资料统计, 有植物药千余种。由于同名异物, 同物异名之故, 蒙药品种较为混乱。“巴沙嘎”仅是其中之一。本文对“巴沙嘎”进行了本草考证, 使之逐步正本清源, 名实相符。

关键词 巴沙嘎 同名异物 同物异名 本草考证

* Address: Bu Ri-e, Department of Mongolian Drug, Inner Monglia College of Traditional Mongolian Medicine, Tongliao
布日额 男, 1987 年 7 月毕业于内蒙古师范大学生物系。1995~1997 年参加内蒙古自学考试内蒙古医学院蒙医专业毕业。现任内蒙古蒙医学院蒙药系药用植物教研室主任, 讲师。内蒙古植物学青年工作者学会理事。从事药用植物学的教学和科研工作。主持研究的《鄂尔多斯毕日羊古的生药研究》在首届中国民族医药国际研讨会上交流并获一等奖, 《鄂温克民间药霞日毛都的生药研究》被收入《中国中医药最新研创大全》并荣获一等奖。著有《药用植物学》等 4 种著作, 约 50 万字。撰写 55 篇论文在省级以上刊物发表。

A Textual Research on Materia Medica of the Mongolian Medicine-Bashaga

Bu Ri'e, Haobisigalatu and Bao Guocai (Department of Mongolian Drug, Inner Mongolia College of Traditional Mongolian Medicine, Tongliao 028041)

Abstract Mongolian folk medicine were rich in their resources. According to a recent survey, medicinal plants in Mongolia may amount to thousands. But due to lack of toxonomic study, many herbal medicines may be designated by the same name whereas another single herb may have several synonyms. A textual study with reference to the classical treatise "Compendium of Materia Medica" compiled by Li Shizhen of Ming Dynasty (16th century), was carried out on Bashaga, one of the above mentioned Mongolian folk medicine. The result of the study was presented herewith.

Key words Bashaga textual study "Compendium of Materia Medica" of Ming Dynasty

巴沙嘎是蒙医常用药材之一。味苦,性寒。具有凉血,止刺痛,解毒之功效;临床上用于治疗血热、血刺痛、肝热、“宝日”、痧症、产褥热等疾病的方剂中。

1 据历史文献考

由于历代蒙、藏医籍所载有异,各地蒙医所用巴沙嘎原植物种类繁多,其中有蔷薇科植物仙鹤草 *Agrimonia pibosa* Ledeb. 柴胡 *Bupleurum* spp.; 杜鹃花科植物羊躑躅 *Rhododendron molle* (Bl.) G. Don; 爵床科植物鸭嘴花 *Adhatoda vasica* Nees; 金丝桃科植物长柱金丝桃 *Hypericum chinense* L.; 唇形科植物三花青兰 *Dracocephalum coerulescens* (Maxim.) Dum.; 紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt; 水棘针 *Amethystea caerulea* L.; 黄花黄芩 *Scutellaria aicalensis* Georgi; 石竹科植物石竹 *Dianthus chinensis* L.; 瞿麦 *D. superbus* L.; 女娄菜 *Melandrium apricum* (Turcz.) Rohrb.; 玄参科植物纤毛婆婆纳 *Veronica ciliata* Fisch. 毛果婆婆纳 *V. eriogyne* H. Winkl. 大花婆婆纳 *V. himalensis* D. Don. 两裂婆婆纳 *V. biloba* L. 小婆婆纳 *V. serpyllifolia* L. 绵毛婆婆纳 *V. lanuginosa* Benth. et Hook. f. 齿叶草 *Odontites serotina* Beich; 罂粟科植物少花紫堇 *Corydalis pauciflora* Pers. 蛇果紫堇 *C. ophiocarpa* Hook. f. et Thoms. 小黄堇 *C. raddeana* Regel. 直立紫堇 *C. stricta* Steph. ex DC. 西伯利亚紫堇 *C. sibirica* Maxim.、

翠雀状紫堇 *C. delphinoides* Fedde 等 8 科 25 种^[1]。来源较为混乱,严重影响临床疗效。为正本清源,据有关蒙、藏医籍,对巴沙嘎原植物作了考证。

《晶珠本草》^[2]记载:“植株形状如沙棘树;茎空有髓,分枝处如鸟爪,有节;花黄白色,聚生顶端,白、红、蓝 3 种为佳品,但藏地不产。次品产于藏地,茎叶似香薷,花黄色或蓝色,亦有佳次之分;或叶花状如糖果紫堇,但花黄色,茎方形,较长,味苦,叶茎断面放射状。不产巴沙嘎地方可代用”。据罗达尚考^[3]:“《四部医典》的彩色挂图中的“巴沙嘎”是木本植物,枝粗短,节膨大,叶片大而对生”。《无误蒙药鉴》曰:“巴沙嘎茎、叶大,似沙棘幼枝,茎空,分枝处如鸟爪,有节,花灰黄、灰红、蓝 3 色”。“产于西藏的茎、叶似香薷,花黄、蓝两种或白、红、蓝 3 种。据让均多吉日:不产巴沙嘎地方的代用品具清热;叶花状如糖果紫堇,但花黄色,茎方形较长,味苦,茎叶断面放射状”^[4]。《认药白晶鉴》载:“巴沙嘎生于山谷草地,茎、叶大,茎心疏松,节处似鸟爪,花黄色,味苦,其中花白、红、蓝者为佳品;生于西藏等地茎叶似香薷,具黄、蓝色花者次品”^[5]。《迪庆藏药》载巴沙嘎正品为鸭嘴花 *Adhatoda vasica* Nees, 并在“注”栏载:“《正确认药图鉴》本条附图注汉文“闹杨花”,《格西曲札藏文辞典》汉注即据之。《藏汉大辞典》、甘肃版《藏汉词典》均作绵毛婆婆纳,其实这也是缺正品时的代用品”^[6]。

2 讨论

根据《四部医典》的彩色挂图和《晶珠本草》、《无误蒙药鉴》、《迪庆藏药》的记载考证,巴沙嘎正品为鸭嘴花 *Adhatoda vasica* Nees., 其余无疑不是正品。因为这些都是草本,其中,羊蹄躅虽为灌木,但无苦味,其枝节不膨大,其根据考证如下:

鸭嘴花其形态特征与《晶珠本草》、《无误蒙药鉴》记载相似;鸭嘴花系灌木,高 2~3 m,枝有节,节膨大,茎、枝有髓。叶对生,革质。花序穗状,集生枝顶;花白色,冠上有紫色纹理,枝味苦。与《四部医典》的彩色挂图相符:即叶对生,大而厚,枝有节,节膨大。来源相符,据罗达尚载:“西藏拉萨、云南迪庆保存的巴沙嘎正品经鉴定为鸭嘴花的枝,味极苦。语言相近,鸭嘴花在印度语、孟加拉语、梵语中称“vasaka”,梵语又称:“vasika”,拉丁植物名称种加词“vasica”是由上述语言“vasika”音译而来。而藏语“哇沙嘎”、蒙语“巴沙嘎”也据此音译的谐音得名。

从上述考证,“巴沙嘎”正品原植物应是鸭嘴花,而本种植物虽为内蒙不产,但我国云南、广东、广西均有分布。

关于《内蒙古蒙药材标准》^[7]中“巴沙嘎”正品原植物定名为石竹科植物石竹 *Dianthus chinensis* L.、瞿麦 *D. superbus* L. 的根据考证为:石竹、瞿麦的形态特征与《认药白晶鉴》记载相似;均为草本植物,节明显,略膨大,断面中空,花棕紫色或棕黄色。《无误蒙药鉴》记载的虽为木本植物,但其附图为草本植物,图与

石竹、瞿麦极为相似。性味、功效上与鸭嘴花相同,味苦,性寒。名称的语音相似,均为“vasika”的音译的谐音得名。历代蒙医自采自用的“巴沙嘎”均为草本植物,疗效确切可靠。据此,《内蒙古蒙药材标准》把“巴沙嘎”正品植物定名为石竹、瞿麦是有一定的依据,况且本 2 种植物在内蒙广布,足以满足蒙医之需。

据《晶珠本草》、《迪庆藏药》考,玄参科婆婆纳属(*Veronica*)植物、瞿粟科紫堇属(*Corydalis*)植物均为巴沙嘎的代用品。据考,羊蹄躅、女娄菜、长柱金丝桃、紫苏、仙鹤草虽味苦,但性温。三花青兰、水棘针、黄花黄芩虽味苦、性寒,但形态特征、功效等与本草记载不符。齿叶草蒙名为“宝日巴沙嘎”,羊蹄躅别名为“闹杨花”,由于同名异物,异物同名之故,误认为“巴沙嘎”。这些药物虽也有清热之效,但临床应用各有异同,为保证用药安全有效,应加以区别。

参考文献

- 1 内蒙古蒙医学会. 蒙医学术论文集(2). 北京:民族出版社,1990:205
- 2 帝玛尔·丹增平措. 晶珠本草. 上海:上海科技出版社,1986:82
- 3 罗达尚,等. 中草药,1985,(12):31
- 4 占布拉通尔吉. 无误蒙药鉴. 呼和浩特:内蒙古人民出版社,1988:164
- 5 伊西巴拉珠尔. 认药白晶(内部版). 锡林浩特蒙医研究所,1986:73
- 6 杨竞生,等. 迪庆藏药. 昆明:云南民族出版社,1987:186
- 7 内蒙古卫生厅. 内蒙古蒙药材标准. 赤峰:内蒙古科技出版社,1987:170

(1998-12-14 收稿)

《中国药学文摘》是我国唯一的药学科技文献综合性检索类刊物(月刊,刊号为 CN11-2529)。本刊的特点是收载我国公开发行的药学杂志,地方医药杂志,医药大专院校学报,植物、微生物、化学化工杂志、专利等近 500 种刊物中有关中西药理论、综述,药物的科研、生产技术、制剂、分析、药理、临床应用,药品评价,药品生产管理和质量管理,制药设备和工厂设计,新药介绍等文献。并同时建有近 24 万多条的文献数据库,其中中药文献占一半左右,所以该库也是世界上拥有中药文献最多的数据库。通过十几年来对外检索服务,受到了广大医药工作者的普遍欢迎。该库每年可为医药生产、科研、交流、教学、医院、情报研究等部门提供 2 万多条数据,并可提供网络版和光盘版。联系地址:北京西城区北礼士路甲 38 号国家药品监督管理局信息中心,邮编:100810 电话:(010)68350889 或 68311976 转编辑部