小檗碱对兔血脂代谢及维生素 D 受体和胰岛素诱导基因 2 基因表达的影响

罗 映, 金 磊, 何 琦, 周岐新, 杨俊霞*

重庆医科大学 药理学教研室 重庆市生物化学与分子药理学重点实验室, 重庆 400016

摘要: 目的 研究小檗碱对高脂模型兔血脂代谢的影响, 并探讨其调血脂作用是否与维生素 D 受体 (vitamin D receptor, VDR)、胰岛素诱导基因 2 (insulin-induced gene 2, Insig-2) 的表达变化有关。方法 雄性新西兰大耳白兔 40 只随机分为对照组、模型组、阳性药非诺贝特 (30 mg/kg) 组和小檗碱低、高剂量 (28、112 mg/kg) 组。兔喂饲高脂饲料 8 周建立高脂模型, 给药 8 周后测定各组兔血清中总胆固醇 (TC)、三酰甘油 (TG)、低密度脂蛋白-胆固醇 (LDL-C)、高密度脂蛋白-胆固醇 (HDL-C)、载脂蛋白 A1 (ApoA1)、载脂蛋白 B (ApoB) 和脂蛋白 a (LPa) 等指标的水平。RT-PCR 法检测脂肪组织中 VDR 和 Insig-2 基因表达的变化。结果 与对照组比较, 模型组兔血清 TC、TG、LDL-C、ApoB 及 LPa 水平明显升高 ($P < 0.05$), 而 ApoA1 水平则明显降低 ($P < 0.05$); 经小檗碱处理后, 兔血清中 TC、TG、LDL-C、ApoB 及 LPa 的水平较模型组显著降低 ($P < 0.05$), 同时 ApoA1 水平则明显升高 ($P < 0.05$); RT-PCR 检测结果显示, 小檗碱干预后兔脂肪组织中 VDR、Insig-2 mRNA 的表达较模型组显著升高 ($P < 0.05$), 且低剂量小檗碱的效果更明显。结论 小檗碱具有明显的调血脂作用, 其机制可能是通过上调脂肪组织 VDR 和 Insig-2 mRNA 表达来实现的。

关键词: 小檗碱; 调血脂; 维生素 D 受体; 胰岛素诱导因子 2; 基因表达

中图分类号: R285.5; R972.6 文献标志码: A 文章编号: 0253 - 2670(2011)08 - 1566 - 05

Effects of berberine on lipid metabolism and vitamin D receptor as well as insulin-induced gene 2 gene expression of rabbits

LUO Ying, JIN Lei, HE Qi, ZHOU Qi-xin, YANG Jun-xia

Department of Pharmacology, Chongqing Key Laboratory of Biochemistry and Molecular Pharmacology, Chongqing Medical University, Chongqing 400016, China

Abstract: Objective To investigate the effects of berberine on lipids metabolism of hyper-lipidemic rabbits and to explore whether its mechanism was involved in the vitamin D receptor (VDR) gene and insulin-induced gene 2 (Insig-2) gene expressions in adipose. **Methods** Forty male New Zealand white rabbits were randomly divided into five groups: normal diet (ND), high-fat diet (HFD); high-fat diet + pretreatments of either Fenofibrate (30 mg/kg) or berberine low dose (28 mg/kg, BLD), and berberine high dose (112 mg/kg, BHD) groups. The serum TC, TG, LDL-C, HDL-C, ApoA1, ApoB, and LPa in each different treated rabbit group were determined after 8-week administration. The mRNA expressions of VDR and Insig-2 in adipose tissue were quantified by RT-PCR. **Results** Compared with normal diet group, the serum TC, TG, LDL-C, ApoB, and LPa in high fat diet group obviously elevated ($P < 0.05$), while ApoA1 obviously descend ($P < 0.05$). Compared with the high fat diet group, the levels of serum TC, TG, LDL-C, ApoB, and LPa in berberine treated group were significantly decreased ($P < 0.05$), while ApoA1 was elevated obviously ($P < 0.05$). The result of RT-PCR demonstrated that the mRNA expressions of VDR and Insig-2 in high fat diet group were significantly higher than those of the normal diet group ($P < 0.05$), and the VDR and Insig-2 mRNA expressions were significantly up-regulated by berberine ($P < 0.05$), especially in BLD. **Conclusion** Berberine could significantly decrease the levels of blood lipids of the hyperlipidemic rabbits, the mechanism may be related to elevating the expressions of VDR and Insig-2 gene.

Key words: berberine; hypolipidemic; vitamin D receptor (VDR); insulin-induced gene 2 (Insig-2); gene expression

小檗碱 (berberine) 是毛茛科植物黄连 *Coptis Chinensis* Franch. 中的主要有效成分, 为异喹啉类

生物碱, 又名黄连素, 多年来临床上一直作为清热解毒和抗感染药, 用于治疗肠道感染。近年来, 随

收稿日期: 2010-10-23

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (30600812)

作者简介: 罗 映 (1977—), 女, 重庆人, 讲师, 硕士研究生, 主要从事中药药理学与神经药理学研究。

Tel: 13330258173 E-mail: wolying@yahoo.com.cn

*通讯作者 杨俊霞 Tel: (023)68485070 E-mail: yangjunxia1234@126.com

着医学的不断发展和药理研究的不断深入,小檗碱的多种药理作用被揭示出来,如抗菌、抗肿瘤、抗心律失常、扩张冠状血管、调血脂^[1]、降血糖^[2]、改善胰岛素抵抗^[3]、神经保护^[4]、抗肿瘤^[5-6]、改善充血性心力衰竭等。小檗碱在调节血脂代谢方面被广泛研究,但其作用机制目前尚未完全明了。本实验通过研究小檗碱对高脂血症兔血脂及血清中载脂蛋白 A1 (apolipoprotein A, ApoA1) 和载脂蛋白 B (apolipoprotein B, ApoB)、脂蛋白 a (lipoprotein a, Lp(a)) 的影响以及脂肪组织维生素 D 受体(vitamin D receptor, VDR) 基因、胰岛素诱导基因 2 (insulin-induced gene 2, Insig-2) mRNA 表达水平的变化,深入研究小檗碱调节血脂的作用机制。

1 材料与方法

1.1 动物

清洁级新西兰大耳白兔 40 只,雄性,体质量 2.0~2.2 kg,由重庆医科大学实验动物中心提供,医学动物合格证号:SCXK(渝)2007-0003。

1.2 药品与试剂

小檗碱购于四川鸿鸣植物制品有限公司,质量分数 $\geq 97\%$,批号 080626;非诺贝特购于河南开封制药有限公司,质量分数 $\geq 98\%$,批号 080527;RNA 提取试剂 RNAiso Plus 与荧光 RT-PCR 试剂盒购于 TaKaRa 公司;PCR 引物由上海生工生物有限公司设计并合成。ApoA1 和 ApoB 测定试剂盒购于浙江伊利康生物技术有限公司。

1.3 分组及模型制备^[7]

新西兰大耳白兔 40 只,单笼饲养,自由摄食及饮水。以基础饲料适应性喂养 1 周后,随机选取 8 只作为对照组,以基础饲料喂养;其余 32 只给予高脂饲料(每 10 kg 基础饲料添加 150 g 胆固醇、500 g 猪油、1 kg 鸡蛋)喂养。高脂饲料喂养 8 周后随机分为 4 组(每组 8 只):模型组,以高脂饲料喂养;阳性药非诺贝特组,喂饲高脂饲料,ig 给予非诺贝特 30 mg/(kg·d);小檗碱低、高剂量组喂饲高脂饲料,分别 ig 给予小檗碱 28、112 mg/(kg·d)^[7]。各组继续喂养 8 周。实验中每周称动物体质量 1 次。

1.4 生化指标的检测

于实验第 16 周末,兔禁食 12 h 后,耳缘静脉取血,立即分离血清,测定血清总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白-胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白-胆固醇(HDL-C)、ApoA1、ApoB、Lp(a)水平。TC、TG、LDL-C、HDL-C、ApoA1、

ApoB 均采用奥林巴斯 AU-400 全自动生化分析仪检测。Lp(a)采用酶联免疫法测定,按说明书方法进行。

1.5 RT-PCR 法检测脂肪组织 VDR 和 Insig-2 基因表达

取兔肾周脂肪组织在液氮下研磨,按 RNAiso Plus 试剂说明书抽提总 RNA,利用紫外分光光度计定量并计算 A_{260}/A_{280} 值,用琼脂糖凝胶电泳检测其质量以确保 RNA 的完整性。反转录体系组成为:5×PrimeScriptTM 缓冲液 2 μL,PrimeScriptTM 逆转录酶 I 0.5 μL,Oligo dT 引物 0.5 μL,随机引物 0.5 μL,总 RNA 2 μL(300 ng),用无 RNase 酶水补足至 10 μL,混匀。反转录条件为:37 °C,15 min;85 °C,5 s 终止反应。VDR 基因上游引物:5'-CTGACGGATGAGGAGGTGC-3',下游引物:5'-GTAGGGTCGTAGGTCTTGTGG-3';Insig-2 基因上游引物:5'-TGGACTGTGGTGGACTTT-3',下游引物:5'-TGTTCCCATTTGTTATGC-3';内参 β-actin 基因上游引物:5'-CGAGATCGTGCGGGAC-AT-3',下游引物:5'-AGGAAGGAGGGCTGGAA-CA-3'。PCR 反应体系(25 μL)为:SYBR Rmix Ex TaqTM II 12.5 μL,上下游引物(10 μmol/L)各 1 μL,cDNA 2 μL,灭菌蒸馏水 8.5 μL,混匀。IQ5 实时 PCR 检测系统(美国 Biorad)扩增,反应条件为:95 °C,预变性 5 s;95 °C,5 s;55 °C,30 s;72 °C,30 s;循环 40 次。反应结束后自动生成溶解曲线,结果以 Ct 值表示。相对定量采用比较 Ct 值法,以公式 $F=2^{-\Delta\Delta Ct}$ 来计算各处理组和普通饲料组之间目的基因的表达差异。

1.6 统计学处理

数据用 $\bar{x} \pm s$ 表示,采用 SPSS 13.0 软件进行统计分析,先进行单因素方差分析,多组间差异两两相关比较用 SNK 检验。

2 结果

2.1 小檗碱对高脂模型兔血清 TC、TG、LDL-C、HDL-C 的影响

由表 1 可见,摄食高脂饲料 16 周末,模型组兔 TC、TG、LDL-C 水平均显著高于对照组($P < 0.05$),而 HDL-C 变化不明显,表明高脂模型复制成功。与模型组相比,低剂量小檗碱组兔血清 TC、TG、LDL-C 水平均显著降低($P < 0.05$),而非诺贝特组和小檗碱高剂量组仅 TG 水平显著降低($P < 0.05$)。

2.2 小檗碱对高脂模型兔血清 ApoA1、ApoB、Lp(a)的影响

由表 2 可见, 与对照组比较, 模型组兔血清 ApoA1 显著降低 ($P<0.05$), ApoB、LPa 显著升高 ($P<0.05$)。与模型组比较, 小檗碱低、高剂量均能显著提高血清中 ApoA1 水平 ($P<0.05$), 非诺贝特

组 ApoA1 水平也显著升高 ($P<0.05$); 小檗碱低剂量还显著降低血清中 ApoB 和 LPa 水平 ($P<0.05$), 而高剂量小檗碱与非诺贝特对这 2 个指标的影响不如低剂量小檗碱明显。

表 1 小檗碱对高脂模型兔血脂的影响 ($\bar{x} \pm s, n = 8$)

Table 1 Effects of berberine on blood lipid of hyperlipidemic rabbits ($\bar{x} \pm s, n = 8$)

组别	剂量/(mg·kg ⁻¹)	TC/(mmol·L ⁻¹)	TG/(mmol·L ⁻¹)	LDL-C/(mmol·L ⁻¹)	HDL-C/(mmol·L ⁻¹)
对照	—	1.06±0.23	0.31±0.05	0.73±0.21	0.25±0.13
模型	—	43.72±1.04*	9.83±0.78*	41.86±1.01*	0.27±0.15
小檗碱	28	36.23±0.64#	1.45±1.00#	35.65±0.78#	0.27±0.15
	112	43.06±1.11	3.97±0.56#	41.37±1.12	0.36±0.15
非诺贝特	30	42.07±1.14	4.00±0.59#	41.00±1.13	0.30±0.14

与对照组比较: * $P<0.05$ 与模型组比较: # $P<0.05$, 表 2 同
* $P<0.05$ vs control group # $P<0.05$ vs model group, table 2 is same

表 2 小檗碱对高脂模型兔血清中 ApoA1、ApoB 及 LPa 水平的影响 ($\bar{x} \pm s, n = 8$)

Table 2 Effects of berberine on ApoA1, ApoB, and LPa in serum of hyperlipidemic rabbits ($\bar{x} \pm s, n = 8$)

组别	剂量/(mg·kg ⁻¹)	ApoA1/(mmol·L ⁻¹)	ApoB/(mmol·L ⁻¹)	LPa/(mmol·L ⁻¹)
对照	—	0.11±0.01	0.05±0.02	2.02±0.22
模型	—	0.08±0.03*	0.46±0.13*	2.63±0.34*
小檗碱	28	0.14±0.03#	0.32±0.06#	2.24±0.15#
	112	0.15±0.04#	0.44±0.10	2.48±0.26
非诺贝特	30	0.16±0.02#	0.41±0.11	2.37±0.37

2.3 小檗碱对高脂模型兔脂肪组织 VDR 和 Insig-2 mRNA 表达的影响

以对照组 VDR 和 Insig-2 mRNA 表达水平为 1 进行比较, 模型组 VDR mRNA 表达显著高于对照组 ($P<0.05$); 而非诺贝特组、小檗碱低剂量组 VDR mRNA 水平均显著高于模型组 ($P<0.05$), 小檗碱高剂量组 VDR mRNA 水平与模型组比较无显著差异。模型组 Insig-2 mRNA 表达显著高于对照组 ($P<0.05$); 而非诺贝特、小檗碱低剂量组 Insig-2 mRNA 水平均显著高于模型组 ($P<0.05$), 小檗碱高剂量组 Insig-2 mRNA 水平与模型组比较无显著变化。结果见图 1。

3 讨论

小檗碱调血脂功效备受关注, 但作用机制仍不清楚, 目前研究主要集中在其促进低密度脂蛋白受体 (LDL-R) 的表达方面^[8]。本实验以新西兰大耳白兔为研究对象, 采用喂饲高脂饲料的方法制备高脂模型, 给予阳性药非诺贝特和高、低剂量小檗碱干预, 通过测定家兔血清中 TC、TG、LDL-C、HDL-C、ApoA1、ApoB、LPa 的量来观察小檗碱的调血脂作用。

与对照组比较: * $P<0.05$ 与模型组比较: # $P<0.05$
* $P<0.05$ vs control group # $P<0.05$ vs model group

图 1 小檗碱对高脂模型兔脂肪组织 VDR 和 Insig-2 mRNA 表达的影响 ($\bar{x} \pm s, n = 8$)

Fig. 1 Effects of berberine on VDR and Insig-2 mRNA expression in adipose tissue of hyperlipidemic rabbits ($\bar{x} \pm s, n = 8$)

ApoA1 是 HDL 的最主要成分, 其功能是与磷脂结合形成新生 HDL, 促进 HDL 摄取外周组织胆固醇; 在肝脏表面介导 HDL 与其受体的作用, 促进 HDL 将外周组织胆固醇逆向转运至肝脏进行代谢; 作为卵磷脂胆固醇酰基转移酶的主要激活剂, 促进胆固醇酯化; 从而在外周组织至肝脏代谢的

胆固醇逆向转运过程中发挥着关键作用,与动脉粥样硬化呈负相关^[9]。ApoB 是 LDL-C 和极低密度脂蛋白-胆固醇 (VLDL-C) 的主要载脂蛋白成分,参与胆固醇和 TG 的代谢,作为 LDL 受体的专一性配体,与 LDL 受体相互作用,促使 LDL 在血管内皮下大量堆积并被氧化修饰,进而促进动脉粥样硬化的形成和发展。目前研究表明,同 TC 分析比较,ApoB 分析具有更好的可靠性和可重复性,是预测动脉硬化性心脑血管疾病颇具价值的指标^[9]。

LPa 结构类似 LDL,但 TG 的量较高,含两类载脂蛋白,即 ApoA 和 ApoB100。LPa 与纤溶酶原高度同源,在纤溶系统多个环节发挥作用,促进动脉粥样硬化疾病的发展,目前已有足够证据表明 LPa 是动脉硬化性心脑血管病的独立危险因素^[10]。本实验结果显示,在模型组中,兔血清中 TC、TG、LDL-C 以及 ApoB、LPa 的水平显著升高,而 ApoA1 则显著降低;经小檗碱干预后能显著降低高脂饮食诱导的兔血清 TC、TG、LDL-C 的水平,而显著升高 ApoA1 水平,且低剂量小檗碱还可显著降低 ApoB、LPa 的水平,表明小檗碱具有改善高脂血症的作用,并且可有效防止动脉硬化性心脑血管疾病的危险因素的侵袭,低剂量小檗碱的效果优于阳性对照药非诺贝特。

Insig-2 是存在于内质网上的一种膜蛋白,是近年来发现的调控脂肪代谢的新基因之一,它通过与固醇调节元件结合蛋白 (sterol regulatory element binding protein, SREBP) 及 SREBP 裂解活化蛋白 (SREBP cleavage activating protein, SCAP) 相结合,以 INSIG-SCAP-SREBP 复合物的形式储存于内质网上,阻止 SCAP 将 SREBP 运送至高尔基体进行蛋白酶解的作用,从而阻断胆固醇的合成^[11]。Jo 等^[12]和 Nguyen 等^[13]的研究显示,Insig-2 能促进胆固醇合成当中的限速酶 HMG CoA 快速降解从而抑制胆固醇合成。VDR 是一种配体依赖的核转录因子,属于配体激活受体超基因家族,其与脂肪细胞分化的关系更是其中新的研究亮点,其配体 1,25-(OH)₂D₃ 能在形态和相关酶表达上抑制前脂肪细胞向成熟脂肪细胞分化,降低血脂水平^[14]。Lee 等^[15]在胰岛素诱导基因 2 基因的启动子中发现一个维生素 D 反应元件 (Vitamin D responsive element, VDRE),并发现 VDR 可识别并结合该基因启动子区域 VDRE,激活基因转录,促进 Insig-2 基因表达,从而发挥调节脂质代谢的作用。因此,本研究在确定小檗碱的

调脂作用后,通过 PT-PCR 法检测了各组兔脂肪组织中 VDR 和 Insig-2 基因的 mRNA 表达水平,以探讨小檗碱对高脂血症兔血脂代谢紊乱影响的可能机制。结果显示,低剂量小檗碱能显著增加高脂兔脂肪组织中 VDR 和 Insig-2 mRNA 的表达水平,表明小檗碱可通过 VDR 介导、调节 Insig-2 基因的表达,进而抑制脂质合成代谢,调节血脂水平。本课题组前期研究也表明,在体外细胞实验中小檗碱能够促进 VDR 基因的表达,并进一步诱导 Insig-2 基因的表达,降低细胞内胆固醇水平^[7]。而高剂量小檗碱降胆固醇及促 VDR 和 Insig-2 基因表达的作用不明显,可能与肝细胞内胆固醇合成的反馈调节有关。VDR 和 Insig-2 基因参与胆固醇合成的调节,同时其自身的表达也受细胞内胆固醇浓度的影响,当胆固醇升高时促进 VDR 和 Insig-2 基因表达以抑制胆固醇的合成,当胆固醇降低时则反馈性抑制两者表达,因此,高脂模型组随着胆固醇合成增加而出现代偿性 VDR 和 Insig-2 基因表达增高,而高剂量小檗碱则可能由于肝细胞内胆固醇合成减少而反馈性下调 VDR 和 Insig-2 基因表达,因而与高脂模型组比较无显著差异。

参考文献

- [1] 周丽斌,陈名道,王晓,等.小檗碱对脂肪细胞分化的影响[J].中华医学杂志,2003,83(4):338-340.
- [2] 王春波,陆付耳,冷三华,等.小檗碱对 HepG2 细胞葡萄糖激酶活性及其 mRNA 表达的影响[J].中国药理学通报,2007,23(9):1145-1147.
- [3] 易屏,陆付耳,陈广,等.小檗碱抑制 IKK β Ser 181 磷酸化改善高糖诱导的 3T3-L1 脂肪细胞胰岛素抵抗的分子机制[J].中草药,2008,39(5):724-729.
- [4] 王静,张艳军,常亮堂,等.小檗碱对 $\text{A}\beta_{25-35}$ 损伤大鼠皮层神经元的保护作用[J].中草药,2011,42(4):728-733.
- [5] 章涛,李苾清,杨俊卿,等.小檗碱抑制人乳腺癌 MDA-MB-231 细胞增殖及其与过氧化物酶体增殖物激活受体 γ 的关系[J].中草药,2009,40(2):244-247.
- [6] 来丽娜,赵娜,郭春花,等.小檗碱对 HeLa 细胞凋亡及其凋亡相关蛋白表达的影响[J].中草药,2008,39(2):244-247.
- [7] 常伟,王红,尹华峰,等.小檗碱对胆固醇代谢及肝脏 Insig-2 基因表达的影响[J].中国药理学通报,2009,25(1):85-88.
- [8] Abidi P, Zhou Y, Jiang J D, et al. Extracellular signal-regulated kinase-dependent stabilization of hepatic low-density lipoprotein receptor mRNA by herbal medicine berberine [J]. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 2005, 25(10): 2170-2176.

- [9] Walldius G, Jungner I. Apolipoprotein B and apolipoprotein A-I: risk indicators of coronary heart disease and targets for lipid-modifying therapy [J]. *J Intern Med*, 2004, 255(2): 188-205.
- [10] Dahlén G H, Ekstedt B. The importance of the relation between lipoprotein (a) and lipids for development of atherosclerosis and cardiovascular disease [J]. *J Intern Med*, 2001, 250(3): 265-267.
- [11] Yabe D, Brown M S, Goldstein J L. Insig-2, a second endoplasmic reticulum protein that binds SCAP and blocks export of sterol regulatory element-binding proteins [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2002, 99(20): 12753-12758.
- [12] Jo Y, Debose-Boyd R A. Control of cholesterol synthesis through regulated ER-associated degradation of HMG CoA reductase [J]. *Crit Rev Biochem Mol Biol*, 2010, 45(3): 185-198.
- [13] Nguyen A D, Lee S H, DeBose-Boyd R A. Insig-mediated, sterol-accelerated degradation of the membrane domain of hamster 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase in insect cells [J]. *J Biol Chem*, 2009, 284(39): 26778-26788.
- [14] Blumberg J M, Tzamelis I, Astapova I, et al. Complex role of the vitamin D receptor and its ligand in adipogenesis in 3T3-L1 cells [J]. *J Biol Chem*, 2006, 281(16): 11205-11213.
- [15] Lee S, Lee D K, Choi E, et al. Identification of a functional vitamin D response element in the murine Insig-2 promoter and its potential role in the differentiation of 3T3-L1 preadipocytes [J]. *Mol Endocrinol*, 2005, 19(2): 399-408.

《中国药学杂志》岛津杯第十届全国药物分析优秀论文评选交流会征文通知（第一轮）

为推动我国药物分析事业的发展，促进药物分析技术的交流，由中国药学会药物分析专业委员会主办、《中国药学杂志》社承办、岛津国际贸易（上海）有限公司协办的《中国药学杂志》岛津杯第十届全国药物分析优秀论文评选交流会定于2011年9月下旬在上海举行。本届大会主题为：药物分析在药品质量、用药安全及新药研发中的应用。届时将邀请中国药学会领导，药物分析专业委员会历届正、副主任委员及新一届全体药物分析专业委员会委员和有关专家参会。

1 征文内容

(1) 近几年来国内外药物分析新理论、新技术、新方法；(2) 现代分析手段和检测技术在药物分析中的应用；(3) 中药注射剂的质控和安全性研究；(4) 化学药物、抗生素药品质量分析及研究；(5) 中药、天然药物及制剂质量分析及研究；(6) 生物技术药品、生化药品质量分析及研究；(7) 药用辅料、包装材料与药品质量分析研究；(8) 药物血药浓度监测和药代动力学；(9) 药物生物利用度和溶出度的研究；(10) 药物快速分析检定新方法、新技术；(11) 毒物快速分析检定；(12) 组学（蛋白、代谢、细胞）分析检测方法研究；(13) 计算机和数学在药物分析领域中的应用。

2 征文要求

(1) 未公开发表及未在全国性会议上交流过，有一定的创新性。(2) 论文体例、格式请参见《中国药学杂志》2011年第1期稿约。(3) 应征论文被录用后，将通知作者，论文录用与否，一律不退稿，请自留底稿。(4) 征文截止时间：2011年7月30日（以邮戳为准）。稿件及信封请注明“岛津杯征文”字样并附单位介绍信。同时将电子文件发至 daojinbei@yahoo.com.cn; zgyxzz@cpa.org.cn（标题请注明岛津杯征文）。

3 会议时间及地点

时间：2011年9月下旬（暂定）。 地点：上海（具体详见第二轮通知）。

4 论文评奖

在本次会上对交流的论文将组织国内著名药物分析专家进行评奖，评选出优秀论文一等奖3名（3000元/名）、二等奖6名（2000元/名）、三等奖10名（1000元/名）。获得一、二等奖的论文在征得作者同意后将在《中国药学杂志》上发表。

5 联系地址及联系方式

地址：北京市朝阳区建外大街4号建外SOHO九号楼1803室（邮编：100022）

联系人：李亚娟、田 菁

电话：010-58698031-65 010-58699275-829