不同采收期龙胆中龙胆苦苷、獐牙菜苦苷和獐牙菜苷的变化研究

刘姝静, 才 谦*

辽宁中医药大学 药学院, 辽宁 大连 116600

摘要: 目的 研究不同采收期龙胆中龙胆苦苷、獐牙菜苦苷、獐牙菜苷的变化规律。方法 采用 Welchrom C₁₈ 色谱柱 (250 mm×4.6 mm, 5 μm); 流动相: 甲醇-水 (25:75); 检测波长: 270 (龙胆苦苷)、240 nm (獐牙菜苦苷和獐牙菜苷); 体积流量: 1.0 mL/min; 柱温: 25 °C; 进样量为 10 μL。分别采收 9、10 月上、中、下旬的龙胆, 考察其中龙胆苦苷、獐牙菜苦苷、獐牙菜苷的变化。结果 在 9—10 月, 龙胆中龙胆苦苷、獐牙菜苦苷和獐牙菜苷的量基本呈现同步上升、同步下降趋势。在 9 月中旬最高, 9 月下旬最低。与 9 月下旬比较, 10 月上旬的量有所回升, 而 10 月下旬的量再次呈下降趋势。结论 龙胆药材最佳采收季节为 9 月中旬, 此时龙胆苦苷、獐牙菜苦苷和獐牙菜苷的量最高。

关键词: 龙胆; 龙胆苦苷; 獐牙菜苦苷; 獐牙菜苷; 采收期; 高效液相色谱

中图分类号: R286.02 文献标志码: A 文章编号: 1674-5515(2017)10-1828-04

DOI: 10.7501/j.issn.1674-5515.2017.10.004

Trends of gentiopicroside, swertiamarin, and sweroside from *Gentianae Radix et Rhizoma* in different harvesting time

LIU Shu-jing, CAI Qian

College of Pharmacy, Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Dalian 116600, China

Abstract: Objective To study the dynamics trends of gentiopicroside, swertiamarin, and sweroside from *Gentianae Radix et Rhizoma* in different harvesting time. **Methods** The determination was carried out on Welchrom C₁₈ column (250 mm × 4.6 mm, 5 μm). The mobile phase consisted of methanol – water (25:75). The detection wavelengths were 240 nm (determination of swertiamarin and sweroside) and 270 nm (determination of gentiopicroside). The flow rate was 1.0 mL/min, and the column temperature was set at 25 °C with injection volume of 10 μL. *Gentianae Radix et Rhizoma* were collected in upper-, middle-, and late September and October, and the contents of gentiopicroside, swertiamarin, and sweroside were compared. **Results** The content of gentiopicroside, swertiamarin, and sweroside in *Gentianae Radix et Rhizoma* were simultaneously rising or falling from September to October, and the maximum degree was in mid-September, but the minimum degree was in late September, Compared with those in September, the contents were gradually rising in early October, while gradually decreased in mid-October. **Conclusion** The optimal harvest time of *Gentianae Radix et Rhizoma* is mid-September when the content of gentiopicroside, swertiamarin, and sweroside are the highest.

Key words: *Gentianae Radix et Rhizoma*; gentiopicroside; swertiamarin; sweroside; harvesting time; HPLC

龙胆为龙胆科条叶龙胆 *Gentiana manshurica* Kitag.、龙胆 *G. scabra* Bge.、三花龙胆 *G. triflora* Pall. 或坚龙胆 *G. rigescens* Franch. 的干燥根和根茎^[1]。龙胆的根及根茎含有环烯醚萜类、三萜、多糖、生物碱、黄酮、甾体、香豆素、挥发油和内酯等多种成分^[2-5], 其中环烯醚萜类中的裂环环烯醚萜苷类为主要有效成分, 以龙胆苦苷、獐牙菜苦苷、獐牙菜苷

为代表, 也是龙胆中苦味成分的基础物质^[6-8]。其中苦味成分含量最高的为龙胆苦苷, 由于受不同产地和不同采收期的影响, 可达 3%~8%, 含量差异显著^[9]。龙胆因在我国东北的产量最大, 而被称为“关龙胆”^[9-10], 《中国药典》2015 年版中明确规定应在春秋两季采收龙胆。本实验探讨了秋季即 9、10 月份不同采收时间对“关龙胆”药材中龙胆苦苷、獐

收稿日期: 2017-05-23

基金项目: 国家中药标准化项目 (ZYBZH-Y-TJ-43)

作者简介: 刘姝静 (1993—), 女, 硕士研究生, 研究方向为中药化学。E-mail: 631711116@qq.com

*通信作者 才 谦, 女, 辽宁沈阳人, 教授, 主要从事中药化学的教学和科研工作。Tel: 15998541866 E-mail: caiqianmail@sina.com

芽菜苦苣及獐牙菜苣的影响,明确并掌握龙胆在不同采收期时龙胆苦苣类成分的动态差异,进而确定龙胆的最佳采收时间。

1 仪器与材料

1.1 仪器

LC-10A 高效液相色谱仪、SPD-10A 紫外检测器(日本岛津公司);N3000 双通道色谱工作站(浙江大学智能信息研究所);GTSONIC-P13 型超声波清洗器(广州固特超声股份有限公司);CP225D 型电子天平(十万分之一,德国 Sartorius 公司)。

1.2 材料

龙胆药材购于辽宁省清原县,经辽宁中医药大学鉴定教研室李峰教授鉴定为龙胆 *Gentiana scabra* Bge.的干燥根和根茎;龙胆苦苣、獐芽菜苦苣、獐牙菜苣对照品均购自江苏永健医药科技有限公司,质量分数均 $\geq 98\%$;甲醇(HPLC级,天津市科密欧化学试剂有限公司);纯净水(杭州娃哈哈集团有限公司)。

2 方法与结果

2.1 检测波长的选择

通过对龙胆药材提取液进行紫外全波长扫描,发现其分别在 270、240 nm 处有吸收峰。龙胆苦苣紫外吸收最大值为 270 nm,而此时獐芽菜苦苣和獐牙菜苣的吸收值较小,而在 240 nm 波长下吸收值较大,因此龙胆苦苣选用 270 nm 为检测波长,獐

芽菜苦苣和獐牙菜苣选用 240 nm 为检测波长。

2.2 色谱条件

Welchrom C₁₈ 色谱柱(250 mm $\times$ 4.6 mm, 5 μ m);流动相:甲醇-水(25:75);检测波长:270 (龙胆苦苣)、240 nm (獐芽菜苦苣和獐牙菜苣);体积流量:1.0 mL/min;柱温:25 $^{\circ}$ C;进样量为 10 μ L。

2.3 对照品溶液的制备

精密称取龙胆苦苣、獐牙菜苦苣、獐牙菜苣对照品适量,加甲醇制成质量浓度分别为 300、60、20 μ g/mL 的对照品溶液。

2.4 供试品溶液的制备

称取龙胆样品 0.625 g,精密称定,精密加入甲醇 25 mL,称定质量,超声处理 30 min,放冷后再称定质量,用甲醇补足减失的质量,摇匀,滤过,滤液经 0.45 μ m 微孔滤膜滤过,制成獐芽菜苦苣和獐牙菜苣测定用供试品溶液,避光冷藏备用。再精密吸取续滤液 2 mL,定容至 10 mL,摇匀,即得龙胆苦苣测定用供试品溶液,避光冷藏备用。

2.5 系统适用性试验

取 10 月 4 日采摘的龙胆供试品溶液、空白溶剂和各对照品溶液,进样测定,记录色谱图,见图 1。结果表明,龙胆苦苣、獐芽菜苦苣和獐牙菜苣的色谱峰与相邻色谱峰的分度均符合要求,与其他组分完全分离,空白溶剂在相应的峰位置处无干扰。

图 1 空白溶剂(A)、对照品(B)和龙胆药材(C)的 HPLC 色谱图

Fig. 1 HPLC Chromatograms of blank solution (A), reference substances (B), and *Gentianae Radix et Rhizoma* (C)

2.6 线性关系考察

精密称取龙胆苦苣对照品 60.00 mg,加甲醇定容至 25 mL,制成 2.4 mg/mL 龙胆苦苣对照品储备液,分别精密吸取该储备液 0.5、1、2、3、4、5 mL,

置于 5 mL 量瓶中,加甲醇至刻度,依次精密吸取 10 μ L 注入高效液相色谱仪中,测定色谱峰面积。以进样质量为横坐标,色谱峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,线性回归后得回归方程 $Y=4\ 538.2 X-$

276 087, $r=0.999\ 3$ 。结果显示龙胆苦苣进样量在 2.40~24.00 μg 与峰面积的线性关系良好。

另精密称取獐牙菜苦苣对照品 7.54 mg, 加甲醇定容至 25 mL, 制成 0.301 6 mg/mL 对照品溶液储备液, 分别精密吸取该储备液 1、2、3、4、5、6 mL, 置于 10 mL 量瓶中, 加甲醇至刻度, 依次精密吸取 10 μL 注入高效液相色谱仪, 测定色谱峰面积。以进样质量为横坐标, 色谱峰面积为纵坐标, 绘制标准曲线, 经线性回归, 得回归方程 $Y=7\ 388.3\ X+51\ 406$, $r=0.999\ 4$ 。结果显示獐牙菜苦苣进样量在 0.301 6~1.809 6 μg 与峰面积线性关系良好。

再另精密称取獐牙菜苦苣 7.53 mg, 加甲醇定容至 250 mL, 制成 30.12 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的对照品溶液储备液。分别精密吸取该储备液 3、4、5、6、7、8 mL, 置 10 mL 量瓶中, 加甲醇至刻度, 依次精密吸取 10 μL 注入高效液相色谱仪, 测定色谱峰面积。以进样质量为横坐标, 色谱峰面积为纵坐标, 绘制标准曲线, 经线性回归得回归方程 $Y=7\ 771.6\ X-7701.3$, $r=0.999\ 1$ 。结果显示獐牙菜苦苣进样量在 90.36~240.96 ng 与峰面积线性关系良好。

2.7 精密度试验

取 10 月 4 日采摘的龙胆药材制备供试品溶液, 连续进样 6 次, 每次 10 μL , 测定龙胆苦苣、獐牙菜苦苣、獐牙菜苦苣的色谱峰面积, 结果其 RSD 值分别为 2.27%、2.51%、2.83%。

2.8 稳定性试验

取 10 月 4 日的龙胆药材粉末, 制备供试品溶液, 精密吸取 10 μL , 分别在 0、4、8、12、24、48 h 进样测定龙胆苦苣、獐牙菜苦苣、獐牙菜苦苣的色谱峰面积, 结果其 RSD 值分别为 1.95%、1.85%、2.19%, 提示在 48 h 内供试品溶液稳定。

2.9 重复性试验

平行取 10 月 4 日的龙胆药材粉末 6 份, 精密称定, 制备供试品溶液, 进样测定峰面积, 计算得龙胆苦苣、獐牙菜苦苣、獐牙菜苦苣的平均质量分数分别为 4.03%、0.59%、0.12%, RSD 值分别为 1.21%、0.63%、0.90%。

2.10 回收率试验

取 10 月 4 日的龙胆药材粉末 0.312 5 g, 平行精密称定 6 份, 置锥形瓶中, 依次精密加入 2.4 mg/mL 龙胆苦苣 5 mL、0.301 6 mg/mL 獐牙菜苦苣 6 mL、30.12 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 獐牙菜苦苣对照品溶液 12 mL, 制备供试品溶液, 进样分析, 计算得龙胆苦苣、獐牙菜苦苣、

獐牙菜苦苣的平均回收率分别为 97.5%、97.6%、96.5%, RSD 值分别为 1.11%、1.02%、1.18%。

2.11 各成分的变化

分别采收 9、10 月上、中、下旬的龙胆, 每隔 8 天采收 1 次, 制备供试品溶液, 进样测定, 采用标准曲线法对样品中龙胆苦苣、獐牙菜苦苣、獐牙菜苦苣进行计算, 结果见图 2。

图 2 不同采收时间龙胆中龙胆苦苣、獐牙菜苦苣和獐牙菜苦苣的变化

Fig. 2 Changes of gentiopicroside, swertiamarin, and sweroside from *Gentianae Radix et Rhizoma* in various of harvesting time

可以看出, 在 9—10 月, 龙胆中龙胆苦苣、獐牙菜苦苣和獐牙菜苦苣的量基本呈现同步上升、同步下降趋势。在 9 月中旬最高, 9 月下旬最低。与 9 月下旬比较, 10 月上旬的量有所回升, 而 10 月下旬的量再次呈下降趋势。这种变化可能与龙胆花期和 10 月份山里的气温有关。随着温度逐渐降低, 土壤被冻, 此时的生长环境不适合龙胆生存, 因此 3 种成分的量均降低。

3 讨论

龙胆苦苣、獐牙菜苦苣、獐牙菜苦苣既是环烯醚萜类中的裂环环烯醚萜苷类为主要有效成分, 也是龙胆中苦味成分的基础物质。在药材采收期的选择时, 通常以有效成分的量最高时期为最适宜的采收期。根据分析结果和龙胆生长条件可得: 9 月中旬龙胆处于生长旺盛阶段, 龙胆根中龙胆苦苣、獐牙菜苦苣、獐牙菜苦苣的量最高, 因此在取龙胆根部入药时, 最佳的采收期为 9 月中旬。龙胆在花期时, 可能存在有效成分向上输送的原因, 此时龙胆苦苣、獐牙菜苦苣、獐牙菜苦苣的量最低; 龙胆在花期后, 有效成分有呈向下输送的趋势^[11-12], 所以在 10 月上旬时, 有效成分的量有所升高; 10 月中旬时, 由于季节、气候变化, 温度逐渐降低, 光合作用减少,

植物逐渐进入休眠状态,有效成分有降低趋势^[13]。因此建议采收龙胆时避开花期,且以有效成分的量最高时期9月中旬作为龙胆的最佳采收期。

参考文献

- [1] 中国药典 [S]. 一部. 2015: 96.
- [2] 杨书彬, 王 承. 龙胆化学成分和药理作用研究进展 [J]. 中医药学报, 2005, 33(6): 54-56.
- [3] 沈 涛, 金 航, 王元忠, 等. 中药龙胆化学成分研究进展 [J]. 安徽农业科学, 2010, 38(30): 16868-16870.
- [4] 刘 涛, 才 谦, 付玉芹, 等. 中药龙胆的研究进展 [J]. 辽宁中医药杂志, 2004, 31(1): 85-86.
- [5] 董丽萍, 倪梁红, 赵志礼, 等. 龙胆属环烯醚萜类化学成分研究进展 [J]. 中草药, 2017, 48(10): 2116-2128.
- [6] 匡海学. 中药化学 [M]. 北京: 中国中医药出版社, 2011: 179.
- [7] 曹 悦, 左代英, 孟庆龙, 等. 不同采收期和加工方法对龙胆药材含量的影响 [J]. 中国药事, 2010, 10(1): 75-77.
- [8] 刘玉强, 才 谦. 酒龙胆中獐牙菜苦苷含量测定方法研究 [J]. 辽宁中医药大学学报, 2011, 13(2): 189-190.
- [9] 刘恒宇. 龙胆的质量评价 [D]. 长春: 吉林农业大学, 2007.
- [10] 王 德, 郎永生, 刘 娟. 龙胆药效成分含量积累规律研究进展 [J]. 黑龙江医药, 2011, 24(2): 252-253.
- [11] 江蔚新, 沈志滨, 薛宝玉. 三花龙胆和东北龙胆中龙胆苦苷的积累规律研究 [J]. 中草药, 2004, 35(5): 521-522.
- [12] 江蔚新. 三花龙胆和东北龙胆地上、地下器官中张艳才苦苷积累规律研究 [J]. 中成药, 2005, 27(4): 459-461.
- [13] 蒋 品, 高言明, 杨玉琴, 等. 龙胆不同采收期龙胆苦苷和多糖含量变化研究 [J]. 江西中医药, 2011, 42(2): 55-57.