• 实验研究 •

丹参酮 II_A 通过调控 PI3K/Akt/mTOR 信号通路对食管癌细胞放疗敏感性的影响

张倩, 刘艳娇, 贾晓龙, 何龙英, 史志杰, 马丽, 张楠楠, 李晓鹏*

邯郸市第一医院, 河北 邯郸 056002

摘要: 目的 研究丹参酮 II_A 对人食管癌细胞放疗敏感性的影响, 并基于磷脂酰肌醇 3 激酶/蛋白激酶 B/哺乳动物雷帕霉素靶蛋白 (PI3K/Akt/mTOR) 信号通路探讨其潜在机制。方法 以人食管癌 Eca-109 细胞为受试细胞, 分别采用不同浓度丹参酮 II_A 和不同放射剂量处理 Eca-109 细胞, 48 h 后 MTT 法检测细胞增殖活力, 计算丹参酮 II_A 半数抑制浓度 (IC₅₀) 和放射的 IC₅₀, 分别作为后续实验丹参酮 II_A 浓度和放射剂量。取对数生长期 Eca-109 细胞, 设对照组、丹参酮 II_A 组、放射组、丹参酮 II_A+放射组、丹参酮 II_A+放射+PI3K 抑制剂 (LY294002) 组。通过平板克隆实验、MTT 法、流式细胞术、荧光质粒转染法检测细胞克隆形成能力、增殖活力、凋亡率和自噬状况, RT-PCR、Western blotting 法检测细胞中 PI3K/Akt/mTOR 信号通路相关 mRNA 和蛋白表达。结果 丹参酮 II_A 和放射对人食管癌 Eca-109 细胞增殖活力的抑制作用均呈现剂量相关性, 丹参酮 II_A IC₅₀ 为 8.75 mmol/L, 放射量 IC₅₀ 为 4.63 Gy。与对照组相比, 丹参酮 II_A 组、放射组、丹参酮 II_A+放射组、丹参酮 II_A+放射+LY294002 组细胞克隆形成能力和增殖活力明显降低, 凋亡率和自噬体数量明显升高 ($P<0.05$); PI3K、Akt、mTOR mRNA 和蛋白表达量明显降低 ($P<0.05$); Bcl-2、Bax、cleaved Caspase-3、LC3-I、LC3-II 蛋白表达量及 Bax/Bcl-2、Cleaved Caspase-3/Caspase-3、LC3-II/LC3-I 明显升高 ($P<0.05$)。与丹参酮 II_A 组或放射组相比, 丹参酮 II_A+放射组和丹参酮 II_A+放射+LY294002 组对各检测指标的调控作用明显增强 ($P<0.05$)。与丹参酮 II_A+放射组相比, 丹参酮 II_A+放射+LY294002 组对各指标的调控作用明显增强 ($P<0.05$)。结论 丹参酮 II_A 可能通过下调 PI3K/Akt/mTOR 信号通路, 抑制细胞增殖并促进其凋亡与自噬, 进而增强人食管癌细胞放疗敏感性。

关键词: 丹参酮 II_A; 食管癌; 放疗; 磷脂酰肌醇 3 激酶/蛋白激酶 B/哺乳动物雷帕霉素靶蛋白信号通路; 凋亡; 自噬

中图分类号: R285.5 文献标志码: A 文章编号: 1674-5515(2023)11-2645-10

DOI: 10.7501/j.issn.1674-5515.2023.11.001

Effect of tanshinone II_A on radiotherapy sensitivity of esophageal cancer cells by regulating PI3K/Akt/mTOR signaling pathway

ZHANG Qian, LIU Yan-jiao, JIA Xiao-long, HE Long-ying, SHI Zhi-jie, MA Li, ZHANG Nan-nan, LI Xiao-peng
Handan First Hospital, Handan 056002, China

Abstract: Objective To investigate the effect of tanshinone II_A on radiotherapy sensitivity of human esophageal carcinoma cells, and explore its potential mechanism based on the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway. **Methods** The human esophageal cancer Eca-109 cells was used as test cells, which were treated with different concentrations of tanshinone II_A and different radiation doses respectively. 48 h later, the cell proliferation activity was detected by MTT method, the half-inhibitory concentration of IC₅₀ tanshinone II_A (as the concentration of tanshinone II_A for follow-up experiments) and IC₅₀ radiation (as the radiation dose for follow-up experiments) were calculated respectively. Take the Eca-109 cells in logarithmic growth period and set blank group, tanshinone II_A group, radiation group, tanshinone II_A + radiation group, tanshinone II_A + radiation + PI3K inhibitor (LY294002) group. The cloning ability, proliferation activity, apoptosis rate, and autophagy were detected by plate cloning assay, MTT assay, flow cytometry or fluorescent plasmid transfection. The PI3K/Akt/mTOR signaling pathway related mRNA and protein expression were detected by RT-PCR or Western blotting method. **Results** Both tanshinone II_A and radiation showed dose-dependent inhibitory effects on the proliferation of human

收稿日期: 2023-09-16

基金项目: 邯郸市科学技术研究与发展计划项目 (22422083056ZC)

作者简介: 张倩, 女, 硕士, 主治医师, 主要从事肿瘤学诊治及科研工作。E-mail: 692126537@qq.com

*通信作者: 李晓鹏 E-mail: fl08858@163.com

esophageal cancer Eca-109 cells. The IC_{50} tanshinone II_A was 8.75 mmol/L, and the IC_{50} radiation was 4.63 Gy. Compared with the control group, the clonogenesis ability and proliferation activity of tanshinone II_A group, radiation group, tanshinone II_A + radiation group and Tanshinone II_A + radiation + LY294002 group were significantly decreased, the apoptosis rate and autophagosome number were significantly increased ($P < 0.05$). The mRNA expressions of *PI3K*, *Akt*, *mTOR* were significantly decreased ($P < 0.05$). The protein expression of PI3K, Akt, mTOR were significantly decreased. The protein expression of Bcl-2, Bax, Cleaved Caspase-3, LC3-I, LC3-II, and the expression ratios of Bax/Bcl-2, Cleaved Caspase-3/Caspase-3, LC3-II/LC3-I were significantly increased ($P < 0.05$). Compared with tanshinone II_A group or radiation group, the regulation effect of tanshinone II_A + radiation group and tanshinone II_A + radiation + LY294002 group on the detection indexes was significantly enhanced ($P < 0.05$). Compared with tanshinone II_A + radiation group, the regulation effect of tanshinone II_A + radiation + LY294002 group was significantly enhanced ($P < 0.05$). **Conclusions** Tanshinone II_A may inhibit cell proliferation, promote apoptosis and autophagy by down-regulating PI3K/Akt/mTOR signaling pathway, thus enhancing the radiotherapy sensitivity of human esophageal cancer cells.

Key words: tanshinone II_A; esophageal cancer; radiotherapy; PI3K/Akt/mTOR signaling pathway; apoptosis; autophagy

食管癌是最常见的消化道恶性肿瘤之一, 全球每年新发病例超过 60 万例, 其中约 53% 的患者出现在我国, 食管癌病理分型主要有鳞状细胞癌和腺癌两种, 我国以鳞状细胞癌为主^[1]。虽然近年来手术、放化疗技术以及生物免疫疗法等新兴手段不断发展, 但食管癌患者 5 年生存率仍不足 30%^[2-3]。放疗是临床治疗中晚期食管癌及术后辅助治疗的重要手段, 主要作用机制为抑制肿瘤细胞增殖和促进其凋亡与自噬, 放疗敏感性降低是影响食管癌放疗效果、导致复发转移的关键因素^[4-6]。因此, 寻找能够增强食管癌细胞放疗敏感性的新型药物, 对改善食管癌患者预后具有重要意义。

丹参酮 II_A 是由唇形科植物丹参的根皮部提取的一种共轭醌、酮类化合物, 具有较好的抗炎抑菌、抗氧化等药理作用, 目前主要用于缺血性心血管疾病的治疗。随着药理学研究的不断深入, 丹参酮 II_A 抗肿瘤活性逐渐得到关注^[7]。磷脂酰肌醇 3 激酶/蛋白激酶 B/哺乳动物雷帕霉素靶蛋白 (PI3K/Akt/mTOR) 通路在细胞增殖、凋亡与自噬的调控机制中发挥着重要的信号传导作用^[8]。研究证实, 丹参酮 II_A 通过下调 PI3K/Akt/mTOR 信号通路可抑制胆管癌细胞、胶质瘤细胞、喉癌细胞增殖并促进其凋亡与自噬^[9-11], 可明显改善喉癌细胞顺铂化疗敏感性^[12]。丹参酮 II_A 能够通过促进口腔鳞状细胞癌自噬而增强其放疗敏感性^[13]。本实验以人食管癌 Eca-109 细胞作为受试细胞, 研究丹参酮 II_A 对人食管癌细胞放疗敏感性的影响, 并基于 PI3K/Akt/mTOR 信号通路探讨其潜在机制。

1 材料与方法

1.1 细胞

人食管鳞状细胞癌 Eca-109 细胞系购自青旗(上海)生物技术发展有限公司(货号 BFN60808845)。

1.2 主要试剂与仪器

丹参酮 II_A (质量分数 ≥ 98%, 上海源叶生物科技有限公司, 货号 B20257); PI3K 抑制剂 2-吗啉代-8-苯基色酮 (LY294002)、RPMI-1640 培养基、RIPA 裂解液、通用 RT-PCR 反转录试剂盒 (北京索莱宝生物技术公司, 货号 IL0270、90023、R0010、RP1100); 胎牛血清、GFP-LC3 荧光质粒、细胞转染试剂盒、Trizol 总 RNA 抽提试剂 (上海碧云天生物科技有限公司, 货号 C0236、C3006、C0511、R0016); 胰蛋白酶、MTT 试剂盒、Annexin V-FITC/PI 细胞凋亡检测试剂盒、BCA 法蛋白定量试剂盒、结晶紫 (大连美仑生物技术有限公司, 货号分别为 MB2925-1、MA0198、MA0220、MA0082、MB4788); PI3K、Akt、mTOR、半胱氨酸蛋白酶-3 (Caspase-3)、激活型 Caspase-3 (cleaved Caspase-3)、自噬微管相关蛋白 1 轻链 3 (LC3) 抗体 (英国 Abcam 公司, 货号 ab18097、ab38451、ab32028、ab50119、ab50132、ab47286); B 细胞淋巴瘤-2 (Bcl-2)、Bcl-2 相关 X 蛋白 (Bax)、甘油醛-3-磷酸脱氢酶 (GAPDH) 抗体和 IgG 二抗、ECL 显色液 (北京博奥森生物技术公司, 货号 bs-33411R、bs-0127R、bs-41373R、bs-40295G、C05-07004)。

2100EX 型直线加速器 (美国 Varian 公司); 3111 型 CO₂ 细胞培养箱 (美国热电公司); HT 型酶标仪 (美国 Bio-Tek 公司); CytoFLEX 型流式细胞仪 (美国 Beckman 公司); DM1000 型荧光显微镜 (德国 Leica 公司); Quant Studio 5 型 RT-PCR 仪 (美国 ABI 公司); 24KS 型电泳仪 (北京六一公司); TE22 型转膜仪 (美国 Hoefer 公司)。

1.3 方法

1.3.1 细胞培养 将人食管鳞状细胞癌 Eca-109 细胞接种于含 10% 胎牛血清、双抗 (100 U/mL 青霉素

和 100 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 链霉素) 的 RPMI-1640 培养基, 置于 37 $^{\circ}\text{C}$ 、5% CO_2 培养箱中进行培养。隔天更换 1 次培养基, 待细胞融合至约 90% 时按 1:3 传代培养。

1.3.2 MTT 法测定不同浓度丹参酮 II_A 对 Eca-109 细胞增殖活力的影响 取对数生长期 Eca-109 细胞, 胰蛋白酶消化处理后离心收集细胞, 5×10^3 个/孔接种至 96 孔板, 分别加入含有终浓度 0、2、4、8、16、32 $\mu\text{mol}/\text{L}$ 丹参酮 II_A 的培养基, 继续培养 48 h 后, 20 $\mu\text{L}/\text{孔}$ 加入质量浓度 5 mg/mL 的 MTT 溶液, 继续培养 4 h, 弃上清液, 200 $\mu\text{L}/\text{孔}$ 加入 DMSO 混匀后, 通过酶标仪检测 490 nm 处吸光度 (A) 值, 计算丹参酮 II_A 半数抑制浓度 (IC_{50}) 并作为后续实验丹参酮 II_A 浓度, 独立重复 3 次实验。

$$\text{细胞增值率} = A_{\text{丹参酮 II}_A} / A_{\text{丹参酮 II}_A 0 \mu\text{mol/L}}$$

1.3.3 MTT 法测定不同放射剂量对 Eca-109 细胞增殖活力的影响 取对数生长期 Eca-109 细胞, 胰蛋白酶消化处理后离心收集细胞, 5×10^3 个/孔接种至 96 孔板, 培养 48 h 后, 通过直线加速器分别给予不同放射剂量 (0、1、2、4、6、8 Gy, 剂量率均为 1 Gy/min, 即放射时间分别为 0、1、2、4、6、8 min) 进行处理, 20 $\mu\text{L}/\text{孔}$ 加入质量浓度 5 mg/mL 的 MTT 溶液, 继续培养 4 h, 弃上清液, 200 $\mu\text{L}/\text{孔}$ 加入 DMSO 混匀后, 通过酶标仪检测 490 nm 处 A 值, 计算放射 IC_{50} 并作为后续实验放射剂量, 独立重复 3 次实验。

$$\text{细胞增值率} = A_{\text{放射}} / A_{\text{放射剂量 0 Gy}}$$

1.3.4 平板克隆实验检测细胞克隆形成能力 取对数生长期 Eca-109 细胞, 胰蛋白酶消化处理后离心收集细胞, 200 个/孔接种至 6 孔板, 设对照组、丹参酮 II_A 组、放射组、丹参酮 II_A + 放射组、丹参酮 II_A + 放射 + LY294002 组。对照组加常规培养基培养 48 h; 丹参酮 II_A 组加入含丹参酮 II_A (终浓度为丹参酮 II_A 的 IC_{50} , 经前期实验计算 IC_{50} 为 8.75 $\mu\text{mol}/\text{L}$) 的培养基培养 48 h; 放射组加常规培养基培养 48 h 后放射处理 (放射剂量 IC_{50} 进行放射, 经前期实验计算为 4.63 Gy, 剂量率为 1 Gy/min, 即放射时间为 4.63 min); 丹参酮 II_A + 放射组加入含丹参酮 II_A (终浓度 8.75 $\mu\text{mol}/\text{L}$) 的培养基培养 48 h 后放射处理 (放射剂量 4.63 Gy); 丹参酮 II_A + 放射 + LY294002 组加入含丹参酮 II_A (终浓度 8.75 $\mu\text{mol}/\text{L}$) 和 LY294002 (终浓度 25 nmol/L)^[14] 的培养基培养 48 h 后放射处理 (放射剂量 4.63 Gy)。继续培养至肉眼可见克隆集落时终止培养, 甲醛固定

15 min、结晶紫染色 30 min, PBS 溶液清洗后, 显微镜下观察并计数 > 50 个细胞的克隆形成数目。独立重复 3 次实验。

1.3.5 MTT 法检测细胞增殖活力 取对数生长期 Eca-109 细胞, 胰蛋白酶消化后离心收集细胞, 5×10^3 个/孔接种至 96 孔板, 依照 1.3.4 项下分组及各组分别进行干预后, 20 $\mu\text{L}/\text{孔}$ 加入质量浓度 5 mg/mL 的 MTT 溶液, 继续培养 4 h, 弃上清液, 200 $\mu\text{L}/\text{孔}$ 加入 DMSO 混匀后, 通过酶标仪检测 490 nm 处吸光度 (A) 值, 独立重复 3 次实验。

$$\text{细胞增殖活力} = A_{\text{药物}} / A_{\text{对照}}$$

1.3.6 流式细胞术检测细胞凋亡率 取对数生长期 Eca-109 细胞, 胰蛋白酶消化后离心收集细胞, 1×10^5 个/孔接种至 6 孔板, 依照 1.3.4 项下分组及各组分别进行干预后, 应用不含 EDTA 胰蛋白酶消化并离心收集细胞、加入结合液重悬细胞, 依次加入 Annexin V-FITC 染液 (5 $\mu\text{L}/\text{孔}$) 和 PI 染液 (5 $\mu\text{L}/\text{孔}$)、混匀后室温避光孵育 15 min, 通过流式细胞仪分析细胞凋亡率。独立重复 3 次实验。

1.3.7 荧光质粒转染法检测细胞自噬状况 取对数生长期 Eca-109 细胞, 胰蛋白酶消化后离心收集细胞, 1×10^5 个/孔接种至 6 孔板, 依照 1.3.4 项下分组及各组分别进行干预后, 更换常规培养基, 每孔逐滴缓慢加入 “4 μg GFP-LC3 + 10 μL 转染试剂 + 500 μL RPMI-1640 培养基” 混合液, 置于细胞培养箱避光培养 5 h 后更换常规培养基继续培养 48 h, 荧光显微镜下观察自噬体并计数自噬体数目, 独立重复 3 次实验。

1.3.8 RT-PCR 法检测细胞中 PI3K/Akt/mTOR 信号通路相关 mRNA 表达 取对数生长期 Eca-109 细胞, 胰蛋白酶消化后离心收集细胞, 1×10^5 个/孔接种至 6 孔板, 依照 1.3.4 项下分组及各组分别进行干预后, 胰蛋白酶消化后收集细胞, Trizol 法提取总 RNA, 按照试剂盒操作说明, 将 RNA 反转录为 cDNA 后行 RT-PCR 扩增反应, 扩增条件: 95 $^{\circ}\text{C}$ 预变性 10 min, 1 个循环; 95 $^{\circ}\text{C}$ 变性 30 s、60 $^{\circ}\text{C}$ 退火 30 s, 40 个循环。以 GAPDH 作为内参, 采用 $2^{-\Delta\Delta\text{Ct}}$ 法分析目标基因相对表达量。引物序列由上海擎科生物科技公司设计与合成, 见表 1。独立重复 3 次实验。

1.3.9 Western blotting 法检测细胞中 PI3K/Akt/mTOR 信号通路相关蛋白表达 取对数生长期 Eca-109 细胞, 胰蛋白酶消化后离心收集细胞, 1×10^5

表 1 引物序列

Table 1 Primer sequence

引物	序列		扩增长度/bp
	上游 (5'-3')	下游 (5'-3')	
PI3K	AAGCCACGGAACAGCACTCAG	GGAACGAGAGCGAAGTCTTGGGA	109
Akt	AGCGACGTGGCTATTGTGAAG	GCCATCATTCTTGAGGAGGAAGT	215
mTOR	CATCGTGCTGTTGGGTGA	GTCCATCTTCTTGTCGAGGC	273
GAPDH	ATGGGTGTGAACCACGAGA	CAGGGATGATGTTCTGGGCA	229

个/孔接种至 6 孔板, 依照 1.3.4 项下分组及各组分别进行干预后, 胰蛋白酶消化后收集细胞, RIPA 法提取总蛋白, BCA 法检测蛋白含量, 95 °C 水浴 10 min 使蛋白变性, 取每组 30 μg 总蛋白等量上样, 10% SDS-PAGE 电泳分离蛋白 (80 V、30 min, 120 V、60 min)、转 PVDF 膜 (300 mA、120 min)、5% 蛋白封闭液室温封闭 1.5 h, 加一抗稀释液 PI3K (1 : 1 000)、Akt (1 : 1 000)、mTOR (1 : 1 000)、Bcl-2 (1 : 800)、Bax (1 : 800)、Caspase-3 (1 : 1 000)、cleaved Caspase-3 (1 : 1 000)、LC3 (1 : 800)、GAPDH (1 : 2 000) 4 °C 孵育过夜, PBS 洗膜后加二抗稀释液 IgG (1 : 2 000) 室温孵育 1.5 h, PBS 洗膜后加 ECL 显色, 通过 Image J 软件分析蛋白条带灰度值, 以 GAPDH 为内参计算目标蛋白相对表达量。独立重复 3 次实验。

1.4 统计学处理

运用 SPSS 20.0 软件进行统计分析, 计量资料符合正态分布以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 多组间比较采用单因素方差分析, 两两比较采用 LSD-*t* 检验。

2 结果

2.1 不同浓度丹参酮 II_A 和不同放射剂量对 Eca-109 细胞增殖活力的影响

与丹参酮 II_A 0 μmol/L 组相比, 丹参酮 II_A 2、4、8、16、32 μmol/L 组 Eca-109 细胞增殖活力呈剂量相关性降低; 经计算, 丹参酮 II_A 对 Eca-109 细胞 IC₅₀ 为 8.75 μmol/L (作为后续实验丹参酮 II_A 浓度)。与放射剂量 0 Gy 组相比, 放射剂量 1、2、4、6、8 Gy 组 Eca-109 细胞增殖活力呈剂量相关性降低; 经计算, 放射对 Eca-109 细胞 IC₅₀ 为 4.63 Gy (作为后续实验放射剂量), 见图 1。

图 1 不同浓度丹参酮 II_A 和不同放射剂量对 Eca-109 细胞增殖活力的影响 ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

Fig. 1 Effect of different concentrations of tanshinone II_A and different radiation doses on the proliferative activity of Eca-109 cells ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

2.2 丹参酮 II_A 对 Eca-109 细胞克隆形成能力、增殖活力的影响

与对照组相比, 丹参酮 II_A 组、放射组、丹参酮 II_A + 放射组、丹参酮 II_A + 放射 + LY294002 组 Eca-109 细胞克隆形成数目、增殖活力均明显降低 ($P < 0.05$)。与丹参酮 II_A 组或放射组相比, 丹参酮 II_A + 放射组和丹参酮 II_A + 放射 + LY294002 组细胞克隆

形成数目、增殖活力均明显降低 ($P < 0.05$)。与丹参酮 II_A + 放射组相比, 丹参酮 II_A + 放射 + LY294002 组细胞克隆形成数目、增殖活力均明显降低 ($P < 0.05$), 见图 2、3。

2.3 丹参酮 II_A 对 Eca-109 细胞凋亡率的影响

与对照组相比, 丹参酮 II_A 组、放射组、丹参酮 II_A + 放射组、丹参酮 II_A + 放射 + LY294002 组 Eca-

109 的细胞凋亡率明显升高 ($P < 0.05$)。与丹参酮 II_A 组或放射组相比, 丹参酮 II_A + 放射组和丹参酮 II_A + 放射 + LY294002 组凋亡率明显升高 ($P <$

0.05)。与丹参酮 II_A + 放射组相比, 丹参酮 II_A + 放射 + LY294002 组凋亡率明显升高 ($P < 0.05$), 见图 4、5。

图 2 各组 Eca-109 细胞克隆形成能力 (平板克隆实验, $\times 40$)

Fig. 2 Clonal formation ability of Eca-109 cells in each group (plate cloning experiment, $\times 40$)

与对照组比较: * $P < 0.05$; 与丹参酮 II_A 组比较: # $P < 0.05$; 与放射组比较: $\Delta P < 0.05$; 与丹参酮 II_A + 放射组比较: $\blacktriangle P < 0.05$
* $P < 0.05$ vs control group; # $P < 0.05$ vs tanshinone II_A group; $\Delta P < 0.05$ vs radiation group; $\blacktriangle P < 0.05$ vs tanshinone II_A + radiation group

图 3 各组 Eca-109 细胞克隆形成数目、增殖活力的比较 ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

Fig. 3 Comparison of clonal formation number and proliferation activity of Eca-109 cells in each group ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

图 4 各组 Eca-109 细胞凋亡状况 (流式细胞术)

Fig. 4 Apoptosis of Eca-109 cells in each group (flow cytometry)

2.4 丹参酮 II_A 对 Eca-109 细胞自噬状况的影响

与对照组相比, 丹参酮 II_A 组、放射组、丹参酮 II_A + 放射组、丹参酮 II_A + 放射 + LY294002 组细胞中自噬体数目明显升高 ($P < 0.05$)。与丹参酮 II_A 组或放射组相比, 丹参酮 II_A + 放射组和丹参酮 II_A + 放射 + LY294002 组自噬体数目明显升高 ($P <$

0.05)。与丹参酮 II_A + 放射组相比, 丹参酮 II_A + 放射 + LY294002 组自噬体数目明显升高 ($P < 0.05$)。见图 6、7。

2.5 丹参酮 II_A 对 Eca-109 细胞 PI3K、Akt、mTOR mRNA 表达量的影响

与对照组相比, 丹参酮 II_A 组、放射组、丹参酮

与对照组比较: * $P < 0.05$; 与丹参酮 II_A组比较: # $P < 0.05$; 与放射组比较: Δ $P < 0.05$; 与丹参酮 II_A+放射组比较: ▲ $P < 0.05$
 * $P < 0.05$ vs control group; # $P < 0.05$ vs tanshinone II_A group; Δ $P < 0.05$ vs radiation group; ▲ $P < 0.05$ vs tanshinone II_A + radiation group

图 5 各组 Eca-109 细胞凋亡率的比较 ($\bar{x} \pm s, n = 3$)
 Fig. 5 Comparison of apoptosis rate of Eca-109 cells in each group ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

图 6 各组 Eca-109 细胞自噬状况 (×400)

Fig. 6 Autophagy status of Eca-109 cells in each group (×400)

图 7 各组 Eca-109 细胞自噬体数目的比较 ($\bar{x} \pm s, n = 3$)
 Fig. 7 Comparison of number of autophagosomes of Eca-109 cells in each group ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

与丹参酮 II_A+放射组相比, 丹参酮 II_A+放射+LY294002 组 PI3K、Akt、mTOR 蛋白表达量明显降低 ($P < 0.05$), 见图 9。

2.7 丹参酮 II_A 对 Eca-109 细胞 Bcl-2、Bax、Caspase-3、cleaved Caspase-3、LC3-I、LC3-II 蛋白表达量的影响

与对照组相比, 丹参酮 II_A 组、放射组、丹参酮 II_A+放射组、丹参酮 II_A+放射+LY294002 组 Eca-

II_A+放射组、丹参酮 II_A+放射+LY294002 组 Eca-109 细胞 PI3K、Akt、mTOR mRNA 表达量明显降低 ($P < 0.05$)。与丹参酮 II_A 组或放射组相比, 丹参酮 II_A+放射组和丹参酮 II_A+放射+LY294002 组 PI3K、Akt、mTOR mRNA 表达量明显降低 ($P < 0.05$)。与丹参酮 II_A+放射组相比, 丹参酮 II_A+放射+LY294002 组 PI3K、Akt、mTOR mRNA 表达量明显降低 ($P < 0.05$), 见图 8。

2.6 丹参酮 II_A 对 Eca-109 细胞 PI3K、Akt、mTOR 蛋白表达量的影响

与对照组相比, 丹参酮 II_A 组、放射组、丹参酮 II_A+放射组、丹参酮 II_A+放射+LY294002 组 Eca-109 细胞 PI3K、Akt、mTOR 蛋白表达量明显降低 ($P < 0.05$)。与丹参酮 II_A 组或放射组相比, 丹参酮 II_A+放射组和丹参酮 II_A+放射+LY294002 组 PI3K、Akt、mTOR 蛋白表达量明显降低 ($P < 0.05$)。

109 细胞 Bcl-2、Bax、cleaved Caspase-3、LC3-I、LC3-II 蛋白表达量及 Bax/Bcl-2、cleaved Caspase-3/Caspase-3、LC3-II/LC3-I 明显升高 ($P < 0.05$)。与丹参酮 II_A 组或放射组相比, 丹参酮 II_A+放射组和丹参酮 II_A+放射+LY294002 组 Bcl-2、Bax、Cleaved Caspase-3、LC3-I、LC3-II 蛋白表达量及 Bax/Bcl-2、cleaved Caspase-3/Caspase-3、LC3-II/LC3-I 明显升高 ($P < 0.05$)。与丹参酮 II_A+放射组相比, 丹参酮 II_A+放射+LY294002 组 Bcl-2、Bax、cleaved Caspase-3、LC3-I、LC3-II 蛋白表达量及 Bax/Bcl-2、cleaved Caspase-3/Caspase-3、LC3-II/LC3-I 明显升高 ($P < 0.05$), 见图 10~12。

3 讨论

我国为食管癌高发地区之一, 2020 年数据显示我国食管癌新确诊病例和死亡病例均超过 30 万例, 是严重威胁我国居民生命健康的主要恶性肿瘤之一^[3]。目前, 手术切除仍是临床治疗食管癌的首选方案, 但由于食管癌发病隐匿、缺乏典型的临床症状和体征, 超过 70% 的患者确诊时已错过手术根治

与对照组比较: * $P < 0.05$; 与丹参酮 II_A 组比较: # $P < 0.05$; 与放射组比较: $\Delta P < 0.05$; 与丹参酮 II_A + 放射组比较: $\blacktriangle P < 0.05$
* $P < 0.05$ vs control group; # $P < 0.05$ vs tanshinone II_A group; $\Delta P < 0.05$ vs radiation group; $\blacktriangle P < 0.05$ vs tanshinone II_A + radiation group

图 8 各组 Eca-109 细胞 PI3K、Akt、mTOR mRNA 表达量的比较 ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

Fig. 8 Comparison of mRNA expression of PI3K, Akt, mTOR of Eca-109 cells in each group ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

与对照组比较: * $P < 0.05$; 与丹参酮 II_A 组比较: # $P < 0.05$; 与放射组比较: $\Delta P < 0.05$; 与丹参酮 II_A + 放射组比较: $\blacktriangle P < 0.05$
* $P < 0.05$ vs control group; # $P < 0.05$ vs tanshinone II_A group; $\Delta P < 0.05$ vs radiation group; $\blacktriangle P < 0.05$ vs tanshinone II_A + radiation group

图 9 各组 Eca-109 细胞 PI3K、Akt、mTOR 蛋白表达量的比较 ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

Fig. 9 Comparison of the protein expression of PI3K, Akt, mTOR of Eca-109 cells in each group ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

的机会, 放射治疗为该部分患者的主要治疗方式, 也是食管癌术后辅助治疗的重要手段, 然而肿瘤细胞放疗敏感性降低限制了食管癌放疗效果。因此, 寻找高效、低毒的放疗增敏剂对提高食管癌疗效具有重要意义。

丹参酮 II_A 是从中药丹参中提取的一种脂溶性共轭醌、酮类化合物^[15], 研究证实, 丹参酮 II_A 可通过促进肿瘤细胞凋亡与自噬对胆管癌、胶质瘤等起到抑制作用, 并可提高喉癌细胞化疗敏感性, 作用机制与调控 PI3K/Akt/mTOR 通路有关^[9-10, 12]。本研究结果显示, 丹参酮 II_A + 放射组对人食管鳞状细胞癌 Eca-109 细胞克隆形成能力、增殖活力的抑制作用及细胞凋亡、自噬的促进作用明显优于丹参酮

II_A 和放射组, 并且 PI3K 抑制剂 LY294002 可明显增强丹参酮 II_A + 放射组对 Eca-109 细胞克隆形成能力、增殖活力、凋亡、自噬的调控作用。提示丹参酮 II_A 可提高人食管癌细胞放疗敏感性, 作用机制可能与 PI3K/Akt/mTOR 信号通路有关。

细胞凋亡和自噬受阻是恶性肿瘤发生发展的关键因素, 也是肿瘤治疗的重要靶点^[16]。Bcl-2 家族蛋白参与调控细胞线粒体凋亡途径, 其中 Bcl-2 和 Bax 定位于线粒体膜, Bax 可正向调控线粒体膜通透性转变孔 (mPTP) 开放度, 使大量细胞色素 C 通过 mPTP 由线粒体移入细胞质, 细胞色素 C 诱导活化 Caspase-3, Cleaved Caspase-3 可促进 DNA 裂解并抑制 DNA 修复, 从而促进细胞凋亡^[17]。bcl-2 负

A-对照 B-丹参酮 II_A C-放射 D-丹参酮 II_A+放射 E-丹参酮 II_A+放射+LY294002

A-control B-tanshinone II_A C-radiation D-tanshinone II_A + radiation E-tanshinone II_A + radiation + LY294002

图 10 各组 Eca-109 细胞 Bcl-2、Bax、Caspase-3、cleaved-Caspase-3、LC3-I、LC3-II 蛋白表达电泳图

Fig. 10 Electrophoretic images of the protein expression bcl-2, Bax, Caspase-3, Cleaved Caspase-3, LC3-I, LC3-II of Eca-109 cells in each group

向调控 mPTP 开放度而抑制细胞凋亡，并可与 Bax 结合成无生物活性的异源二聚体化合物，因此 Bax/bcl-2 表达比值也能体现 Bcl-2 家族蛋白对细胞凋亡的调节作用^[18]。定位于自噬小体膜的 LC3 为细胞自噬活性的标志蛋白，自噬发生后，无活性的 LC3-I 亚型将转化为具备促自噬活性的 LC3-II 亚型，因此 LC3-II/LC3-I 表达比值能够体现细胞自噬水平^[19]。PI3K/Akt/mTOR 信号通路参与调控增殖、分化、凋亡、自噬等细胞生物学过程。刘兰等^[20]报道 Akt 可抑制 Caspase-3 活化，进而阻滞细胞凋亡。mTOR 为 Akt 下游靶蛋白，Akt 可诱导 mTOR 表达与活化，活化 mTOR 可抑制 LC3-I 亚型向 LC3-II 亚型转化，从而阻滞细胞自噬^[21]。Deng 等^[22]报道通过药物抑制 PI3K/Akt/mTOR 信号通路可有效促进食管癌细胞凋亡与自噬。本研究结果显示，丹参酮 II_A+放射组对 Eca-109 细胞 PI3K、Akt、mTOR mRNA 和蛋白表达的抑制作用，以及对 Bax/bcl-2、Cleaved Caspase-3/Caspase-3、LC3-II/LC3-I 表达比值的降低作用明显优于丹参酮 II_A 和放射组，并且 LY294002 可明显增强丹参酮 II_A+放射组对 Eca-109 细胞 PI3K/Akt/mTOR 信号通路相关 mRNA 和蛋白表达

与对照组比较: * $P < 0.05$; 与丹参酮 II_A 组比较: # $P < 0.05$; 与放射组比较: ^ $P < 0.05$; 与丹参酮 II_A+放射组比较: ^# $P < 0.05$
* $P < 0.05$ vs control group; # $P < 0.05$ vs tanshinone II_A group; ^ $P < 0.05$ vs radiation group; ^# $P < 0.05$ vs tanshinone II_A + radiation group

图 11 各组 Eca-109 细胞 Bcl-2、Bax、Caspase-3、cleaved Caspase-3、LC3-I、LC3-II 蛋白表达量 ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

Fig. 11 Comparison of the protein expression of Bcl-2, Bax, Caspase-3, cleaved Caspase-3, LC3-I, LC3-II of Eca-109 cells in each group ($\bar{x} \pm s, n = 3$)

的调控作用。提示丹参酮 II_A 可能通过下调 PI3K/Akt/mTOR 信号通路，进而增强人食管癌细胞放疗敏感性。

综上所述，丹参酮 II_A 可能通过下调 PI3K/Akt/mTOR 信号通路，抑制细胞增殖并促进其凋亡与自噬，进而增强人食管癌细胞放疗敏感性。本研究结

与对照组比较: * $P < 0.05$; 与丹参酮 II_A 组比较: # $P < 0.05$; 与放射组比较: $\Delta P < 0.05$; 与丹参酮 II_A + 放射组比较: $\blacktriangle P < 0.05$
 $*P < 0.05$ vs control group; # $P < 0.05$ vs tanshinone II_A group; $\Delta P < 0.05$ vs radiation group; $\blacktriangle P < 0.05$ vs tanshinone II_A + radiation group

图 12 各组 Bax/Bcl-2、cleaved-Caspase-3/Caspase-3、LC3-II/LC3-I 的比较 ($\bar{x} \pm s$, $n = 3$)

Fig. 12 Comparison of ratio of Bax/Bcl-2, cleaved-Caspase-3/Caspase-3, LC3-II/LC3-I of Eca-109 cells in each group ($\bar{x} \pm s$, $n = 3$)

果为丹参酮 II_A 用作食管癌放疗辅助药物提供了理论依据, 但其作用机制尚需进一步研究。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

- [1] 赫捷, 陈万青, 李兆申, 等. 中国食管癌筛查与早诊早治指南 (2022, 北京) [J]. 中国肿瘤, 2022, 31(6): 401-436.
- [2] 路大鹏, 赵卫林, 王玉强, 等. 食管癌生存随访调查及列线图预后预测模型的建立 [J]. 癌变·畸变·突变, 2023, 35(1): 37-42.
- [3] 宋颂, 雷林, 刘涵, 等. 中国人群食管癌疾病负担: 多数据源证据汇总及分析 [J]. 中华肿瘤防治杂志, 2023, 30(15): 887-896.
- [4] 龚盈盈, 谢玲, 朱圣明, 等. 丁香提取物对放射抗拒食管癌细胞的体外抗肿瘤作用及机制研究 [J]. 华西医学, 2021, 36(1): 66-75.
- [5] 刘洋, 熊伟, 米蕊. 中晚期食管癌 AKR1C3、LEF1 表达与放疗敏感性及预后的关系分析 [J]. 临床和实验医学杂志, 2021, 20(4): 368-371.
- [6] 赵小涵, 王鹤松, 宋春洋, 等. ARL5B 对食管癌细胞放疗敏感性的影响及机制研究 [J]. 中华肿瘤防治杂志, 2023, 30(15): 912-920.
- [7] Zhang W, Liu C, Li J, et al. Tanshinone II_A: New perspective on the anti-tumor mechanism of a traditional natural medicine [J]. *Am J Chin Med*, 2022, 50(1): 209-239.
- [8] Sun R, Zhai R, Ma C, et al. Combination of aloin and metformin enhances the antitumor effect by inhibiting the growth and invasion and inducing apoptosis and autophagy in hepatocellular carcinoma through PI3K/AKT/mTOR pathway [J]. *Cancer Med*, 2020, 9(3): 1141-1151.
- [9] Liu H, Liu C, Wang M, et al. Tanshinone II_A affects the malignant growth of Cholangiocarcinoma cells by inhibiting the PI3K-Akt-mTOR pathway [J]. *Sci Rep*, 2021, 11(1): 19268.
- [10] Ding L, Ding L, Wang S, et al. Tanshinone II_A affects autophagy and apoptosis of glioma cells by inhibiting phosphatidylinositol 3-Kinase/Akt/Mammalian target of rapamycin signaling pathway [J]. *Pharmacology*, 2017, 99(3-4): 188-195.
- [11] 王海叶, 邢瑞敏, 马欣, 等. 丹参酮 II_A 通过抑制 PI3K/Akt/mTOR 信号通路促进人喉癌 Hep-2 细胞凋亡和自噬的研究 [J]. 现代中西医结合杂志, 2023, 32(3): 308-314.
- [12] 吴庭艳, 戴景芳, 张强, 等. 丹参酮 II_A 通过抑制 PI3K/Akt 通路逆转人喉癌细胞顺铂耐药的机制研究 [J]. 现代药物与临床, 2022, 37(9): 1938-1944.
- [13] Ding L, Wang S, Qu X, et al. Tanshinone II_A sensitizes oral squamous cell carcinoma to radiation due to an enhanced autophagy [J]. *Environ Toxicol Pharmacol*, 2016, 46: 264-269.
- [14] 宋岩, 刘秀萍, 白伟良, 等. LY294002 联合顺铂阻断 PI3K-Akt 通路诱导喉癌 Hep-2 细胞凋亡研究 [J]. 实用肿瘤杂志, 2013, 28(2): 132-134.
- [15] 冯科冉, 李伟霞, 王晓艳, 等. 丹参化学成分、药理作用及其质量标志物(Q-Marker)的预测分析 [J]. 中草药, 2022, 53(2): 609-618.
- [16] El Mashed S, O'Donovan T R, Kay E, et al. Apoptosis and autophagy markers predict survival in neoadjuvant treated oesophageal adenocarcinoma patients [J]. *BMC Cancer*, 2022, 22(1): 908.

- [17] Hu Z, Lai Y, Ma C, *et al.* *Cordyceps militaris* extract induces apoptosis and pyroptosis via caspase-3/PARP/GSDME pathways in A549 cell line [J]. *Food Sci Nutr*, 2021, 10(1): 21-38.
- [18] Cahyadi A, Ugrasena I D G, Andarsini M R, *et al.* Relationship between Bax and Bcl-2 protein expression and outcome of induction phase chemotherapy in pediatric acute lymphoblastic leukemia [J]. *Asian Pac J Cancer Prev*, 2022, 23(5): 1679-1685.
- [19] Li X, Dai Z, Wu X, *et al.* The comprehensive analysis identified an autophagy signature for the prognosis and the immunotherapy efficiency prediction in lung adenocarcinoma [J]. *Front Immunol*, 2022, 13: 749241.
- [20] 刘兰, 张东雪, 朱荣芳, 等. 高磷通过 SET8-shRNA 调控 AKT/Caspase-3 通路促进血管平滑肌细胞凋亡 [J]. *山西医科大学学报*, 2021, 52(10): 1312-1318.
- [21] Kuşçu G C, Gürel Ç, Buhur A, *et al.* The regulatory effects of clomiphene and tamoxifen on mTOR and LC3-II expressions in relation to autophagy in experimental polycystic ovary syndrome (PCOS) [J]. *Mol Biol Rep*, 2022, 49(3): 1721-1729.
- [22] Deng L, Wu X, Zhu X, *et al.* Combination effect of curcumin with docetaxel on the PI3K/AKT/mTOR pathway to induce autophagy and apoptosis in esophageal squamous cell carcinoma [J]. *Am J Transl Res*, 2021, 13(1): 57-72.

[责任编辑 高源]