抑制电导离子色谱法测定醋酸钙颗粒中钙离子

葛薇薇, 吴珺, 朱静*

泰州市药品检验院, 江苏 泰州 235500

摘要: 目的 建立采用抑制电导离子色谱法测定醋酸钙颗粒中钙离子的方法。方法 采用 Dionex IonPac™ CS12A 色谱柱 (250 mm×4 mm), Dionex IonPac™ CG12A 保护柱 (50 mm×4 mm), 以 0.02 mol/L 甲烷磺酸溶液为洗脱液, 体积流量 1.0 mL/min, 柱温 30 °C, 检测池温度 35 °C, 电导检测器, 抑制器为 Dionex CDRS 600 4 mm, 电流值 59 mA, 进样体积为 25 μL。结果 钙在 0.002~6.000 μg/mL 线性关系良好 ($r=0.9997$), 平均回收率为 104.6%, RSD 值为 1.8%。结论 方法简单、专属性高、准确可靠, 能够有效地控制醋酸钙颗粒中钙离子。

关键词: 醋酸钙颗粒; 钙; 抑制电导离子色谱法

中图分类号: R927.1 文献标志码: A 文章编号: 1674-5515(2024)02-0353-04

DOI: 10.7501/j.issn.1674-5515.2024.02.012

Determination of calcium ion in Calcium Acetate Granules by ion chromatography-suppressed conductivity method

GE Weiwei, WU Jun, ZHU Jing

Taizhou Institute for Drug Control, Taizhou 225300, China

Abstract: Objective To establish a method of ion chromatography-suppressed conductivity to determine calcium ion in Calcium Acetate Granules. **Methods** The assay was performed on Dionex IonPac™ CS12A column (250 mm × 4 mm) with Dionex IonPac™ CG12A column (50 mm × 4 mm) as guard column. Mobile phase was used as 0.02 mol/L methanesulfonic acid solution. Flow rate was 1.0 mL/min, column temperature was 30 °C, and detecting pool temperature was 35 °C. Conductivity detector was used with CDRS 600 4 mm as suppressor, current value was 59 mA, and injection volume was 25 μL. **Results** Calcium showed good linear relationships of 0.002—6.000 μg/mL ($r=0.9997$), whose average recovery was 104.6% with RSD values of 1.8%. **Conclusion** The method is simple, highly specific, accurate and reliable, and can effectively control calcium ion in Calcium Acetate Granules.

Key words: Calcium Acetate Granules; calcium; ion chromatography-suppressed conductivity

醋酸钙属于有机酸钙, 溶解性优于无机酸钙, pH 值接近中性, 对胃肠的刺激较小。醋酸钙颗粒在临床上用于治疗高磷血症, 作为钙补充剂用于预防和治疗钙缺乏症, 如骨质疏松症、佝偻病以及儿童、妊娠妇女和哺乳期妇女、绝经期妇女、老年人钙的补充^[1-3]。离子色谱法是采用高压输液泵将洗脱液泵入色谱柱中, 对可解离物质进行分析测定的色谱方法, 灵敏度高, 洗脱液简单环保, 广泛用于测定无机阴离子、无机阳离子、有机酸、糖类等成分^[4-6]。离子色谱法中常使用抑制型电导检测器, 在抑制器置于检测器之前, 利用离子交换的原理, 将具有较高电导率的洗脱液中和成具有极低电导率的水或

其他较低电导率的溶液, 从而降低洗脱液背景电导, 显著提高电导检测的灵敏度^[7]。目前测定钙离子的方法主要有原子吸收光谱法、电感耦合等离子体光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、离子色谱法和络合滴定法^[8-10], 其中前 3 种方法可用于痕量元素分析, 操作繁琐, 化学试剂消耗较多, 对试验环境要求高, 离子色谱法操作简单, 能减少化学试剂的使用, 有利于环保。国家药品标准采用 EDTA 络合滴定法测定醋酸钙颗粒中的醋酸钙^[11], 所用滴定液需要经过准确标定后方可使用, 滴定液标定、供试品滴定过程中影响测定结果的因素较多, 如溶液 pH 值、指示剂用量、溶液中二氧化碳

收稿日期: 2023-12-28

作者简介: 葛薇薇, 女, 副主任药师, 从事药物分析工作。E-mail: 171484225@qq.com

*通信作者: 朱静, 女, 副主任药师, 硕士, 从事药物分析工作。E-mail: jingzhz@126.com

含量、金属离子和实验人员对终点颜色变化的判断等。本实验建立了抑制电导离子色谱法测定醋酸钙颗粒中钙离子，方法简单、专属性高、准确可靠，能够有效地控制醋酸钙颗粒中钙离子。

1 仪器与材料

Thermo ICS-6000 离子色谱仪，Dionex CDRS 600 4 mm 抑制器（赛默飞）；XP205DR 型电子天平（梅特勒）；Reference 型超纯水仪（Milli-Q）。钙元素标准溶液（国家有色金属及电子材料分析测试中心，批号 228018-8，质量浓度为 1 000 μg/mL）；醋酸钙颗粒（昆明邦宇制药有限公司，批号 20230801、20221003、20230105；濮阳市仲亿药业有限公司，批号 221114），规格均含醋酸钙 200 mg/袋，相当于钙 50.7 mg。

2 方法与结果

2.1 色谱条件

采用 Dionex IonPac™ CS12A 色谱柱（250 mm×4 mm），Dionex IonPac™ CG12A 保护柱（50 mm×4 mm）；以 0.02 mol/L 甲烷磺酸溶液为洗脱液，体积流量 1.0 mL/min，柱温 30 °C，检测池温度 35 °C，电导检测器，抑制器为 Dionex CDRS 600 4 mm，电流值 59 mA，进样体积为 25 μL。

2.2 专属性试验

取钙元素标准溶液适量，用水稀释制成 5 μg/mL 的溶液，作为对照品溶液；取醋酸钙颗粒（批号 20230801）适量，用水溶解并稀释制成含钙离子 5 μg/mL 的溶液，作为供试品溶液。分别精密量取空白溶剂（水）、对照品溶液和供试品溶液各 25 μL，注入离子色谱仪，记录色谱图，见图 1。结果表明空白溶剂在钙离子出峰处无干扰，对照品溶液和供试品溶液中钙离子与其他色谱峰分离度良好，无其他离子干扰。

2.3 线性关系与范围

取钙标准溶液适量，用水稀释制成 50 μg/mL 的溶液，作为贮备液。分别精密量取贮备液适量，用水稀释制成含钙分别为 0.002、0.10、1.00、2.00、4.00、5.00、6.00 μg/mL 的线性溶液，精密量取上述溶液各 25 μL，注入离子色谱仪，记录色谱图。以质量浓度为横坐标、峰面积为纵坐标进行线性回归，计算得回归方程 $Y=18.02X+1.211$ ， $r=0.9997$ ，结果表明钙在 0.002~6.000 μg/mL 线性关系良好。

2.4 定量限和检测限

取钙标准溶液逐级稀释，按信噪比 $S/N \geq 10$ ：

图 1 空白溶剂 (A)、钙元素标准溶液 (B) 和醋酸钙颗粒 (C) 的离子色谱图

Fig. 1 IC chromatograms of blank solution (A), calcium standard solution (B), and Calcium Acetate Granules (C)

1 作为定量限溶液，信噪比 $S/N \geq 3:1$ 作为检测限溶液，结果定量限质量浓度为 0.002 μg/mL，检测限质量浓度为 0.001 μg/mL。

2.5 精密度试验

取 2.2 项下对照品溶液连续进样 6 针，记录峰面积、保留时间，结果钙离子保留时间的 RSD 值为 0.05%，峰面积的 RSD 值为 0.2%。

2.6 重复性试验

按 2.2 项下平行制备对照品溶液 2 份，作为对照品溶液；精密称取醋酸钙颗粒（批号 20230801）适量，用水溶解并稀释制成含钙离子 5 μg/mL 的溶液，作为供试品溶液，平行制备 6 份。精密量取供试品溶液和对照品溶液各 25 μL，注入离子色谱仪，记录色谱图。醋酸钙颗粒样品中钙离子的平均质量分数为 255.0 mg/g，RSD 值为 1.3%。

2.7 中间精密度试验

精密称取醋酸钙颗粒（批号 20230801）适量，按 2.6 项下对照品溶液、供试品溶液制备方法，由不同的分析人员隔天制备，测定，计算钙离子的质量分数，将结果与 2.6 项下结果共同统计，12 份醋酸钙颗粒样品中钙离子的平均质量分数为 254.5 mg/g，RSD 值为 1.6%。

2.8 准确度试验

取钙元素标准溶液适量，用水稀释制成 50 μg/mL 的溶液，作为对照品贮备液，用水稀释制成 5.0 μg/mL 的溶液，作为对照品溶液。精密称取醋酸

钙颗粒(批号 20230801)适量,用水溶解并稀释制成含钙离子 50 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的溶液,作为供试品贮备液。分别精密量取 2 mL 供试品贮备液、对照品贮备液,置 50 mL 量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,制备 3 份,作为 80% 准确度溶液;精密量取 5 mL 供试品贮备液、对照品贮备液置 100 mL 量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,制备 3 份,作为 100% 准确度溶液;精密量取 3 mL 供试品贮备液、对照品贮备液,置 50 mL 量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,制备 3 份,作为 120% 准确度溶液。精密量取上述溶液各 25 μL ,注入离子色谱仪,记录色谱图,结果钙的平均回收率为 104.6%, RSD 值为 1.8%。

2.9 耐用性试验

为考察方法本身对于可变试验因素的干扰能力,需要考察方法的耐用性,考察的因素主要包括体积流量($\pm 0.1 \text{ mL}/\text{min}$)、柱温($\pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$)、洗脱液浓度($\pm 2 \text{ mmol}/\text{L}$)。按 2.2 项下方法制备对照品溶液和醋酸钙颗粒供试品溶液(批号 20230801),注入离子色谱仪,记录色谱图,标准条件钙离子的质量分数为 255.0 mg/g ,其他各条件与标准条件比值为 98.6%~101.1%,可见该法耐用性良好,更改上述参数,对钙的测定无影响。

2.10 样品测定

按 2.2 项下方法配制对照品溶液和不同批次醋酸钙颗粒供试品溶液,分别平行配制 2 份,精密量取上述溶液各 25 μL ,注入离子色谱仪,记录色谱图,按外标法以峰面积计算钙离子的质量分数,结果见表 1。取装量差异项下醋酸钙颗粒内容物,混合均匀,精密称取适量(约相当于醋酸钙 0.15 g),加水 100 mL 溶解后,加氢氧化钠试液 15 mL、钙紫红素指示剂约 0.1 g,用 0.05 mol/L 乙二胺四乙酸二钠滴定液滴定,至溶液自粉红色变为蓝紫色。EDTA 络合滴定法测定醋酸钙颗粒中醋酸钙应为标示量的 90%~110%,折算含钙离子 228.2~278.8 mg/g ^[11]。两种方法测定结果均符合限度要求,滴定法测得的结果偏高于离子色谱法。

3 讨论

本实验比较水、盐酸溶液、氢氧化钠溶液对醋酸钙颗粒中钙离子的提取效果,结果以水、盐酸溶液作为溶剂时能将钙离子完全提取,而醋酸钙颗粒说明书中用法为温开水冲服,基于临床应用的基础上,本实验选择水作为溶剂。为了避免实验过程中引入微量阳离子影响测定结果,实验中所用到的水

表 1 醋酸钙颗粒中钙离子的测定结果比较 ($n=2$)

Table 1 Comparison on calcium ion in Calcium Acetate Granules ($n=2$)

批号	钙离子/ (mg g^{-1})	
	离子色谱法	滴定法
20230801	255.0	266.1
20221003	255.5	262.8
20230105	252.7	261.6
221114	254.0	259.4

均为超纯水,烧杯、量瓶、量筒等器具均为聚四氟乙烯材质,并用超纯水清洗干净,将干扰降至最低,保证实验结果准确性。

用淋洗液自动发生装置产生的高纯度甲磺酸为洗脱液,采用阳离子交换-抑制电导进行检测,可以得到低背景电导,提高测定灵敏度。根据色谱条件,离子色谱仪软件计算出抑制电流为 59~81 mA,经实验考察,59 mA 电流能够有效抑制背景电导,得到信号值较低,且平稳的基线,故设定抑制电流为 59 mA。

采用 EDTA 络合滴定法测定醋酸钙颗粒中醋酸钙,加入氢氧化钠试液、钙紫红素指示剂后,溶液颜色较深,滴定终点溶液颜色变化显色不明显,终点读数时人为误差较大,影响滴定结果的准确度,建议适当减少指示剂的加入量。由于在加入的试剂中可能混杂有金属离子而消耗滴定液,导致滴定结果偏高,建议滴定时用空白试验校正。采用离子色谱法测定醋酸钙颗粒中钙离子时,离子色谱柱的分离作用、电导检测器的选择性能有效消除其他成分的干扰,供试品溶液仅需用水溶解并滤过即可进样分析,样品前处理简便快速,避免其他金属离子的干扰,专属性强。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

- [1] Liu Z, Sun X, Liang T. Preparation and characterization of the biological compound Effervescent Granule of Calcium Acetate [J]. *Curr Pharm Biotechnol*, 2019, 20(11): 934-944.
- [2] 马子力,李凯颖. 醋酸钙颗粒联合维生素 D 滴剂治疗营养性佝偻病的临床效果 [J]. *临床合理用药*, 2023, 16(34): 102-105.
- [3] 韩伟,冯伟勋,杨明方,等. 碳酸司维拉姆联合醋酸钙治疗维持性血液透析后高磷血症疗效观察 [J]. *中国药业*, 2022, 31(4): 102-105.

- [4] 邵方娴, 储婧, 陈民辉, 等. 离子色谱法测定聚苯乙烯磺酸钙散剂中的钠、钙含量及钾交换量 [J]. 药物分析杂志, 2022, 42(9): 1570-1576.
- [5] 朱静, 戴冬艳, 吴珺. 离子色谱-抑制电导法测定硫酸镁钠钾口服用浓溶液中镁、钠、钾离子 [J]. 现代药物与临床, 2023, 38(7): 1644-1647.
- [6] 戴冬艳, 朱静, 吴珺, 等. 离子色谱法测定口服补液盐散(III)中总氯和枸橼酸钠 [J]. 现代药物与临床, 2023, 38(6): 1374-1377.
- [7] 中国药典 [S]. 四部. 2020: 65.
- [8] 伍伟聪, 郭雅娟, 王淼, 等. 药用辅料氧化镁中氧化钙测定方法的改进 [J]. 中国药品标准, 2022, 23(5): 486-489.
- [9] 周学忠, 刘宏伟. 采用 ICP-MS/MS 准确测定食品中钙和氯 [J]. 光谱学与光谱分析, 2018, 38(11): 3567-3571.
- [10] 李珺, 王佩强. ICP-OES 法同时测定葡萄糖酸钙锌口服溶液中钙离子和锌离子的含量 [J]. 中国药品标准, 2021, 22(4): 356-359.
- [11] 国家食品药品监督管理局国家药品标准 [S]. WS-10001-(HD-0095)-2002.

[责任编辑 解学星]