HPLC 法测定威喜丸中猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸

赵丹¹, 魏谭军^{1*}, 晏明英¹, 唐启荣¹, 何人大¹, 岳剑东¹, 刘岩庭²

1. 达州市中西医结合医院, 四川 达州 635000

2. 福建省食品药品质量检验研究院, 福建 福州 350001

摘要: 目的 建立 HPLC 波长切换法同时测定威喜丸中猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸的方法。方法 采用 Agilent Eclipse XDB-C₁₈ 色谱柱 (250 mm×4.6 mm, 5 μm); 流动相: 乙腈-0.05% 磷酸溶液, 梯度洗脱; 0~24.0 min 在 248 nm 波长下检测猪苓酮 B 和猪苓酮 A, 24.0~50.0 min 在 210 nm 波长下检测去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸; 体积流量 1.0 mL/min; 柱温 30 ℃; 进样量为 10 μL。结果 猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸分别在 5.79~115.80、1.66~33.20、3.28~65.60、7.07~141.40、1.46~29.20、0.88~17.60 μg/mL 与峰面积线性关系良好; 平均加样回收率分别为 98.75%、97.60%、98.23%、99.49%、97.10%、96.81%, RSD 值分别为 0.75%、1.66%、1.44%、0.90%、1.15%、1.38%。结论 本方法简便、准确、重复性好, 为威喜丸的质量控制提供了实验依据。

关键词: 威喜丸; 猪苓酮 B; 猪苓酮 A; 去氢土莫酸; 猪苓酸 C; 去氢茯苓酸; 茯苓酸; 高效液相色谱

中图分类号: R286.02 文献标志码: A 文章编号: 1674-5515(2019)01-0027-04

DOI: 10.7501/j.issn.1674-5515.2019.01.006

Determination of polyporusterone B, polyporusterone A, dehydrotumulosic acid, polyporenic acid C, dehydropachymic acid and pachymic acid in Weixi Pills by HPLC

ZHAO Dan¹, WEI Tan-jun¹, YAN Ming-ying¹, TANG Qi-rong¹, HE Ren-da¹, YUE Jian-dong¹, LIU Yan-ting²

1. Dazhou Integrated TCM & Western Medicine Hospital, Dazhou 635000, China

2. Fujian Institute for Food and Drug Quality Control, Fuzhou 350001, China

Abstract: Objective To establish an HPLC with wavelength switching method for determination of polyporusterone B, polyporusterone A, dehydrotumulosic acid, polyporenic acid C, dehydropachymic acid, and pachymic acid in Weixi Pills. **Methods** The separation was carried out on Agilent Eclipse XDB-C₁₈ chromatography column (250 mm × 4.6 mm, 5 μm). The mobile phase consisted of acetonitrile - 0.05% phosphoric acid solution with gradient elution. The detection wavelengths were set at 248 nm in 0 — 24.0 min (determination of polyporusterone B and polyporusterone A) and 210 nm in 24.0 — 50.0 min (determination of dehydrotumulosic acid, polyporenic acid C, dehydropachymic acid and pachymic acid). The flow rate was 1.0 mL/min, temperature of column was set at 30 ℃, and volume of injection was 10 μL. **Results** The linear ranges of polyporusterone B, polyporusterone A, dehydrotumulosic acid, polyporenic acid C, dehydropachymic acid, and pachymic acid were 5.79 — 115.80, 1.66 — 33.20, 3.28 — 65.60, 7.07 — 141.40, 1.46 — 29.20, and 0.88 — 17.60 μg/mL, respectively. The average recoveries were 98.75%, 97.60%, 98.23%, 99.49%, 97.10%, and 96.81%, with RSD 0.75%, 1.66%, 1.44%, 0.90%, 1.15%, and 1.38%. **Conclusion** The method is simple, accurate and reproducible, and provides an experimental basis for the quality control of Weixi Pills.

Key words: Weixi Pills; polyporusterone B; polyporusterone A; dehydrotumulosic acid; polyporenic acid C; dehydropachymic acid; pachymic acid; HPLC

威喜丸来源于中药成方制剂第十三册^[1], 由茯苓、猪苓两味中药加工而成的中成药复方制剂, 具有利湿、补肾固下的功效, 临床上用于肾虚遗精、妇女白带等疾病的治疗。现代研究表明威喜丸对乳

收稿日期: 2018-10-31

作者简介: 赵丹 (1985—), 女, 本科, 主要从事药品质量控制、中药调剂和中药临床合理用药等医院药学相关研究工作。

*通信作者 魏谭军 (1984—), 男, 硕士, 主要从事医院制剂的研究与开发。E-mail: weitanjun635000@163.com

糜尿、白带等治疗效果明显^[2-3]。方中猪苓为多孔菌科真菌猪苓的干燥菌核，性平，味甘淡，具有利水渗湿的功效，临床上主要用于治疗泌尿系统疾病，主要含有多糖、甾体、萜醌类等化学成分，其中猪苓酮 B、猪苓酮 A 为其甾酮类主要成分^[4]。茯苓为多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核，性平，味甘淡，具有利水渗湿、健脾宁心的功效，主要含有多糖类、三萜类、甾体类、挥发性成分、脂肪酸等成分，其中去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸等三萜类化合物为其主要药效组分^[4]。现行质量标准中未对方中两味中药中的任一成分进行定量检测。为全面控制和提高本品的内在质量，本研究拟采用 HPLC 波长切换技术对威喜丸中猪苓所含主要成分猪苓酮 B 和猪苓酮 A、茯苓所含主要成分去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸进行同时测定，以期通过多指标成分定量控制的方法，提高和完善威喜丸的质量标准。

1 仪器与材料

1.1 仪器

Agilent 1100 型高效液相色谱仪(美国安捷伦科技有限公司); BT25S 型电子分析天平(北京赛多利斯科学仪器有限公司); KQ5200DA 型超声波清洗机(昆山市超声仪器有限公司)。

1.2 试剂

去氢土莫酸(批号 6754-16-1, 质量分数 98.0%)、猪苓酸 C(批号 465-18-9, 质量分数 98.0%) 对照品均购自南京森贝伽生物科技有限公司; 去氢茯苓酸对照品(批号 77012-31-8, 质量分数 99.0%) 购自成都普瑞法科技开发有限公司; 茯苓酸对照品(批号 29070-92-6, 质量分数 98.0%) 购自上海纯优生物科技有限公司; 猪苓酮 B(批号 141360-89-6, 质量分数 99.0%)、猪苓酮 A(批号 141360-88-5, 质量分数 99.0%) 对照品均购自上海江莱生物科技有限公司。乙腈为色谱纯, 其他试剂均为分析纯; 威喜丸(上海雷允上药业有限公司生产, 每 50 粒质量约 3 g, 批号分别为 170204、170504、170505)。

2 方法与结果

2.1 色谱条件

Agilent Eclipse XDB-C₁₈ 色谱柱(250 mm×4.6 mm, 5 μm); 流动相: 乙腈(A) - 0.05% 磷酸溶液(B), 梯度洗脱(0~11.0 min, 25.0% A; 11.0~24.0 min, 25.0% A→57.0% A; 24.0~43.0 min, 57.0%

A→90.0% A; 43.0~50.0 min, 90.0% A→25.0% A); 0~24.0 min 在 248 nm^[5] 波长下检测猪苓酮 B 和猪苓酮 A, 24.0~50.0 min 在 210 nm^[6-7] 波长下检测去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸; 体积流量 1.0 mL/min; 柱温 30 °C; 进样量为 10 μL。

2.2 溶液的制备

2.2.1 对照品溶液的制备 精密称取猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸对照品各适量, 分别用甲醇溶解, 制成 6 个单成分对照品储备液(猪苓酮 B 1.158 mg/mL、猪苓酮 A 0.332 mg/mL、去氢土莫酸 0.656 mg/mL、猪苓酸 C 1.414 mg/mL、去氢茯苓酸 0.292 mg/mL、茯苓酸 0.176 mg/mL); 分别精密吸取 6 个单成分对照品储备液各适量, 用甲醇制成含猪苓酮 B 57.9 μg/mL、猪苓酮 A 16.6 μg/mL、去氢土莫酸 32.8 μg/mL、猪苓酸 C 70.7 μg/mL、去氢茯苓酸 14.6 μg/mL、茯苓酸 8.8 μg/mL 的混合对照品溶液。

2.2.2 供试品溶液的制备 取威喜丸适量, 研细, 称取 3.0 g, 精密称定, 精密加入甲醇 25 mL, 密塞, 称定质量, 采用 KQ 5200DA 型超声波清洗机(功率 200 W, 频率 40 kHz) 超声提取 30 min, 放冷, 再称定质量, 用甲醇补足减失的质量, 摇匀, 滤过, 即得。

2.2.3 阴性样品溶液的制备 按照威喜丸质量标准项下的处方和制法, 分别制备缺猪苓、缺茯苓的阴性样品, 再按照供试品溶液的制备项下方法操作制成对应的 2 种阴性样品溶液。

2.3 专属性试验

分别精密吸取混合对照品溶液、供试品溶液和阴性样品溶液各适量, 按上述色谱条件进样测定, 见图 1。结果表明阴性样品溶液对威喜丸中猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸测定无干扰, 理论塔板数按所测各色谱峰计均大于 3 500, 所测各成分均能达到有效分离, 分离度均大于 1.5。

2.4 线性关系考察

分别精密吸取 6 个单成分对照品储备液各适量, 用甲醇定容制成 25 倍浓度差的 6 个混合对照品溶液, 依法进样检测。以猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸质量浓度为横坐标, 峰面积为纵坐标, 进行线性回归, 计算回归方程, 见表 1。

图1 混合对照品(A)、威喜丸(B)、缺猪苓阴性样品(C)、缺茯苓阴性样品(D)的HPLC图谱
 Fig. 1 HPLC chromatograms of mixed reference substances (A), Weixi Pills (B), negative sample without *Polyporus* (C), and negative sample without *Poria* (D)

表1 各成分的线性关系和线性范围

Table 1 Linear relationship and range of major components

成分	回归方程	r	线性范围/($\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)
猪苓酮 B	$Y=1.9\ 826\times 10^6 X+466.3$	0.999 8	5.79~115.80
猪苓酮 A	$Y=1.1\ 208\times 10^6 X-316.7$	0.999 1	1.66~33.20
去氢土莫酸	$Y=1.3\ 619\times 10^6 X-429.8$	0.999 3	3.28~65.60
猪苓酸 C	$Y=2.1\ 407\times 10^5 X+200.2$	0.999 6	7.07~141.40
去氢茯苓酸	$Y=7.9\ 143\times 10^5 X-380.4$	0.999 8	1.46~29.20
茯苓酸	$Y=9.1\ 308\times 10^5 X-359.9$	0.999 5	0.88~17.60

2.5 精密度试验

精密吸取混合对照品溶液,依法连续6次进样测定,记录猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸的峰面积。结果所测猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸峰面积的RSD值分别为1.11%、0.35%、0.28%、1.04%、1.71%、1.42%。

2.6 重复性试验

取威喜丸样品(批号170204)适量,制备6份供试品溶液,依法进样测定,记录猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸的峰面积,计算各成分的质量分数。结果所测各成分质量分数的RSD值分别为1.69%、0.81%、1.77%、0.58%、0.93%、1.16%。

2.7 稳定性试验

取批号170204威喜丸样品,制备供试品溶液,室温放置,分别在0、2、4、8、16、24 h取样依法测定,记录猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸的峰面积。结果威喜丸供试品溶液在室温下24 h内稳定,猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸峰面积的RSD值分别为1.09%、0.33%、1.21%、1.07%、0.58%、1.45%。

猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸峰面积的RSD值分别为1.09%、0.33%、1.21%、1.07%、0.58%、1.45%。

2.8 加样回收率试验

取威喜丸样品(批号170204)6份,研细,每份1.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,分别精密加入另行制备的对照品溶液(猪苓酮 B 0.739 mg/mL、猪苓酮 A 0.236 mg/mL、去氢土莫酸 0.472 mg/mL、猪苓酸 C 0.947 mg/mL、去氢茯苓酸 0.199 mg/mL和茯苓酸 0.103 mg/mL)各1.0 mL,制备供试品溶液,依法进样测定,计算所测各成分的回收率,结果猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸的平均回收率分别为98.75%、97.60%、98.23%、99.49%、97.10%、96.81%,RSD值分别为0.75%、1.66%、1.44%、0.90%、1.15%、1.38%。

2.9 样品测定

取3批的威喜丸样品(批号170204、170504、170505),各3份,制备供试品溶液,依法进样测定,记录猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸的峰面积,计算所测各成分质量分数,结果见表2。

表 2 威喜丸中猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸的测定结果 ($n = 3$)Table 2 Result of polyporusterone B, polyporusterone A, dehydrotumulosic acid, polyporenic acid C, dehydropachymic acid, and pachymic acid in Weixi Pills ($n = 3$)

批号	质量分数/(mg g ⁻¹)					
	猪苓酮 B	猪苓酮 A	去氢土莫酸	猪苓酸 C	去氢茯苓酸	茯苓酸
170204	0.491	0.157	0.314	0.629	0.135	0.068
170504	0.445	0.134	0.359	0.716	0.148	0.059
170505	0.510	0.171	0.284	0.599	0.117	0.076

3 讨论

3.1 色谱条件的确定

3.1.1 体积流量和柱温的选择 实验过程中, 对比考察了不同体积流量^[5, 7-8, 10] (0.9、1.0、1.1 mL/min) 和不同柱温^[5-8] (25、30、35 °C) 对所测各成分猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸色谱峰峰形、分离效果和色谱峰出峰时间的影响, 最终选择 1.0 mL/min 作为本实验的体积流量, 30 °C 作为本实验的柱温。

3.1.2 流动相的选择 分别比较了甲醇-水^[10]、乙腈-水^[5]、乙腈-0.05%磷酸溶液^[6-7, 9]、乙腈-0.05%冰醋酸溶液流动相体系, 以所测定成分猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸的分离效果为指标, 最后选定以乙腈-0.05%磷酸溶液为流动相。

3.2 提取条件的选择

3.2.1 提取溶剂的选择 实验过程中, 对比考察甲醇^[6-9]、50%甲醇、乙醇^[5, 10]对所测定成分猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸提取效果的影响, 结果表明以甲醇为提取溶剂时, 所测各成分提取率最佳, 故选定甲醇为提取溶剂。

3.2.2 提取方式的选择 以甲醇为提取溶剂, 对比考察超声提取^[5-8, 10]和加热回流提取对所测定成分猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸提取效果的影响, 结果两种提取方式所测各成分猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸提取率无明显差异, 考虑到检测操作过程的便捷性, 故选择超声提取作为供试品溶液的提取方式。

本实验所建立的 HPLC 波长切换法, 经方法学验证该方法操作便捷、结果准确, 重复性好, 实现了对威喜丸中猪苓酮 B、猪苓酮 A、去氢土莫酸、猪苓酸 C、去氢茯苓酸和茯苓酸的同时测定, 为威喜丸的质量控制提供了实验依据。

参考文献

- [1] 中华人民共和国卫生部药典委员会. 卫生部颁药品标准(中药成方制剂第十三册) [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1997: 126.
- [2] 乔铁锤. 威喜丸治白带 [J]. 四川中医, 1990(3): 388-390.
- [3] 方厚贤, 杨容. 威喜丸治疗乳糜尿一名医张羹梅临床经验介绍 [J]. 中国冶金工业医学杂志, 1990, 7(6): 260-260.
- [4] 中国药典 [S]. 一部. 2015: 240-241, 318-319.
- [5] 陈晓梅, 周微微, 王春兰, 等. 猪苓甾酮类化合物的 HPLC 含量测定及指纹图谱研究 [J]. 菌物学报, 2017, 36(1): 83-97.
- [6] 张靓琦, 贾英, 罗洁, 等. 超高效液相色谱法同时测定茯苓中去氢土莫酸等 6 种活性成分的含量 [J]. 中国药理学杂志, 2012, 47(13): 1080-1083.
- [7] 车爽, 李清, 霍艳双, 等. 波长转换 RP-HPLC 法同时测定茯苓不同部位中 5 种三萜酸含量 [J]. 药学学报, 2010, 45(4): 494-497.
- [8] 谭庆龙, 李楚坚, 金苗, 等. HPLC 法同时测定猪苓中 6 个甾体类成分的含量 [J]. 中药材, 2017, 40(8): 1892-1894.
- [9] 沈玉萍, 杨欢, 陈斌, 等. 反相高效液相色谱法测定中药茯苓中 4 种三萜酸的含量 [J]. 中国药理学杂志, 2011, 46(5): 388-390.
- [10] 王弘, 晁建平, 陈文举, 等. 猪苓药材的质量评价标准研究 [J]. 中草药, 2009, 40(6): 971-974.