

消癌平注射液致严重不良反应 1 例

张 莹

天津中医药大学第一附属医院 肿瘤科, 天津 300193

关键词: 消癌平注射液; 通关藤; 不良反应

中图分类号: R994.1

文献标志码: A

文章编号: 1674-6376(2013)06-0488-01

DOI: 10.7501/j.issn.1674-6376.2013.06.022

消癌平注射液是由萝藦科植物通关藤的干燥藤茎经水提醇沉制成的制剂, 为棕黄色的澄明液体, 具有清热解毒、化痰软坚之功效。其毒副作用小, 并有保肝、利尿和恢复放、化疗后血象的作用。临床多用于食道癌、胃癌、肺癌、肝癌, 并可配合放疗、化疗的辅助治疗。说明书上主要不良反应有低热、皮疹、多汗、游走性肌肉关节疼痛、注射局部刺激痛等不适。现报告消癌平注射液引起的严重不良反应 1 例。

1 临床资料

患者, 女, 77 岁, 主因“进行性吞咽困难, 胸骨后疼痛半年, 加重 1 周”于 2012 年 7 月 16 日以“食道癌”收入院。患者入院后给予消癌平注射液 20 mL (南京圣和药业有限公司生产, 20 mL/支, 批号 201111181) + 0.9% 生理盐水 250 mL 静脉点滴, 滴速为 60 滴/min, 当输注 20 min 左右, 患者出现寒颤、发热、头痛、胸闷、紫绀、呼吸急促、四肢冰凉、脉细弱, 血压 80/50 mmHg (1 mmHg $\approx$ 0.133 kPa), 立即停药, 并给予吸氧, im 苯海拉明 20 mg; 地塞米松 5 mg, 静脉推注。30 min 后症状逐渐缓解, 2 h 后患者生命体征恢复正常。

2 讨论

此例患者符合该药适应证, 用量均按药品说明书推荐剂量用药, 不良反应的发生与用药有合理的

时间顺序。

通关藤药材中所含成分复杂, 文献中报道通关藤药材中的主要成分为多糖、皂苷、酚酸性物质、氨基酸、香豆素及内酯类化合物, 消癌平注射液由通关藤提取物制备而成, 其中主要成分为水溶性成分^[1]。多糖类成分属于免疫促进剂, 它携带特有的信息, 易被遭受肿瘤细胞作用的机体正常组织细胞所识别, 从而增强机体对肿瘤发挥特异免疫功能, 使受损的免疫功能恢复至正常水平。生物碱及皂苷可通过影响代谢和调节免疫功能, 增强机体对肿瘤的抵抗能力, 从而抑制肿瘤的生长^[2]。由于消癌平注射液化学成分较复杂, 干扰因素多, 临床应高度警惕过敏反应的发生。

在使用消癌平注射液前应详细询问患者的过敏史, 高敏体质者禁用。用药过程中应在医生严密监护并有抢救措施的前提下使用, 一旦出现过敏反应有关症状, 应立即停药, 并给予对症及抗过敏治疗, 以保证临床用药安全。

参考文献

- [1] 朱金英, 聂 晶. 消癌平注射液指纹图谱研究 [J]. 辽宁中医药大学学报, 2010, 12(3): 169-170.
- [2] 石 涛. 消癌平注射液临床应用 1009 例分析 [J]. 江苏医药, 2012, 38(9): 1109-1110.

收稿日期: 2013-10-12

作者简介: 张 莹 (1977—), 女, 天津市人, 副主任医师, 从事中西医结合肿瘤临床及科研工作。

Tel: (022)27432431 13820038712 E-mail: zhangyingzhongyi@sina.com