HPLC 法同时测定复方利胆解毒颗粒中绿原酸和连翘酯苷 A

刘毅¹, 刘素香¹, 白雪¹, 吕佳媛²

1. 天津药物研究院, 天津 300193

2. 天津中医药大学, 天津 300193

摘要: 目的 建立复方利胆解毒颗粒中绿原酸和连翘酯苷 A 的定量测定方法。方法 采用 HPLC 法, Diamonsil-C₁₈ 柱 (250 mm×4.6 mm, 5 μm), 以甲醇-0.05%磷酸水 (33:67) 为流动相, 在 330 nm 检测波长下同时对复方利胆解毒颗粒中有效成分绿原酸和连翘酯苷 A 进行定量测定。结果 绿原酸在 0.044 72~0.894 4 μg 线性关系良好, $r=1.000 0$, 平均回收率为 98.92%, RSD 为 1.56%; 连翘酯苷 A 在 0.052 16~1.043 2 μg 线性关系良好, $r=0.999 9$; 平均回收率为 98.36%, RSD 为 1.44%。结论 本方法专属性强、简便、准确, 可有效控制该制剂的质量。

关键词: 复方利胆解毒颗粒; 绿原酸; 连翘酯苷 A; HPLC

中图分类号: R917 文献标志码: A 文章编号: 1674-6376(2014)03-0263-03

DOI: 10.7501/j.issn.1674-6376.2014.03.017

Simultaneous quantitative determination of chlorogenic acid and forsythoside A in Compound Lidanjiedu Granule by HPLC

LIU Yi¹, LIU Su-xiang¹, BAI Xue¹, LV Jia-yuan²

1 Tianjin Institute of Pharmaceutical Research, Tianjin 300193, China

2 Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 300193, China

Abstract Objective To establish a method for detecting the quantity of chlorogenic acid and forsythoside A in Compound Lidanjiedu Granule. **Methods** The HPLC method was carried out using a Diamonsil-C₁₈ column (250 mm × 4.6 mm, 5 μm) eluted with the mobile phases of methanol-0.05% phosphoric acid (33:67). The method could detect the quantity of chlorogenic acid and forsythoside A in Compound Lidanjiedu Granule simultaneously with the detective wavelength of 330 nm. **Results** The linear range of chlorogenic acid was 0.044 72 — 0.894 4 μg ($r = 1.000 0$), the recovery was 98.92%. and the RSD value was 1.56%; The linear range of forsythoside A was 0.052 16 — 1.043 2 μg ($r = 1.000 0$), the recovery was 98.36%, and the RSD value was 1.44%. **Conclusion** The method is specific, simple, and accurate, which could control the quality of Compound Lidanjiedu Granule.

Key words: Compound Lidanjiedu Granule; chlorogenic acid; forsythoside A; HPLC

复方利胆解毒颗粒是由茵陈、连翘、当归等多味中药制成的复方制剂, 其主要组成药味茵陈具有清利湿热、利胆退黄的功效, 绿原酸为其主要活性成分, 药理研究表明^[1], 绿原酸具有抗菌、抗病毒活性。连翘具有清热解毒、消肿散结、疏散风热的功效, 其有效成分连翘苷和连翘酯苷 A 具有抗菌、抗病毒活性^[2-3], 也是 2010 年版《中国药典》中连翘药材的测定指标, 考虑到本品的提取工艺, 因此选取水溶性强的连翘酯苷 A 作为含量测定指标。采用高效液相色谱法对本品中绿原酸和连翘酯苷 A 进行定量分析, 建立了该产品的质量标准定量控制方

法。该方法具有专属性强, 分离效果好, 灵敏、准确等优点。

1 仪器和试剂

HP1100 系列高效液相色谱仪, G1310A 泵, G1313A 自动进样器, G1316A 柱温箱, G1314A 紫外检测器, HP1100 色谱工作站。AB204—N 电子分析天平 (万分之一, 瑞士 Mettler-Toledo 公司); BT25S 电子分析天平 (十万分之一, 德国赛多利斯公司); AS3120 型超声波清洗器 (昆山市超声仪器有限公司)。

绿原酸对照品购自中国食品药品检定研究院

收稿日期: 2013-11-20

作者简介: 刘毅, 助理研究员。E-mail: liuy@tjipr.com

(批号 110753-200413, 归一化法检查质量分数 > 98%); 连翘酯苷 A 对照品购自四川省维克奇生物科技有限公司(批号 201011, 归一化法检查质量分数 > 98%)。复方利胆解毒颗粒及空白样品由本实验室自制。甲醇为色谱纯, 磷酸为分析纯, 水为去离子水, 其他试剂均为分析纯。

2 方法与结果

2.1 色谱条件

色谱柱为 Diamonsil-C₁₈ 柱 (250 mm × 4.6 mm, 5 μm), 流动相为甲醇-0.05%磷酸水 (33 : 67), 检测波长 330 nm, 体积流量 1.0 mL/min, 柱温 30 °C。

2.2 溶液的制备

2.2.1 混合对照品溶液 分别精密称取绿原酸对照品 11.18 mg 和连翘酯苷 A 对照品 13.04 mg, 置 50 mL 量瓶中, 加 50% 甲醇溶解并稀释至刻度, 摇匀, 制成含绿原酸 0.223 6 mg/mL 和连翘酯苷 A 0.260 8 mg/mL 的溶液, 作为对照品贮备液。分别精密吸取对照品贮备液 1 mL, 置 10 mL 量瓶中, 加 50% 甲醇稀释至刻度, 摇匀, 作为对照品溶液。

2.2.2 供试品溶液 取复方利胆解毒颗粒, 研细, 约 0.4 g, 精密称定, 置 25 mL 量瓶中, 加入 50% 甲醇适量, 超声 20 min, 取出, 放至室温, 用 50% 甲醇稀释至刻度, 摇匀; 滤过, 弃去初滤液, 取续滤液作为供试品溶液。

2.2.3 阴性对照溶液 取除去茵陈和连翘的其余药味, 按处方配比, 照制备工艺制成阴性对照样品, 按供试品溶液的制备方法处理, 作为阴性对照溶液。

2.3 专属性试验

分别精密吸取混合对照品溶液、供试品溶液及阴性对照溶液各 10 μL, 按上述色谱条件测定, 见图 1, 结果表明, 阴性对照溶液在绿原酸和连翘酯苷 A 色谱峰相应位置上无色谱峰, 阴性对照无干扰, 方法专属性良好。

2.4 线性关系考察

分别精密量取对照品贮备液(即含绿原酸 0.223 6 mg/mL 和连翘酯苷 A 0.260 8 mg/mL) 0.2、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0 mL 置 10 mL 量瓶中, 用 50% 甲醇稀释至刻度, 摇匀, 分别进样 10 μL, 测定峰面积。以绿原酸的量 (μg) 为横坐标, 峰面积为纵坐标, 计算回归方程 $Y=3\ 065.4X-0.033\ 8$, $r=1.000$; 以连翘酯苷 A 的量 (μg) 为横坐标, 峰面积为纵坐标, 计算回归方程 $Y=1\ 654.5X-3.619\ 0$, $r=0.999\ 9$ 。结果表明, 绿原酸在 0.044 72~0.894 40 μg

1-绿原酸 2-连翘酯苷 A
1- chlorogenic acid 2- forsythoside A

图 1 混合对照品 (A)、复方利胆解毒颗粒 (B) 和阴性对照 (C) 的 HPLC 图谱

Fig. 1 HPLC of reference substance (A), Compound Lidanjiadu Granule (B), and negative sample (C)

与峰面积值呈良好的线性关系; 连翘酯苷 A 在 0.052 16~1.043 20 μg 与峰面积值呈良好的线性关系。

2.5 精密度试验

精密吸取同一供试品溶液 10 μL, 重复进样 6 次, 记录绿原酸和连翘酯苷 A 峰面积值, 计算其 RSD 值分别为 0.61% 和 0.54%。

2.6 稳定性试验

取同一供试品溶液于 0、2、4、8、12、16、24 h 分别测定, 每次进样 10 μL, 记录绿原酸和连翘酯苷 A 的峰面积, 结果其 RSD 值分别为 1.49% 和 1.20%, 表明, 供试品溶液在室温避光放置 24 h 内保持稳定。

2.7 重复性试验

按供试品溶液的制备方法, 对同一批号的样品分别制备 6 份供试品溶液, 进样 10 μL 测定, 计算绿原酸和连翘酯苷 A 的质量分数, 结果, 绿原酸的质量分数的 RSD 值为 1.46%; 连翘酯苷 A 质量分数的 RSD 值为 0.50%。

2.8 回收率试验

取已知绿原酸和连翘酯苷 A 质量分数(即绿原酸 1.29 mg/g 和连翘酯苷 A 1.54 mg/g) 的同一批本品 0.2 g, 精密称定 9 份, 精密加入对照品贮备液 0.9、1.2、1.4 mL 各 3 份, 照供试品溶液制备方法制备,

进样 10 μL 测定, 结果, 绿原酸的平均回收率为 98.92%, RSD 值为 1.56%; 连翘酯苷 A 的平均回收率为 98.36%, RSD 值为 1.44%。

2.9 样品的测定

取 3 批样品, 按供试品溶液制备方法操作, 即得供试品溶液, 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液 10 μL , 按上述色谱条件测定绿原酸和连翘酯苷 A 的含量, 结果见表 1。

表 1 复方利胆解毒颗粒中绿原酸和连翘酯苷 A 的含量测定结果 ($n = 2$)

Table 1 Determination of chlorogenic acid and forsythoside A in Compound Lidanjiedu Granule ($n = 2$)

批号	绿原酸/($\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$)	连翘酯苷 A/($\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$)
20121201	1.18	1.82
20121202	1.29	1.54
20121203	1.37	1.63

3 讨论

在流动相选择中, 比较了甲醇-0.05%磷酸溶液、甲醇-0.1%磷酸溶液, 以及各溶液不同配比, 试验发现流动相以甲醇-0.05%磷酸溶液 (33:67) 时色谱峰形状及对称性较好, 因此选用为流动相。

2010 年版《中国药典》中茵陈和连翘药材含量测定项下^[4], 绿原酸的检测波长为 327 nm, 连翘酯

苷 A 的检测波长为 330 nm。本实验采用紫外分光光度计, 在 200~400 nm 波长分别对绿原酸、连翘酯苷 A 的对照品溶液进行扫描, 结果显示绿原酸在 329.5 nm 处有最大吸收, 连翘酯苷 A 的最大吸收波长为 330 nm, 因此选择 2 种物质均有较高吸收的 330 nm 作为检测波长。

对样品提取溶剂进行考察, 结果, 用甲醇作提取溶剂, 含量较低, 峰形不佳; 70%甲醇和 50%甲醇作提取溶剂, 含量结果没有显著性差异, 考虑到本品中有水提醇提两种工艺, 因此采用 50%甲醇作为提取溶剂。

在本实验色谱条件下, 制剂中绿原酸和连翘酯苷 A 与其他组分间有较好的分离度, 而且专属性强, 样品分析时间短, 准确度、精密度的均较好, 可用于该产品的定量控制方法。

参考文献

- [1] 吴卫华, 康 楨, 欧阳冬生, 等. 绿原酸的药理学研究进展 [J]. 天然产物研究与开发, 2006, 18(4): 691-694.
- [2] 付鹏亮, 王东强, 李志军. 连翘酯苷药理作用研究进展 [J]. 长春中医药大学学报, 2011, 27(6): 1062-1063.
- [3] 冯淑怡, 李先荣, 孙建宁. 连翘酯苷抗感染、解热作用研究 [J]. 现代生物医学进展, 2006, 6(10): 73-75.
- [4] 中国药典 [S]. 一部. 2010.