

表2 中草药中锶的含量 ($\bar{x} \pm SD$)

样 品	实验次数	锶含量 (ng/g, 干重)
灵芝 <i>Ganoderma lucidum</i>	3	2460 ± 893
白花蛇舌草 <i>Oldenlandia diffusa</i>	3	353 ± 25
白芍 <i>Paeonia lactiflora</i>	3	213 ± 20
党参 <i>Codonopsis pilosula</i>	3	190 ± 36
当归 <i>Angelica sinensis</i>	3	167 ± 15
黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i>	3	157 ± 11
穿心莲 <i>Andrographis paniculata</i>	2	147 ± 15
半枝莲 <i>Scutellaria barbata</i>	2	146 ± 15
菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i>	2	140 ± 12
杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i>	2	107 ± 20
何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i>	2	90 ± 10
丹参 <i>Salvia miltiorrhiza</i>	2	87 ± 15
三棱 <i>Sparaganium stolonifeseum</i>	2	85 ± 5
小蓟 <i>Cirsium setosum</i>	2	80 ± 5
仙茅 <i>Curculigo orchioides</i>	2	80 ± 10
淫羊藿 <i>Epimedium grandiflorum</i>	2	73 ± 12
补骨脂 <i>Psoralea corylifolia</i>	1	70
天门冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i>	1	67

胞,提高机体非特异性免疫力^[9],在灵芝抗癌保健作用中起着重要作用。由此可见,如果说超微量的锶即使对灵芝保健作用有影响,那么这种影响也极可能是次要的。

参 考 文 献

- 1 Kawamata S, et al. Shokuhin Eiseigaku Zasshi, 1987, 23(5): 390
- 2 Suzuki F, et al. Anticancer Res, 1986, 6: 177
- 3 Johnson DJ, et al. Anal Chim Acta, 1973, 67: 79
- 4 陈则树,等.分析化学,1991,19(2): 1405
- 5 Luke C L, et al, Anal Chem, 1956, 28: 1273
- 6 Donaldson E M. Talanta, 1974, 31: 997
- 7 陈雁君,等.微量元素,1991(3): 58
- 8 Miyazaki T, et al. Chem Pharm Bull, 1981, 29: 12, 3611
- 9 Suzuki I, et al. Int J Immuno-Pharmacol, 1990, 12(6): 975

(1994-04-26收稿)

夏枯草临床新用

河南省驻马店地区中医院(463000) 刘天麟

夏枯草清肝火,散郁结,临床多用于肝火上炎之目赤肿痛及痰火结聚之癆瘵,癭瘤等。近又用于肝阳上亢之高血压等。笔者近几年从民间单方中用于治疗手足皲裂、手脱皮等,方法简便,疗效显著。

1 手足皲裂

夏枯草30g,白芨15g,共研细末,猪油调膏。先用夏枯草60g,煎水洗患处,再敷以药膏,纱布包扎,1次/d,连用3~7d可愈。如患者王某,男49岁。每年入冬后手足粗糙,皲裂,有时裂缝渗血,痛苦不堪,经用上法7d后皲裂消失,皮肤洁净而愈。1年后随访未复发。曾治36例,34例痊愈,总有效率为94.4%。

2 手脱皮

此类患者常双手脱皮,干燥,每年春秋各1次。其脱皮均为手掌面,但无瘙痒,故排除鹅掌风。取夏枯草100g,水煎2次,泡洗双手,2次/d,每

次30min,连用10~15d。如患者杜某,女,42岁。述其双掌脱皮6年余,每年春、秋季各1次。虽经服维生素E及中药养血清热制剂无效。经用上法洗10d后痊愈。至今3年未复发。曾用本法治疗手脱皮百余例,均痊愈。

3 体会

手足皲裂、手脱皮均为气血不能濡养肌肤,致干燥皲裂;肤失所养,则皮不能存。夏枯草入肝养血,清火散结,李时珍云:“此物生血”。楼全善谓其:“补厥阴血脉”。盖本品一则补肝血,使肌肉、筋脉、皮肤得到阴血濡养;二则清肝火,解内热,使热清而不再耗阴,阴液足则肌肤得养,故皲裂,脱皮当症得愈。

(1994-05-13收稿)