拟玉龙乌头的二萜生物碱研究

中国科学院成都生物研究所(610041)

陈 璞* 丁立生 王明奎
彭树林 陈佩卿 吴凤铤

摘 要 从拟玉龙乌头 *Aconitum pseudostapfianum* 根中分得 10 个二萜生物碱,其结构通过波谱和化学方法分别鉴定为 14-benzoyl-8-O-methyl-aconine (I),aconitine (II),deoxyaconitine (III),penduline (IV),yunaconitine (V),neoline (VI),15 α -hydroxyneoline (VII),neoline (VIII),talatisamine (IX)和 aconosine (X),其中 I 为首次从该植物中分得。

关键词 毛茛科 拟玉龙乌头 二萜 生物碱

拟玉龙乌头 *Aconitum pseudostapfianum* W. T. Wang 系毛茛科乌头属植物,在民间用来治疗跌打损伤等症,其化学成分未见报道。我们从该植物块根中分离出 10 个二萜生物碱,其结构通过波谱分析和化学方法鉴定为 14-benzoyl-8-O-methyl-aconine (I),aconitine (II),deoxyaconitine (III),penduline (IV),yunaconitine (V),neoline (VI),15 α -hydroxyneoline (VII),neoline (VIII),talatisamine (IX)和 aconosine (X)。其中 I 作为天然产物首次从植物中分离得到,II,VI, VII 和 VIII 为该植物的主要成分。

I 为无定形,由 EIMS 和 FABMS 给出分子量为 617,HRMS 确定分子式为 $C_{33}H_{47}NO_{10}$ 。¹HNMR 显示分子中有 1 个氮乙基(δ 1.18,3H,t, $J=7$ Hz),5 个甲氧基(δ 3.76,3.31,3.30,3.29,3.15;各 3H,s)和 1 个苯甲酰氧基(δ 7.46~8.03,5H,m)。IR 出现羟基吸收(3456cm^{-1}),1 经乙酰化后得三乙酰化物 Ia(δ 2.05,2.08,2.13;各 3H,s),说明分子中含有 3 个羟基。根据生源和波谱特征,I 应为 C_{19} -二萜生物碱。14- β H 特征化学位移在较低场(δ 4.84,d, $J=5.1$ Hz),说明 C_{14} 为酯基取代,信号为双峰,结合¹³CNMR 推测 C_{13} 为羟基取代。 C_{16} 化学位移显著偏低(δ 93.3),提示 C_{15} 也有羟基取代,受 C_{13} 和 C_{15} 羟基吸电诱导效应的影响,16-OCH₃ 碳原子

化学位移也偏向低场(δ 62.3)⁽¹⁾。EIMS 中 $[M-OCH_3]^+$ 离子为基峰,提示 C_1 为甲氧基取代。¹³CNMR 中出现 δ 77.2 的仲碳峰,这是 C_{18} 为甲氧基取代的特征。乙酰化物 Ia 的该仲碳峰显著向高场移至 δ 71.4,说明 C_3 位为羟基取代⁽²⁾。根据这类生物碱的取代规律,¹³CNMR 中也有相应的峰出现。比较 I 和 al-jesaconitine A (XI) 的¹³CNMR⁽³⁾,除 14-芳酯基不一样外,其余的碳化学位移均一致,说明上述推测是合理的。化合物 I 和化学结构式见图。

图 化合物 I 的化学结构式

1 仪器和材料

IR 用 Nicolet170S $\times$ FT 型仪测定;比旋光度用 PE241 型仪测定;NMR 用 Bruker ACP300 型和 AC-E200 型仪测定,CDCl₃ 为溶剂;EIMS 用 VG-7070E 型仪测定,FABMS 和 HRMS 用 VGAUTOSPEC 型仪测定。拟玉龙乌头样品于 1992-08 采自云南巧家药山自然保护区,由中国科学院成都生物研究所肖顺昌副研究员鉴定。

* Address: Chen Ying, Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Chengdu

2 提取和分离

取块根干重 6.4kg 粉碎,以 90%乙醇室温浸提 3 次共 20d,回收溶剂后得浸膏 0.75kg。用 2% H_2SO_4 溶液溶解,过滤,滤液经石油醚脱脂后加浓氨水碱化至 pH7,氯仿萃取得粗碱 A50g;水层再用浓氨水调 pH 至 10,氯仿萃取得碱 B40g。粗碱 A 经碱性氧化铝柱层析,较纯的部分甲醇重结晶后分别得 II 15g 和 IV 30mg。粗碱 B 同样经碱性氧化铝柱层析,较纯馏分甲醇重结晶后分别得 VI 5g 和 VII 17g。碱 A 和 B 剩余馏分按成分相近部分合并,分别经多次氧化铝柱层析和硅胶制备薄层分离后得 I 200mg, III 160mg, V 250mg, VIII 12g, IX 200mg 和 X 20mg。

3 鉴定

I: 无定形, $[\alpha]_D^{20} - 2.36$ (c, 0.721, $CHCl_3$), $C_{33}H_{47}NO_{10}$, HRMS m/z : 617.3183 (计算值 617.3199), FABMS m/z : 618 ($[M+H]^+$), EIMS m/z (%): 617 ($[M]^+$, 6), 600 ($[M-OH]^+$, 9), 586 ($[M-OCH_3]^+$, 100)。IR (KBr) cm^{-1} : 3456 (OH); 1719, 1280 (COOR), 1110 (OCH_3), 1602, 1452, 719。 1H NMR (300MHz) δ ppm: 1.18 (3H, t, $J = 7.0$ Hz, NCH_2CH_3), 3.15, 3.29, 3.30, 3.31, 3.76 (各 3H, s, $5 \times OCH_3$), 4.06 (1H, d, $J = 6.6$ Hz, $C_6-\beta H$); 4.58 (1H, d, $J = 5.0$ Hz, $C_{15}-\beta H$), 4.84 (1H, d, $J = 5.1$ Hz, $C_{14}-\beta H$), 7.46 ~ 8.03 (5H, m, Ar- $\overset{O}{\parallel}C-H$), ^{13}C NMR (75MHz) δ : 见表。

I 的乙酰化: 取 I 100mg, 对甲基苯磺酸 100mg 溶于 3ml 醋酐中, 加热回流 3h, 常法处理得 I a90mg, 白色块晶, mp144~148 $^{\circ}C$ 。IR (nujol) cm^{-1} : 1735, 1251, 1221, 1104, 718。 1H NMR (200MHz) δ ppm: 1.17 (3H, t, $J = 7.0$ Hz, NCH_2CH_3); 2.05, 2.08, 2.13 (各 3H, s, $3 \times COCH_3$); 2.93, 3.21, 3.24, 3.27, 3.29 (各 3H, s, $5 \times OCH_3$); 4.09 (1H, d, $J = 6.6$ Hz, $C_6-\beta H$); 5.12 (1H, d, $J = 5.1$ Hz, $C_{14}-\beta H$); 7.45 ~ 8.16 (5H, m, Ar- $\overset{O}{\parallel}C-H$)。 ^{13}C N-

MR (50MHz) δ : 见表。

II: 白色块晶, mp200~202 $^{\circ}C$, 1H NMR (300MHz) δ ppm: 1.10 (3H, t, $J = 7.1$ Hz, NCH_2CH_3), 1.39 (3H, s, $COCH_3$); 3.17, 3.27, 3.30, 3.76 (各 3H, s, $4 \times OCH_3$), 4.87 (1H, d, $J = 5.0$ Hz, $C_{14}-\beta H$); 7.44 ~ 8.04 (5H, m, Ar- $\overset{O}{\parallel}C-H$)。上述数据与 aconitine 的文献值^[4]一致, 与标样作 TLC 对照, R_f 值相同。

III: 白色块晶, mp170~172 $^{\circ}C$, 1H NMR (300MHz) δ ppm: 1.08 (3H, t, $J = 7.0$ Hz, NCH_2CH_3), 1.37 (3H, s, $COCH_3$); 3.16, 3.27, 3.28, 3.74 (各 3H, s, $4 \times OCH_3$), 4.87 (1H, d, $J = 5.0$ Hz, $C_{14}-\beta H$); 7.43 ~ 8.04 (5H, m, Ar- $\overset{O}{\parallel}C-H$)。上述数据与 deoxyaconitine 的文献值^[4]相符, 与标样作 TLC 对照, R_f 值相同。

IV: 白色针晶, mp165~168 $^{\circ}C$, 1H NMR (300MHz) δ ppm: 1.06 (3H, t, $J = 7.0$ Hz, NCH_2CH_3), 1.43 (3H, s, $-COCH_3$); 3.18, 3.27, 3.29, 3.53 (各 3H, s, $4 \times OCH_3$), 5.04 (1H, t, $J = 4.8$ Hz, $C_{14}-\beta H$); 7.41 ~ 8.08 (5H, m, Ar- $\overset{O}{\parallel}C-H$)。 ^{13}C NMR (75MHz) δ : 见表。上述数据同 penduline^[5,6] 相吻合。

V: 白色块晶, mp139~143 $^{\circ}C$ 。MS m/z (%): 628 ($[M-OCH_3]^+$, 15), 599 (26), 584 (20), 568 (15), 266 (43), 135 (100)。 1H NMR (300MHz) δ ppm: 1.11 (3H, t, $J = 7.0$ Hz, NCH_2CH_3), 1.34 (3H, s, $COCH_3$); 3.16, 3.26, 3.29, 3.54 (各 3H, s, $4 \times OCH_3$); 3.87 (3H, s, $CH_3O-Ar-\overset{O}{\parallel}C-H$); 4.86 (1H, d, $J = 5.1$ Hz, $C_{14}-\beta H$); 6.92, 7.99 (各 2H, d, $J = 9$ Hz, $CH_3O-Ar-\overset{O}{\parallel}C-H$)。上述数据与 yunaconitine^[7] 吻合。与标样作 TLC 对照, R_f 值一致。

VI: 白色块晶, mp227~230 $^{\circ}C$ 。EIMS m/z (%): 423 ($[M]^+$, 20), 406 ($[M-OH]^+$, 100)。 1H NMR (300MHz) δ ppm: 1.16 (3H, t, $J = 7.0$ Hz, NCH_2CH_3), 1.34 (3H, s, $COCH_3$); 3.16, 3.26, 3.29, 3.54 (各 3H, s, $4 \times OCH_3$); 3.87 (3H, s, $CH_3O-Ar-\overset{O}{\parallel}C-H$); 4.86 (1H, d, $J = 5.1$ Hz, $C_{14}-\beta H$); 6.92, 7.99 (各 2H, d, $J = 9$ Hz, $CH_3O-Ar-\overset{O}{\parallel}C-H$)。上述数据与 yunaconitine^[7] 吻合。与标样作 TLC 对照, R_f 值一致。

表 碱 I, Ia, IV, VI, VII 和 X 的¹³CNMR 化学位移(ppm)

碳位	I	Ia	IV	VI	VII	X
1	83.1(1)*	83.2(1)	86.5	72.0(1)	72.1(1)	86.2(1)
2	32.4(2)	31.9(2)	30.4(2)	29.4(2)	30.2(2)	26.0(2)
3	71.3(1)	71.3(1)	36.0(2)	29.4(2)	30.7(2)	29.2(2)
4	43.1(0)	42.0(0)	39.7(0)	39.0(0)	38.1(0)	46.8(1)
5	45.0(1)	45.0(1)	49.5(1)	47.1(1)	44.1(1)	36.3(1)
6	82.0(1)	81.3(1)	84.4(1)	82.5(1)	84.1(1)	29.0(2)
7	44.9(1)	44.4(1)	45.2(1)	51.5(1)	48.4(1)	46.0(1)
8	82.5(0)	81.9(0)	92.9(0)	74.0(0)	79.1(0)	73.2(0)
9	42.6(1)	43.7(1)	45.8(1)	48.3(1)	46.7(1)	47.0(1)
10	41.3(1)	41.4(1)	39.4(1)	40.2(1)	40.6(1)	38.6(1)
11	50.5(0)	49.9(0)	50.7(0)	49.7(0)	49.3(0)	48.7(0)
12	36.0(2)	36.1(2)	27.1(2)	29.8(2)	29.5(2)	28.0(2)
13	74.7(0)	81.6(0)	45.3(1)	44.1(1)	43.5(1)	45.8(1)
14	79.3(1)	78.9(1)	77.0(1)	75.9(1)	75.7(1)	75.3(1)
15	77.4(1)	76.4(1)	76.3(1)	42.8(2)	78.6(1)	39.2(1)
16	93.3(1)	88.8(1)	90.4(1)	81.7(1)	90.5(1)	82.3(1)
17	61.8(1)	60.8(1)	62.0(1)	63.7(1)	62.5(1)	63.0(1)
18	77.2(2)	71.4(2)	81.0(2)	71.2(2)	80.1(2)	
19	48.0(2)	47.0(2)	53.9(2)	56.7(2)	56.7(2)	50.4(2)
N-CH ₂	49.2(2)	48.8(2)	49.9(2)	48.4(2)	48.5(2)	49.6(2)
CH ₃	12.8(3)	13.6(3)	13.4(3)	13.0(3)	13.1(3)	13.6(3)
1-OCH ₃	55.6(3)	56.0(3)	56.8(3)			55.8(3)
6-OCH ₃	58.6(3)	58.6(3)	58.4(3)	57.9(3)	58.1(3)	
8-OCH ₃	50.0(3)	49.4(3)				
16-OCH ₃	62.3(3)	60.2(3)	58.7(3)	56.3(3)	57.5(3)	56.1(3)
18-OCH ₃	59.1(3)	58.7(3)	59.7(3)		59.1(3)	
14-CO	166.2(0)	166.3(0)	166.8(0)			
1'	130.0(0)	129.8(0)	130.4(0)			
2',6'	129.7(1)	129.7(1)	129.2(1)			
3',5'	128.1(1)	128.2(1)	129.1(1)			
4'	132.9(1)	132.7(1)	133.8(1)			
4'-OCH ₃						
CO		170.3(0)	172.9(0)			
		170.1(0)				
		169.0(0)				
CH ₃		21.2(3)	22.1(3)			
		21.1(3)				
		21.0(3)				

*氢原子数,由 DEPT 确定

=7.0Hz, NCH₂CH₃), 3.35, 3.39(各 3H, s, 2 × OCH₃); 4.22(1H, d, J = 6.9Hz, C₆-βH)。

¹³CNMR(75MHz)δ: 见表。上述数据与 neoline 的文献^[8]相符。

VII: 白色块晶, mp211~212℃。¹HNMR(300MHz)δppm: 1.11(3H, t, J = 7.0Hz, NCH₂CH₃); 3.33, 3.35, 3.45(各 3H, s, 3 × OCH₃); 4.10(1H, t, J = 5.1Hz, C₁₄-βH); 4.39

(1H, d, J = 6.6Hz, C₁₅-βH)。¹³CNMR(75MHz)δ: 见表。上述数据与 15α-hydroxy-neoline 的文献值^[9]一致。

VII: 白色针晶, mp158~160℃。EIMS m/z(%): 437(M⁺, 7), 422([M-CH₃]⁺, 28), 420([M-OH]⁺, 100), 388, 350, 58, 45。

¹HNMR(300MHz)δppm: 1.14(3H, t, J = 7.0Hz, NCH₂CH₃), 3.33(3H, s, OCH₃), 3.34

(6H, s, 2 × OCH₃), 4.81 (2H, m, C₆-H, C₁₁-H)。上述数据与 neoline 文献值^[10]吻合。

K: 白色块晶; mp 140~142 °C。EIMS m/z (%): 421 (M⁺, 4), 390 ([M - OCH₃]⁺, 100)。上述数据与 talatisamine^[7]相符, 与标样作 TLC 对照, 证明为同一化合物。

X: 微量, 未结晶。EIMS m/z (%): 377 (M⁺, 2), 346 ([M - OCH₃]⁺, 100)。¹H NMR (300 MHz) δ ppm: 1.05 (3H, t, J = 7.0 Hz, NCH₂CH₃), 3.26, 3.34 (各 3H, s, 2 × OCH₃), 4.12 (1H, dd, J = 4.8 Hz, C₁₄-βH)。

¹³C NMR (75 MHz) δ: 见表。上述数据与 aconosine^[11]吻合。与标样作 TLC 对照, R_f 值相同。

参考文献

- 1 Pelletier S W. Alkaloids: Chemical and Biological Perspective. Vol 2. New York: John Wiley & Sons, 1984. 205
- 2 余 灵, 等. 有机化学, 1993, 13: 508
- 3 Bando H, et al. Chem Pharm Bull, 1985, 33: 4717
- 4 王永高, 等. 药学学报, 1980, 15: 526
- 5 刘力敏, 等. 药学学报, 1983, 18: 39
- 6 Wada K, et al. Chem Pharm Bull, 1985, 33: 3658
- 7 Ding L S, et al. Phytochemistry, 1990, 29: 3694
- 8 Ross S A, et al. Heterocycles, 1987, 26: 2895
- 9 Pelletier S W, et al. Heterocycles, 1982, 18: 47
- 10 Hikino H, et al. J Nat Prod, 1983, 46: 178
- 11 丁立生, 等. 药学学报, 1990, 25: 441

(1994-05-03 收稿)

Studies on the Diterpenoid Alkaloids of Yiyulongwutou (*Aconitum pseudostapfianum*)

Chen Ying, Ding Lisheng, Wang Mingkui, et al

From the roots of *Aconitum pseudostapfianum* W. T. Wang, ten diterpenoid alkaloids were isolated and identified as 14-benzoyl-8-O-methylaconine (I), aconitine (II), deoxyaconitine (III), penduline (IV), yunaconitine (V), neoline (VI), 15α-hydroxyneoline (VII), neoline (VIII), talatisamine (IX) and aconosine (X). I has not been previously found in nature.

射干的化学成分研究(I)△

中国医学科学院药物研究所(北京 100050) 周立新* 林 茂 赫兰峰**

摘 要 从射干 *Belamcanda chinensis* 根茎的乙醇提取物氯仿溶解部分分得 9 个已知化合物。理化常数 and 光谱分析确定为野鸢尾黄素(irigenin, I), 白射干素(dichotomitin, II), 次野鸢尾黄素(irisfloreantin, III), 3-豆甾烷醇(3-stigmasterol, IV), 茶叶花宁(apocynin, V), 鸢尾甙元(tectoridenin, VI), β-谷甾醇(VII), 3', 4', 5, 7-四羟基-8-甲氧基-异黄酮(3', 4', 5, 7-tetrahydroxy-8-methoxyisoflavone, VIII) 和八聚异戊二烯类化合物(polyoctapentene, X)。

关键词 射干 白射干素 3', 4', 5, 7-四羟基-8-甲氧基-异黄酮

射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC. 根茎是一味常用中药, 有清热解毒, 利咽消痰, 散血消肿的功能。适用于咽喉肿痛, 痰咳气

喘。近年来临床用其治疗流感及上呼吸道感染, 有一定的疗效, 现代药理实验表明其具有明显的抗炎及抗微生物作用^[1]。

* Address: Zhou Lixin, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing

△ 国家自然科学基金资助项目 ** 北京医科大学实习生