

临床观察,结果表明,该制剂治疗厌食证患儿1个疗程(1个月),显效率为84.0%,总有效率为97.0%,对脾虚失运、脾虚夹积两种证型的显效率及总有效率无显著差异。对厌食证主要症状厌食、腹胀、大便不调的总有效率分别为95.0%、92.6%和94.0%。此外,健儿佳口服液能显著提高患儿唾液淀粉酶活性,

改善患儿脾胃功能,促进体重增加。

临床统计结果表明,健儿佳口服液治疗效果一般在服药1周后起效,3~4周达到较好疗效,为此,服用健儿佳口服液应不少于4周,若平素适时服用,则可长期保持儿童脾胃功能健康。

(1996-04-22 收稿)

苦黄注射液治疗病毒性肝炎 45 例疗效观察

内蒙古哲盟传染病医院(通辽 028000)
内蒙古医学院附属医院

石淑荣 胡文忠 赵云龙 胡杰
齐廷君

我院自1993-07~1994-04使用江苏常熟制药厂生产的苦黄注射液,用于急性黄疸性和慢性活动性肝炎的治疗,取得了较满意的疗效,现介绍如下:

1 临床资料

1.1 一般资料:见表1。

表1 两组疗前一般资料比较

组别	例数		平均年龄(岁)		\bar{x}	
	男	女	急黄	慢活	ALT(u)	SB(μ mol/L)
治疗组	39	6	29	16	34.8	141.7 210.9
对照组	38	4	27	15	32.1	123.8 226.3

两组肝功能都有明显改变,其中ALT最高286u,SB最高293.4 μ mol/L。

1.2 治疗方法:两组同时使用口服药物(齐墩果酸、Vit C、Vit E、酵母)和静脉滴注药物(10%葡萄糖500ml,丹参注射液20ml,1次/d)。治疗组加10%葡萄糖500ml与苦黄注射液30ml(儿童酌减),1次/d,静脉滴注,15d为1疗程。对照组加10%葡萄糖与门冬氨酸钾镁40ml,1次/d,静脉滴注,21d为1疗程。

1.3 疗效判断:显效:用药1疗程临床症状与体征(乏力、纳差、腹胀、黄染、肝脏大小、压痛)消失,肝功能恢复正常;有效:用药2疗程,临床症状与体征有所好转,ALT、SB均趋于正常,肝功能没有完全恢复;无效:用药2疗程以上,肝功能和临床症状都没有明显改变。

2 治疗结果

两组治疗结果见表2。

表2 两组治疗结果比较

组别	例数	复常天数(\bar{x})				显效率(%)	总有效率(%)
		急黄	慢活	急黄	慢活		
治疗组	45	12.7	27	12.7	28.9	78.3	98.5
对照组	42	14.3	48.2	14.3	56.2	56.2	77.4
		>0.05 <0.01		>0.05 <0.01		<0.05	

3 讨论

3.1 本组资料提示苦黄对急性黄疸性和慢性活动性肝炎临床症状的改善,疗效较好。多数病人用药1周后,食欲增进,乏力及周身酸痛逐渐缓解。本品的总有效率98.5%。

3.2 依据治疗结果,苦黄注射液对慢性活动性肝炎的退黄、降酶的天数,两组间有非常显著性差异($P < 0.01$),说明本品对慢性活动性肝炎的退黄、降酶有较好的作用。

3.3 苦黄注射液是由苦参、大黄等经提炼制备成可供静脉注射的药物。本品含有大黄蒽醌、苦参碱、氨基酸、微量元素等。具有清热利湿,疏肝退黄的作用。动物实验发现本品在促进胆汁分泌的同时,也相应增加单位时间内胆红素排出量,还有促进细胞免疫调节作用,是治疗急性黄疸性肝炎和慢性活动性肝炎退黄的有效药物。治疗组未见不良反应。

(1996-02-12 收稿)