川山橙化学成分的研究

中国医学科学院
中国协和医科大学 药物研究所(北京 100050) 颜克序* 冯孝章

摘要 从川山橙 *Melodinus hemsleyanus* 中分得 10 个化合物,用光谱方法和化学反应鉴定了它们的结构,分别为:11-hydroxytabersonine (I),scandine (II),10-hydroxyscandine (III),tubotaiwine (IV),tubotaiwine N-oxide (V),15 α -hydroxykopsinine (VI),vincoline (VII),19R-vindolinine N-oxide (VIII),16 β -hydroxy-19R-vindolinine (IX)和 16 β -hydroxy-19S-vindolinine N-oxide (X),其中 X 为新化合物,药理筛选表明化合物 I 有一定的抗肿瘤活性。

关键词 川山橙 吲哚生物碱 16 β -hydroxy-19S-vindolinine N-oxide

川山橙 *Melodinus hemsleyanus* Diels. 为夹竹桃科山橙属植物。民间常用于治疗小儿疝气、腹痛、小儿疳疾、消化不良、睾丸炎、小儿脑膜炎、骨折和风湿性心脏病等^[1]。为了寻找活性成分,我们对川山橙的化学成分进行了研究,从中分离得到 10 个单吲哚生物碱,经鉴定分别为:11-hydroxytabersonine (I),scandine (II),10-hydroxyscandine (III),tubotaiwine (IV),tubotaiwine N-oxide (V),15 α -hydroxykopsinine (VI),vincoline (VII),19R-vindolinine N-oxide (VIII),16 β -hydroxy-19R-vindolinine (IX),16 β -hydroxy-19S-vindolinine N-oxide (X),其中 X 为新化合物,药理实验结果表明 I 有一定的抗癌活性。

X 为白色块状结晶,mp 200 °C(分解),与 10%硫酸铈铵的磷酸溶液(CAS)显紫红色,液态二次电离质谱(LSIMS):[M+H]=369.1809,对应组成:C₂₁H₂₅N₂O₄(计算值:369.1806),则分子式为 C₂₁H₂₄N₂O₄,UV $\lambda_{\max}$ (EtOH) nm:205(4.37),243(3.81),289(3.40),显示二氢吲哚的吸收。IR 在 1713 cm⁻¹处有强吸收说明有-C=O 存在,由 MS m/z:368(M⁺),352,334,318,303,292,273,

263,247,220,207,186,170(100),158,134,122,121 可知其为 Vindolinine 类骨架,且易失去一个氧原子。¹H-NMR(DMSO-d₆)显示:低场区有 4 个芳氢: δ 7.27(d,1 H),6.92(t,1 H),6.57(t,1 H),6.52(d,1 H),说明吲哚环的苯环上没有取代,¹H-NMR 还显示一对烯氢:6.30(d,1 H),5.87(m,1 H),甲氧基的 3 个氢:3.65(s,3 H),0.45(d,3 H,C₁₈-CH₃)。DEPT 谱显示 X 含有 7 个季碳,8 个叔碳,4 个仲碳,2 个伯碳。 δ 173.0 的季碳信号为-COOCH₃的-C=O 碳信号, δ 52.2 为-COOCH₃的甲基碳信号, δ 82.9 对应 2 位碳, δ 74.9 对应 16 位碳;C₂₁,C₃,C₅的化学位移分别为 89.1,72.2,69.0,与 19R-vindolinine N-oxide(VIII)及 19S-vindolinine^[3]对照比较见表 1,表明该化合物可能为氮氧化物,因 19 位甲基氢化学位移为 0.45,所以 19 位为 S 构型;由文献可知 X 的 16 位构型为 β 构型^[2]。为了确定 X 的 16 位构型,我们以 IX 为原料,用 H₂O₂ 将其氧化成氮氧化物,所得产物¹H-NMR(溶剂为 CD₃OD)中-OCH₃ δ 为 3.68,X 的-OCH₃ δ 为 3.67(溶剂 CD₃OD),两者一致,因此 16 位-OH 为 β 构型。

综上所述,我们推定 X 结构如图 1 所示,

* Address: Yan Kexu, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences, Chinese Xiehe Medical University, Beijing

为一新化合物,将其命名为 16 β -hydroxy-19*S*-vindolinine N-oxide。

图 1 化合物 IX 和 X 的化学结构式

表 1 化合物 X (在 DMSO-d₆ 中) 和 19*S*-vindolinine (在 CDCl₃ 中), 19*R*-vindolinine N-oxide (在 CD₃OD 中) 的 ¹³CNMR 光谱数据

C 位	X	19 <i>S</i> -vindolinine	19 <i>R</i> -vindolinine N-oxide
2	82.9	80.4	82.5
3	72.2	57.5	74.2
5	69.0	49.8	70.2
6	40.8	37.2	34.7
7	56.2	58.4	59.8
8	133.6	139.0	13.9
9	123.0	123.1	125.4
10	118.1	121.2	121.1
11	125.9	127.0	125.5
12	108.3	111.8	111.8
13	149.9	149.2	150.9
14	127.9	128.1	129.3
15	130.9	131.0	133.2
16	74.9	42.7	39.9
17	34.6	31.4	27.9
18	9.3	10.1	7.1
19	49.9	51.2	49.5
20	43.5	44.2	47.3
21	89.1	74.2	93.3
-COD	173.0	172.8	175.3
OMe	52.2	51.2	52.7

1 仪器和材料

Boetius 显微熔点测定仪测定(未校正); Perkin-Elmer 241 旋光光谱仪测定; 岛津 UV-240 型分光光度计; Perkin-Elmer 683 型红外光谱仪; ZAB-2F 型、Zabspec 型质谱仪; Bruker AM-500 核磁共振仪; Sephadex LH-20 为 Pharmacia 进口分装; 大孔树脂为天津南开大学化工厂生产; 阳离子交换树脂(RA cation exchange resin)为天津化工厂生产; 显色剂为 CAS(10%硫酸铈铵的磷酸溶液); 硅胶为青岛海洋化工厂生产。

2 提取和分离

川山橙根粉 10.85 kg 用 95% 乙醇渗漉, 渗漉液经真空浓缩合并所得浸膏用 2% 盐酸溶液捏溶, 滤去不溶物, 滤液通过处理好的阳

离子交换树脂, 水洗至中性, 取出树脂, 稍稍晾干, 用浓氨水调 pH 至 10 左右, 树脂用乙醚回流 3 次得乙醚提总碱 70.7 g, 取 50 g 乙醚提总碱, 溶于甲醇中, 滤去不溶物, 滤液通过 Sephadex LH 20 柱, 甲醇洗脱, 流速 1 mL/min, 流份经薄层层析检查浓缩合并成 6 份: Fr-1 (0.6 g), Fr-2 (0.9 g), Fr-3 (25.4 g), Fr-4 (7.0 g), Fr-5 (7.7 g), Fr-6 (0.7 g)。Fr-6、Fr-3、Fr-4、Fr-5 分别经硅胶柱层析、Sephadex LH-20-柱层析、制备薄层层析、重结晶等方法得 I ~ X 的各单体。

3 IX 的 N-oxide 的制备

10 mg IX 溶于 1 mL 乙醇中, 加入过量的 H₂O₂, 室温搅拌 16 h, 反应液加入水稀释, CHCl₃ 萃取, 无水 Na₂SO₄ 干燥, 过滤, 蒸去溶剂得产物, 经 ¹H NMR (CD₃OD) 鉴定为 16 β -hydroxy-19*R*-vindolinine N-oxide。

4 鉴定

化合物 I: 无色块状结晶, mp 165 °C ~ 166 °C, [α]_D - 308.5°(c, 0.118, CHCl₃), 与 CAS 试剂显蓝色, UV, ¹H NMR 数据与文献^[4,5]的 11-hydroxytabersonine 一致。

化合物 II: 无色块状结晶, mp 164 °C ~ 166 °C, 与 CAS 不显色, UV、IR 和 MS 数据均与文献^[6,7]的 scandine 一致。

化合物 III: 无定型粉末, 与 CAS 试剂显紫红色, UV、IR 和 MS 数据均与文献^[8]的 10-hydroxyscandine 一致。

化合物 IV: 与 CAS 试剂显蓝色, [α]_D - 595.1°(c, 0.122, CHCl₃), UV、IR 和 MS 数据与文献^[9]的 tubotaiwine 一致。

化合物 V: 与 CAS 试剂显蓝色, IR、MS、¹H, ¹³CNMR 数据与文献^[10]的 tubotaiwine N-oxide 一致。

化合物 VI: 无色块状结晶, mp 194 °C ~ 195 °C, [α]_D - 66.4°(c, 0.058, CH₃OH), 与 CAS 试剂显蓝色, 其 UV、IR、¹H, ¹³CNMR 数据与文献^[11]的 15-hydroxykopsinine 一致。

化合物 VII: 白色针晶, mp 241 °C ~ 242

℃, 与 CAS 显紫红色, $[\alpha]_D - 36.5^\circ$ (c, 0.0685, CHCl₃), 其 UV、IR、MS 数据与文献^[12]的 vincoline 一致。

化合物 VIII: 与 CAS 显紫红色, 其 UV、IR、¹H、¹³C NMR 数据与文献^[4]的 19R-vindolinine N-oxide 一致。

化合物 IX: 无色块状结晶, mp 208 ℃ (分解), 与 CAS 试剂显紫红色, IR、MS、¹H NMR 数据与文献^[2]的 16β-hydroxy-19R-vindolinine 一致。

化合物 X: 16β-hydroxy-19S-vindolinine N-oxide, 白色块状结晶, mp 200 ℃ (分解), CAS 显紫红色。LSIMS: $[M + H] = 369.1809$, 分子式 C₂₁H₂₅N₂O₄。UVλ_{max} (EtOH) (logε) nm: 205 (4.37), 243 (3.81), 289 (3.40)。IRν_{max}^{KBr} cm⁻¹: 3 445, 3 150, 1 713, 1 607, 1 473, 1 287, 756。EI-MS m/z: 368 (M⁺), 352, 334, 318, 303, 292, 273, 263, 247, 220, 207, 186, 170 (100), 158, 134, 122, 121。¹H NMR (DMSO-d₆) δppm: 7.27 (1 H, d), 6.92 (1 H, t), 6.57 (1 H, t), 6.52 (1 H, d), 6.30 (1 H, d), 5.87 (1 H, m), 4.73 (1 H, m), 4.21 (1 H, m), 3.81 (3 H, m), 3.65 (3 H, s), 2.89 (1 H, m), 2.85 (1 H, m), 2.10 (1 H, m), 1.98 (1 H, m), 1.92 (1 H, m), 1.51 (1 H, d), 0.45 (3 H, d)。¹H NMR (CD₃OD) δppm: 7.23 (1 H, d), 6.96 (1 H, t), 6.67 (1 H, t), 6.58 (1 H, d), 6.35 (1 H, dd), 5.90 (1 H, m), 4.66 (1 H, m), 4.35 (1 H, d), 3.98 (2

H, m), 3.67 (3 H, s), 2.95 (1 H, m), 2.89 (1 H, m), 2.00~2.30 (1 H, m), 1.55 (1 H, d), 0.52 (3 H, d)。¹³C NMR (DMSO-d₆) δppm: 82.9 (C₂), 72.2 (C₃), 69.0 (C₅), 40.8 (C₆), 56.2 (C₇), 133.6 (C₈), 123.0 (C₉), 118.1 (C₁₀), 125.9 (C₁₁), 108.3 (C₁₂), 149.9 (C₁₃), 127.9 (C₁₄), 130.9 (C₁₅), 74.9 (C₁₆), 34.6 (C₁₇), 9.3 (C₁₈), 49.9 (C₁₉), 43.5 (C₂₀), 89.1 (C₂₁), 173.0 (-C=O), 52.2 (-OCH₃)。

致谢: 川山橙由成都中医学院贾敏如教授采集鉴定。本所仪分室代测大部分光谱, 本室杨敬芝代测旋光, 北京市微量化学研究所洪少良教授代测部分核磁, 本所药理一室李洪燕代测药理活性。

参考文献

- 1 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志. vol63. 1979:24
- 2 Guo LW, et al. Phytochemistry, 1993;34(2):563
- 3 Atta-ur-Rahman, et al. Phytochemistry, 1983;22(4):1021
- 4 Christiene KF, et al. Ann Pharm Fr, 1968;26:577
- 5 Mehri H, et al. Ann Pharm Fr, 1972;30:643
- 6 Bernauer BK, et al. Helv Chim Acta, 1969;52:1886
- 7 李朝明, 等. 中草药, 1987;18(2):4
- 8 Zhou YL, et al. Planta Med, 1988;54:315
- 9 Kump WG, et al. Helv Chim Acta, 1964;47:1497
- 10 Pinar W, et al. Helv Chim Acta, 1972;55:2972
- 11 Linde HH, Pharm Acta Helv, 1970;45:248
- 12 Andriamialisoa RZ, et al. Tetrahedron Lett, 1976;3:163

(1998-04-23 收稿)

Studies on the Chemical Constituents of Hemsley Melodinus (*Melodinus hemsleyanus*)

Yan Kexu and Feng Xiaozhang (Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Chinese Xiehe Medical University, Beijing 100050)

Abstract 10 compounds were isolated from *Melodinus hemsleyanus* Diels, and their structures were determined by spectral analysis and chemical reactions. They were 11-hydroxytabersonine (I), scandine (II), 10-hydroxyscandine (III), tubotaiwine (IV), tubotaiwine N-oxide (V), 15α-hydroxykopsinine (VI), vincoline (VII), 19R-vindolinine N-oxide (VIII), 16β-hydroxy-19R-vindolinine (IX) and a new compound, 16β-hydroxy-19S-vindoline N-oxide (X). Pharmacological screening revealed that I had antitumor activity.

Key words *Melodinus hemsleyanus* Diels. indole alkaloids 16β-hydroxy-19S-vindolinine N-oxide