静脉滴注双黄连粉针剂致胡萝卜素沉着症 3 例报告

广西北海市人民医院儿科(536000) 孟粤茂

双黄连粉针剂是由银花、黄芩、连翘提取物制成的纯中药制剂,现代药理研究其所含的氯原酸、黄芩苷、连翘酚具有双重抗菌(抗细菌、抗病毒)作用,临床使用安全、方便,且已广泛用于儿科临床。以往临床使用未见有致胡萝卜素沉着症的报告,现将我院发现的 3 例报告如下。

例 1 女性,3 岁,因患上呼吸道感染住院,用双黄连粉针剂(哈尔滨中药二厂生产、批号 970435) 0.75 g 加 10%葡萄糖 250 mL 静滴,在用药 2 h 后出现皮肤轻度黄染并渐加重,无其他不适,滴入约 200 mL 后停药。体查:皮肤中度黄染,以手、足心明显外无其他新发现,尿三胆检查阴性,未作特殊处理,于停药 2 d 后黄染完全消退。

例 2 女性,2 岁半,因上呼吸道感染,门诊用双黄连 0.6 g 加 10%葡萄糖 150 mL 静滴(生产厂家

及批号同上),在滴完液 1 h 后发现皮肤黄染,无不适。体查:皮肤轻度黄染,手、足心中度黄染。查肝功能 GPT 轻度升高,停药 2 d 后黄染自然消退。

例 3 男性,4 岁,因急性支气管炎用青霉素治疗 2 d 无效,加用双黄连 0.9 g 加 10%葡萄糖 250 mL 静滴(生产厂家及批号同上),在滴完双黄连后 2 h 发现皮肤黄染,黄染特征同上,于停药后 3 d 自然消退。

3 例病人在应用双黄连静滴时或滴完 1 h~2 h 内出现皮肤轻——中度黄染,黄染均以手、足心明显,均无巩膜的黄染,为典型的胡萝卜素沉着症表现,停药后消退时间为 2 d~3 d。是否因药物色素黄染导致,其机制不明,仅此提醒医药工作者注意。

(1998-04-23 收稿)

昆明山海棠片引起不良反应 1 例

重庆市沙坪坝区药品检验所(400030) 宁旺榕

昆明山海棠片具有祛风除湿、舒筋活络、清热解毒功能,用于类风湿性关节炎、红斑狼疮。每片含昆明山海棠干浸膏 0.25 g,临床上常作为血小板减少症的辅助用药。《中国药典》一九九五年版一部“〔注意〕:肾功能不全者慎用”。现报道该药引起的 1 例不良反应。

患者女 23 岁,因血小板偏低($60 \times 10^9/L$),服用:1)利血生片(中外合资镇江吉贝尔药业有限公司出品,批号 970908,规格 10 mg/片,每日 3 次,每次 2 片);2)昆明山海棠片(广东和平制药厂出品,批号 961205,每日 3 次,每次 2 片);3)维生素 C 片(西南制药一厂出品,批号 970710,规格 100 mg/片,每日 3 次,每次 1 片)。用药 2 次,即用药约 9 h 后,患者感

觉下腹膀胱有下坠感,有尿意,但只排出少量尿液,相距约 15 min,又觉有尿意,也只排出少量的尿,如此反复,甚至有时无滴尿排出。患者不知是哪种药引起如此反应,晚上服药时,就停用利血生片,继续服用昆明山海棠片及维生素 C 片,结果又出现膀胱下坠感,尿意频繁,且尿量极少。第 2 日,患者停服昆明山海棠片,只服用利血生片及维生素 C 片,全天服用 3 次,未出现任何不适反应。

患者除血小板偏低及有轻度贫血外,心、肺、肝、肾功能均正常,但仍引起肾功能的不良反应,其原因尚不明确,提醒临床应用时注意。

(1998-06-23 收稿)