蒙药紫花高乌头根中二萜生物碱的分离与鉴定[△]

内蒙古医学院药学系天然药化教研室(呼和浩特 010059) 张树祥* 贾世山**

摘 要 从紫花高乌头根的苯提取物中分离到 3 个二萜生物碱, 经理化性质和光谱分析分别鉴定为 lappaconitine(I)、ranaconitine(II) 和 septentriodine(III)。化合物 II 和 III 为首次从该植物中分离到, 其中 II 含量最高, 根据文献报道 I 和 II 是抗心率失常和镇痛作用的有效成分。

关键词 紫花高乌头 二萜生物碱 lappaconitine ranaconitine septentriodine

Isolation and Identification of Diterpenoid Alkaloids from Mongolian Folk Medicine Purpleflower High Monkshood Root (*Aconitum excelsum*)

Zhang Shuxiang and Jia Shishan (Department of Pharmacy, Inner Mongolia Medical College, Huhehaote 010059)

Abstract Three diterpenoid alkaloids were obtained from the C₆H₆ extract of the root of *Aconitum excelsum*. Their structures were identified on the basis of spectral data (MS, IR, ¹HNMR, ¹³CNMR, DEPT) and physico-chemical properties as lappaconitine (I), ranaconitine (II) and septentriodine (III). Compounds II and III were obtained for the first time from this plant. Compounds I and II exhibited analgesic and antiarrhythmic activities, as documented in literature reports.

Key words *Aconitum excelsum* diterpenoid alkaloids

紫花高乌头 *Aconitum excelsum* Reichb 系毛茛科乌头属牛扁亚属植物, 其根和地上部分为习用蒙药, 主产于内蒙古自治区东部。紫花高乌头块根用于活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛^[1], 内蒙古自治区锡林郭勒盟蒙医研究所用其全草治疗慢性支气管炎有效率达 96.89%, 获得 1991 年度内蒙古自治区科技进步三等奖^[2]。前苏联学者在 50 年代和 70 年代曾对其根进行过研究, 从中分离到 4 个二萜生物碱^[3,4], 本文中 lappaconitine 为重复得到。lappaconitine 及其溴化物证明有较强的抗心率失常作用和镇痛作用, 且没有成瘾性, 已经用于临床^[5,6]。

为了寻找含有高效低毒活性成分的植物资源, 开发新药, 我们对紫花高乌头根的化学

成分进行了研究。其根的苯提取物溶于 1% HCl 溶液后用固体 Na₂CO₃ 碱化, 对 pH 10 时析出的沉淀部分用碱化硅胶柱层析进行分离, 得到 3 个二萜生物碱, 分别鉴定为 lappaconitine(I)、ranaconitine(II) 和 septentriodine(III), 其中 II 和 III 系首次从本植物根中得到。II 和 I 一样也有显著的镇痛和抗心率失常作用, 并且有抗戒毒综合征的作用^[5,6]。化合物 I ~ III 的化学结构式见图 1。

1 材料与仪器

生药原料采集于内蒙古自治区兴安盟, 经本院中草药教研室乔俊缠老师鉴定为毛茛科乌头属植物紫花高乌头, 学名为 *Aconitum excelsum* Reichb。熔点用 X-4 型显微熔点测定仪测定(温度计未校正), 红外光谱仪为日

* Address: Zhang Shuxiang, Department of Pharmacy, Inner Mongolia Medical College, Huhehaote
张树祥 1993 年毕业于内蒙古医学院药学专业本科, 1998 年获该院药物化学专业硕士学位。

** 通讯联系人

[△]国家自然科学基金资助项目 No 39560087

图1 化合物 I ~ III 的化学结构式

本岛津 IR-440 型 (KBr 压片), 质谱仪为 VG-Zabspec 型, 核磁共振仪为 AM-500 型 (CDCl₃ 为溶剂, TMS 为内标), 薄层及柱色谱用硅胶系青岛海洋化工厂生产, 中性或碱性氧化铝 (200~300 目) 为上海五四化学试剂厂生产。

2 提取与分离

内蒙古产紫花高乌头干燥根磨粉 3.1 kg, 碱化润湿后用苯冷浸提取, 提取液减压浓缩到适当体积, 用 1% HCl 溶液萃取, 酸水液用固体 Na₂CO₃ 碱化到 pH 5, 用苯萃取, 继续碱化到 pH 10 析出大量沉淀, 过滤得沉淀即粗总碱 33.3 g。取粗总碱 10 g 拌样后上碱化硅胶低压柱进行分离, 苯-甲醇不同比例梯度洗脱, 共收集 300 份, 每份 200 mL。洗脱剂为 100:1 时, 收集第 80~84 份, 得到的样品再上减压硅胶柱层析, 苯-甲醇 (100:1) 洗脱, 收集第 57~73 份, 用丙酮重结晶得化合物 I 12 mg; 同样洗脱剂收集第 94~119 份, 所得样品用苯-甲醇混合溶剂重结晶, 得到化合物 II 260 mg; 收集第 155~189 份, 样品上碱性氧化铝减压柱分离, 苯-甲醇 (300:1) 洗脱, 合并第 15~85 份得化合物 III 10 mg。

3 结构鉴定

化合物 I (lappaconitine): 无色块状结晶, mp 228 °C ~ 231 °C, EI-MS m/z (%): 584 (M⁺, 2), 553 (M⁺ - 31, 20), 405 (M⁺ - 179, 100), 390 (M⁺ - 179 - 15, 85), 345 (44), 276 (34), 178 (41), 162 (32), 120 (43), 71 (35)。IR ν_{max}^{KBr} cm⁻¹: 3 560, 3 550 (OH), 3 300 (NH),

1 700, 1 690 (-C=O), 1 600, 1 580 (苯环), 1 090 (-C-O), 770, 700 (苯环部二取代); ¹H NMR δ: 1.12 (3 H, t, J = 7.0 Hz, N-CH₂CH₃), 2.22 (3 H, s, -COCH₃), 3.30, 3.31, 3.41 (3 H × 3, s, OCH₃ × 3), 3.44 (1 H, d, J = 4.7 Hz, C₁₄-βH), 7.02, 7.49, 7.92, 8.67 (4 个芳氢), 11.04 (1 H, s, -CONH-); ¹³C NMR 和 DEPT 数据见表 1。其光谱数据与文献^[8] lappaconitine 的一致。

化合物 II (ranaconitine): 无色块状结晶, mp 129 °C ~ 132 °C, EI-MS m/z (%): 600 (M⁺, 4), 855 (M⁺ - 15, 5), 569 ((M⁺ - 31, 30), 421 (M⁺ - 179, 100), 406 (M⁺ - 179 - 15, 95), 361 (51), 292 (45), 178 (36), 162 (41), 120 (50), 71 (41); IR ν_{max}^{KBr} cm⁻¹: 3 500 (brs, OH), 3 300 (-NH), 1 700, 1 680 (-CO-), 1 612, 1 590 (苯环), 990 (C-O), 760, 690 (苯环邻二取代); ¹H NMR δ: 1.11 (3 H, t, J = 7.1 Hz, N-CH₂CH₃), 2.22 (3 H, s, -COCH₃), 3.26, 3.32, 3.41 (3 H × 3, s, -OCH₃ × 3), 3.47 (1 H, d, J = 4.4 Hz, C₁₄-βH); ¹³C NMR 和 DEPT 数据见表 1。其光谱数据与文献^[7,9,10] 的 ranaconitine 一致。

化合物 III (septentriodine): 白色不定形粉末, EI-MS m/z (%): 700 (M⁺, 2), 682 (M⁺ - 18, 17), 669 (M⁺ - 31, 30), 637 (M⁺ - 63, 100), 620 (14), 436 (16), 202 (62), 174 (28), 120 (17), 71 (27); IR ν_{max}^{KBr} cm⁻¹: 3 450 (OH), 3 300 (-NH), 1 740, 1 700, 1 685 (-C=O), 1 610, 1 590 (苯环), 990 (C-O), 760, 700 (苯

环邻二取代); ¹H NMR δ: 1.07 (3 H, t, J = 7.2 Hz, N-CH₂CH₃), 2.75 (4 H, m, -COCH₂CH₂CO-), 3.26, 3.35, 3.38, 3.41 (3 H × 4, s, OCH₃ × 4), 3.43 (1 H, t, J = 4.7 Hz,

C₁₄-βH), 3.70 (3 H, s, -COOCH₃); 7.10, 7.55, 7.96, 8.70 (4 个芳氢), 11.09 (1 H, s, -CONH-); ¹³C NMR 和 DEPT 数据见表 1。其光谱数据与文献^[11]的 septentriodine 一致。

表 1 化合物 I, II, III 的 ¹³C NMR 数据

碳位	I	II	III	碳位	I	II	III
1	84.1 d*	83.5 d	83.9 d	N-CH ₂	49.8 t	51.1 t	51.0 t
2	26.2 t	26.6 t	26.1 t	-CH ₃	13.5 q	14.5 q	14.0 q
3	31.8 t	31.6 t	32.2 t	1'	56.5 q	56.2 q	55.8 q
4	84.6 s	84.3 s	37.5 s	6'	—	—	57.8 q
5	48.5 d	48.7 d	43.2 d	14'	57.9 q	57.9 q	58.1 q
6	26.7 t	32.5 t	90.9 d	16'	56.1 q	56.2 q	56.3 q
7	47.6 d	85.5 s	88.5 s	Ar-C≤O	167.4 s	167.4 s	168.0 s
8	75.6 s	77.9 s	77.5 s	Ar-1''	115.8 s	115.7 s	114.6 s
9	78.5 s	78.3 s	50.5 d	-2''	141.6 s	141.6 s	141.7 s
10	49.0 d	49.7 d	38.1 d	-3''	120.2 d	120.2 d	120.6 d
11	51.0 s	51.4 s	49.1 s	-4''	134.4 d	134.4 d	134.9 d
12	24.1 t	25.9 t	28.7 t	-5''	122.3 d	122.3 d	122.5 d
13	36.3 d	36.6 d	46.1 d	-6''	131.1 d	131.1 d	130.3 d
14	90.1 d	90.0 d	83.9 d	-NH-C≤O	169.0 s	169.0 s	170.2 s
15	44.9 t	38.0 t	33.7 t	-CH ₂ -	25.5 q	25.5 q	28.9 t
16	82.9 d	82.8 d	82.5 d	-CH ₂ -	(-CH ₃)	(CH ₃)	32.7 t
17	61.5 d	63.0 d	64.4 d	-C≤O			173.0 s
18	—	—	69.8 t	-OCH ₃			51.8 q
19	55.5 t	55.2 t	52.4 t				

* q, t, d, s 分别表示 DEPT 谱中的 -CH₃-, -CH₂-, >CH- 和季碳

致谢: 兴安盟药检所赵晓峰同志协助采集样品, 本系乔俊嬗老师作原植物鉴定, 分析化学教研室代测 IR, 中国医学科学院药物所代测 ¹H NMR, ¹³C NMR, DEPT, 中国军事医学科学院代测质谱, 在此一并致谢。

参考文献

1 国家医药管理局主编. 中国药物资源杂志, 1994, 304
 2 呼和吉勒图, 等. 内蒙古中医药, 1989, (3): 9
 3 Platonova T F, *et al.* *Thur Obsheci Khim*, 1958, (28): 258
 4 Telnor V A, *et al.* *Chem Nat Compds*, 1973, 9(1): 129

5 US Patent. 1994, 5290784
 6 Dzbakhangirov F N, *et al.* *Chem Nat Compds*, 1997, 32(2): 190
 7 从浦珠. 质谱学在天然有机化学中的应用. 北京: 科学出版社, 1987: 450
 8 Shakirov R, *et al.* *Chem Nat Compds*, 1996, 32(4): 601
 9 王锋鹏. 有机化学, 1982, (3): 161
 10 Shakirov R, *et al.* *Chem Nat Compds*, 1996, 32(5): 805
 11 Shakirov R, *et al.* *Chem Nat Compds*, 1996, 32(5): 834

(1998-07-08 收稿)

《中草药》杂志 1999 年增刊征订启事

1999 年是《中草药》杂志创刊 30 周年, 经国家科技部国科发财字[1999]010 号文批准, 我们编辑出版了《中草药》杂志 1999 年第 30 卷增刊。本增刊共刊载论文 160 篇, 特邀中国工程院院士、国家药品监督管理局药品审评中心及国内十多位知名专家和中青年学科带头人就中药新药研究的热点问题撰写综述文章(文题见《中草药》杂志 1999 年第 4 期内 2 页)。另外, 还有反映国内近年来中药植化、药理、分析、制剂、药材、临床等方面的新理论, 新方法和新成就的科研论文和综述文章 140 余篇。

增刊为 16 开本, 224 页(约 45 万字), 天津市报刊增刊特准印证(99)第 045 号, 定价 65 元, 另加包装费、邮费 5 元。凡订购者请向我部索取订单: 300193 天津市鞍山西道 308 号《中草药》杂志编辑部