图3 沉降时间与得率的关系

A-标准品 B,C-铵盐产品

图4 产品 HPLC 图

甘草酸铵盐,各项检测指标均达到国际标准要求,甘草酸含量比国际标准要高一些。

表2 粒度对甘草提取的影响

粒度	粗粉 (过40 目筛)	薄片(厚 2~3 mm, 长3~5 cm)	厚片(厚 3~5 mm,长 3~5 cm)	片段(不 纵切,长 3~5 cm)
提取物(%)	27.61	36.45	34.31	29.04
甘草酸(%)	21.92	28.00	26.42	23.44

甘草甜素的收率为甘草重量的3.4%~3.5%,黄酮类化合物的收率为甘草重量的7%,大大提高了原料的利用率,为甘草加工企业的综合利用提供实验室依据。

3.2 本工艺的废渣可回收木质素和纤维素,对此有关文献已有研究。

参考文献

- 1 胡金峰,等. 中草药,1995,26(1):39
- 2 CA, 95:199935y
- 3 刘伯衡,等. 干旱区研究. 1992,9(1):39
- 4 乔仲和,等. 中草药,1997,28(9):522
- 5 王秀英. 食品工业科技,1993, 3:59
- 6 CA, 120:381289,

(1998-11-12 收稿)

反相离子对 HPLC 法测定情安喘定片中微量盐酸克仑特罗

厦门中药厂(361009) 杨珊瑛*

摘要 用反相离子对 HPLC 法测定情安喘定片中微量盐酸克仑特罗的分析条件和测定方法。试验证明:本方法线性范围在 4~26 μg 之间, $r=0.9998$, 平均回收率为 92.78%, 精密性 $RSD(n=5)$ 为 0.80%。

关键词 反相离子对 HPLC 法 情安喘定片 盐酸克仑特罗。

情安喘定片系治疗喘症中热痰阻肺证的国家基本药物,具有平喘、镇咳、祛痰作用,现有标准未收载含量测定方法,方中盐酸克仑特罗(clenbuterol hydrochloride)是一种拟肾上腺能药^[1,2]。国内文献报道的测定方法有比色法、薄层扫描法、滴定法;而 HPLC 法测定中成药中微量盐酸克仑特罗的方法未见报道。笔者利用离子对缓冲液^[3,4],建立一种专

属性好、灵敏度高、结果准确可靠的测定制剂中微量盐酸克仑特罗的方法。

1 仪器与试剂

高效液相色谱仪(美国 SP8800),乙腈为色谱纯,其它试剂均为分析纯,盐酸克仑特罗对照品(上海申隆制药厂),情安喘定片为我厂产品。

2 实验方法

* Address: Yang Shanying, Xiamen Factory of Traditional Chinese Medical, Xiamen

杨珊瑛 1983年毕业于福建省福州大学化学系物理化学专业,获理学士学位,1992年被评为化学工程师。几年来,主要从事中成药质量标准研究。

2.1 色谱条件:色谱柱为 YWG C₁₈(10 μm) 柱 250 mm×4.6 mm(中国科学院大连化学物理研究所),流动相:乙腈-离子对缓冲液(含 0.025 mol/L SDS+0.02 mol/L 冰醋酸,1 mol/L 氢氧化钠调 pH=3.5)为 45:55,检测波长为 245 nm,柱温为室温,流速为 1.0 mL/min。

2.2 线性关系:精密称取经 105℃干燥至恒重的盐酸克仑特罗对照品适量,置 50 mL 量瓶中,加适量 1%盐酸使溶解,并加 1%盐酸至刻度,配制成 200 μg/mL 的溶液作为盐酸克仑特罗的标准溶液。精密吸取对照品溶液 0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2 mL 置 10 mL 量瓶中,加 1%盐酸稀释至刻度,摇匀。将上述溶液 10 μL 注入色谱系统中,照上述色谱条件分析。结果盐酸克仑特罗峰面积积分值 Y 与浓度 X(μg/mL)呈良好的线性关系,回归方程为: $Y = 7631.67 - 1349.20X$, $r = 0.9998$,线性范围为 4~26 μg/mL。

2.3 精密度试验:取同一对照品溶液,重复进样 5 次,测得盐酸克仑特罗峰面积积分值, $RSD(n=5)$ 为 0.80%。

2.4 样品测定:精密称取样品粉末 5 g,置具塞锥形瓶中,加 30 mL 乙醇,超声处理 1 h,静置,过滤,残渣用少量乙醇洗涤并入滤纸中,用乙醇 20 mL 洗涤,水层用 40%氢氧化钠溶液调节 pH=9~10,用氯仿提取 4 次(25,15,15,15 mL),氯仿提取液置水液上蒸干,放冷;残渣用少量 1%盐酸溶解,移入 5 mL 量瓶中,用 1%盐酸稀释至刻度,摇匀,用 0.45 μm 滤膜滤过,滤液为供试品溶液。

分别吸取供试品溶液与对照品溶液 10 μL 进样分析,依盐酸克仑特罗色谱峰面积,按外标法计算其含量。结果见表 1。

表 1 样品测定

批号	盐酸克仑特罗含量(μg/g)	批号	盐酸克仑特罗含量(μg/g)
970501	8.0553	980802	8.1905
970601	7.7851	980804	7.8689
970602	8.2300	980806	10.1135

另取空白样品,同法制备空白溶液,按上

述方法测定。供试品、盐酸克仑特罗对照品及空白样品色谱图见图 1。从色谱图上可以看出空白液对盐酸克仑特罗的测定无干扰。

图 1 样品色谱图

2.5 重现性试验:按样品测定法对同批样品测定 5 次,结果 $RSD=3.5\%$ 。

2.6 回收率试验:采用加样回收法。精密称取已知盐酸克仑特罗含量的样品粉末 5 g,再精密添加一定量的盐酸克仑特罗对照品;同样品测定法处理,测定盐酸克仑特罗的含量。结果平均回收率为 92.79%, $RSD(n=5)$ 为 2.10%。

3 讨论

盐酸克仑特罗作为一种成盐胺类药物,利用其分子中的特性部位,采用高效液相色谱中二次化学平衡原理,通过 pH 和离子对技术进行离子化控制,形成离子对化合物(RMH_3^+ , RSO_4^-),增加盐酸克仑特罗在固定相中保留值,从而达到色谱分离的最佳化。这就是本实验新建立的高效液相色谱分析系统-反相离子对色谱。它具有专属性好,选择性高,灵敏度好的优点,适用于制剂中微量盐酸克仑特罗的检测。

1 Qureshi G A, et al. J Chromatogr, 1988, 441(1): 197
 2 Biondi P A, et al. J Chromatogr Sci, 1991, 29(5): 190

3 Signoretti E C, et al. J Chromatogr, 1989, 473(1): 301
 4 Courtheyn D, et al. J Chromatogr, 1991, 564(2): 537
 (1999-1-12 收稿)

HPLC 法测定卡瓦胡椒中不同部位卡瓦内酯的含量

湖南华湘宏生药业发展公司(长沙 40007)

曾建国

湖南宏生堂制药有限公司

宋云飞

湖南宏生药物研究所

侯团章 陈玉秀

卡瓦胡椒 *Piper methysticum* 是一种生长于热带及亚热带地区的低矮灌木, 广泛分布于南太平洋群岛, 具有镇静、催眠、抗菌、止痛等多方面的药理作用, 在欧美等地广泛应用于营养补充剂和草药制剂等。我们采用 HPLC 的方法对不同部位的药材卡瓦内酯(kavalactones)含量进行监控, 用以指导原药材的进口采购。

1 材料与仪器

材料: 卡瓦胡椒购自斐济, 均已晒干, 其中包括茎、茎结节、根、根与茎的结节。Perkin-Elmer 高效液相色谱仪(美国), 包括: Serries-200 高压泵, 785A 检测器, Turbo 色谱工作站。

甲醇、磷酸为分析纯, 乙腈为色谱纯, 水为重蒸馏水, kavain 对照品购自美国。

2 实验方法

2.1 色谱条件: 色谱柱: Hypersil ODS(4.6 mm × 250 mm) 5 μ; 流动相: 甲醇-乙腈-水-磷酸(150: 150: 200: 0.2), 流速: 0.8 mL/min; 检测波长: 256 nm; 柱温为室温。

2.2 对照品溶液的制备: 精密称取 kavain 标准品 10 mg 置 100 mL 的容量瓶中, 加少量甲醇溶解, 然后定容至刻度, 配成浓度为 0.1 mg/mL 的溶液。

2.3 供试品溶液的制备: 卡瓦胡椒原药材打粉(过

80 目筛), 混合均匀, 精密称取原药材粉末 0.2 g, 置 50 mL 的圆底烧瓶中, 加入 25 mL 氯仿 50 °C 回流提取 3 h, 过滤, 滤液减压浓缩至干, 残留物用少许甲醇溶解, 并转移至 25 mL 的容量瓶中, 定容, 摇匀。取少许用 0.45 μm 的微孔滤膜过滤。

2.4 测定: 取对照品溶液和供试品溶液各 5 μL 注入液相色谱仪进行分析(见图 1)。

1~6 化合物见表 1

图 1 卡瓦胡椒药材 HPLC 图

除 kavain 外, 其余峰位置的确认及其换算因子均系参考文献^[3,4]而得。总内酯含量按下式计算:

$$\text{kavalactones \%} = \frac{\sum(f_i \times A_i)}{A_s} \times C_s \times V \times 100\%$$

A_i : 为某一种内酯的峰面积; A_s : 为标准品峰面积; C_s : 为标准品的浓度(mg/mL); V : 为样品定容的体积(mL); W_m : 为样品的称样量(g); f_i : 为相关因子。

3 结果与讨论

表 1 各成分的 f_i

编号	1	2	3	4	5	6
成分名称	methylsticin	dihydromethylsticin	kavain	dihydrokavain	demethoxyyangonin	yangonin
换算因子(f_i)	2.04	2.38	1	3.33	1.89	2.78

3.1 对同一株原植物不同部位分别进行含量分析, 每个样品分析 5 次, 结果见表 2。

表 2 表明, 该株卡瓦胡椒中卡瓦内酯以根的含量最高, 其次为根与茎的结节, 茎的含量最低。

3.2 对随机抽取的三支根的不同部位进行含量分

析, 其结果见表 3。

方差分析表明, 根的三个部位之间的含量有显著性差异(0.01 < P < 0.05), 且侧根的含量高于主根和茎与根的结节部位。

(下转第附 6 页)