

痹祺胶囊祛痛作用的临床观察

天津达仁堂制药二厂(300112) 王景文* 袁雪海

摘 要 通过 202 例的临床研究,观察了痹祺胶囊对人体关节、肌肤筋骨等组织的祛痛作用,结果表明疗效显著,总有效率为 91.9%,已被中西医临床医师所肯定。

关键词 痹祺胶囊 祛痛 临床观察

痹祺胶囊是天津达仁堂制药二厂根据安徽省著名老中医吴香山祖传秘方研制而成。由党参、白术、丹参、川芎、三七、马钱子等十多味中药组成,具有益气养血,祛风除湿,活血止痛的功效。用于气血不足,风湿痹阻,肌肉关节酸痛,关节肿大、僵硬变形及风湿、类风湿性关节炎等症。通过 202 例的临床观察,结果表明痹祺胶囊对于人体关节、肌肤筋骨等组织疼痛的疗效较好,其祛痛作用显著。

1 临床资料

202 例病人均来自中医科、中西医结合科和骨伤科的门诊中各种原因所致的各部位如肌肉、骨关节等的疼痛病人。临床观察病例中的中、西医诊断都是经过门诊主治医师以上确诊的病人。本报告 202 例中,男性 99 例,女性 103 例,最小年龄 18 岁,最大年龄 80 岁。其中以 21~40 岁青壮年组居首位,110 例占 54%,41~60 岁组 70 例占 34%。

2 治疗方法

痹祺胶囊为口服剂,每日 3 次,每次 3~4 粒,饭后 1 h 温开水送下,每 3 日复诊 1 次,观察服药后的反应和效果。一般 9 d 为 1 个疗程,个别病人可用 2 个疗程。在服用本剂之前,停用其它药物。

3 疗效结果

3.1 疗效判断标准:①显效:全部症状消除或主要症状——疼痛消除,关节功能基本恢复,能参加一般工作。②有效:主要症状基本

消除,疼痛减轻,关节功能基本恢复或有所进步,能生活自理,做些轻工作。③无效:服药至第 9 天或更长点时间,症状未减轻,各方面无进步。

3.2 临床情况及效果分析

3.2.1 服药时间与效果分析:见表 1。

表 1 服药时间与效果分析

效果	服药 3 d		服药 6 d		服药 9 d		服药 9 d 以上		合 计	
	例	%	例	%	例	%	例	%	例	%
显效	0	0	27	40.3	56	47.8	8	66.7	91	45.05
有效	5	83.3	35	52.3	52	44.4	1	8.3	93	46.05
无效	1	16.7	5	7.4	9	7.8	3	25	18	8.9

3.2.2 西医疼痛诊断与效果分析:见表 2。

表 2 西医疼痛诊断与效果分析

效果	显 效		有 效		无 效	
	例	%	例	%	例	%
坐骨神经疼	2	100	0	0	0	0
网球肘关节疼	3	27.3	5	45.4	3	27.3
肩周炎	5	41.7	7	58.3	0	0
肌肉疼痛骨刺	7	63.6	4	36.4	0	0
增生性脊柱炎腰疼	7	36.8	12	63.2	0	0
挫伤扭伤局部疼	11	61.1	7	38.9	0	0
风湿性劳损性腰疼	23	40.3	29	50.9	5	8.8
风湿性关节炎	33	45.8	29	40.3	10	13.9
合计	91	45	93	46.1	18	8.9

从表 2 可见,痹祺胶囊对风湿性关节炎疼痛和挫伤、扭伤局部疼痛的效果最佳。其次由于劳损类型所致的肩周炎和腰疼也有明显效果。

另外,对坐骨神经疼、骨刺以及其它疼痛服药后,也同样收到较好的效果。由于病例少,待进一步观察。

* Address: Wang Jingwen, Tianjin Darentang Pharmaceutical No. 2 Factory, Tianjin
王景文 黑龙江商学院中药系 82 级毕业生,工学学士学位,工程师。专业研究方向:中药制药、中药开发及管理。

表 3 中医痹症分型与效果分析

效果	显 例	效 %	有 例	效 %	无 例	效 %
湿热型痹症	34	54.0	25	39.7	4	6.3
湿寒型痹症	23	41.1	28	50.0	5	8.9
血瘀型痹症	17	60.7	11	39.3	0	0
两虚型痹症	10	38.5	12	46.1	4	15.4
风寒型痹症	5	41.7	7	58.3	0	0
其它痹症	2	11.8	10	58.8	5	29.4
合计	91	45.0	93	46.1	18	8.9

根据中医痹症(症候、脉象、舌苔等)的特征,分为 5 型,有些类型的痹症或临床分型不太明确,例数也少,所以归在其它类型。痹祺胶囊对各类型痹症均有不同疗效。其中对湿热型和血瘀型痹症的临床效果显著,显效率分别达 54%、60%,其次,对湿寒型和风寒型痹症的临床效果也较明显,显效率在 41%以上,另外,对肝肾两虚或气血两虚的痹症也有

效。

4 讨论

痹祺胶囊各种原因(包括西医角度、中医角度)致人体关节、肌肤、筋骨等组织的疼痛均有良好的效果,临床观察 202 例,其中显效率为 45%,有效率 46.1%,无效率 8.9%,总有效率 91.1%。

本制剂为中药剂型改革产品(粉末胶囊),服药方便、副作用少,普遍反映服用本剂后,除有消除疼痛效果快之外,还可增进食欲,消除疲劳感,使关节活动灵活,受到患者欢迎。

服用本制剂,一般在服药后第 6 天显示效果,服药第 9 天后效果更显著。故定为服药 9 d 为 1 个疗程是适宜的。

(1999-05-08 收稿)

大黄合剂对急性重症胆管炎大鼠
血氧自由基、磷脂酶 A₂ 和血浆 PGF_{1α}/TXB₂ 的影响

天津职工医学院(300052) 沈 彬*
南开大学 吴 雪 王新宇

急性重症胆管炎(Acute Cholangitis of Severe Type, ACST)起病急骤、病程凶险,病死率高。临床上利用内镜减压配合使用大黄合剂治疗,取得较好疗效。本实验目的旨在观察大黄合剂对血氧自由基、磷脂酶 A₂ 和血浆 PGF_{1α}/TXB₂ 的影响。

1 材料和方法

1.1 治疗药物:大黄合剂由大黄、白头翁、败酱草、

丹参、茵陈和甘草按一定比例配伍,水煎醇沉法制成 1 g/mL 药液,ig 给药,剂量为每次 1 mL/100 g 体重。此方在临床应用中疗效满意,动物实验探讨其治疗机制,因此动物实验中给予的剂量为临床上每公斤体重剂量的 10 倍。各组动物治疗措施及采集标本时间见表 1。

1.2 动物:Wistar 大鼠 53 只(军事医学科学院实验

表 1 各组动物治疗措施及标本采集时间(h)

分组	0(第一次剖腹)	48	60(第二次剖腹)	72	84	96
对照组	假手术	生理盐水	开关术+生理盐水	生理盐水	生理盐水	取标本
造模组	开关术	制模型+生理盐水	生理盐水	生理盐水	生理盐水	取标本
减压组	制模型	生理盐水	减压+生理盐水	生理盐水	生理盐水	取标本
中药组	制模型	中药	减压+中药	中药	中药	取标本

* 沈 彬 1970 年毕业于天津医学院。现任天津职工医学院院长,教授、主任医师,硕士研究生导师。多年来一直从事中西医结合治疗急腹症的教学、临床、实验研究工作。获中国中医药管理局科技进步三等奖 1 项。主持和参与省部级科研项目 6 项,发表论文 30 余篇。