

不适者 1例

4 讨论

藿香正气水方源于《太平惠民和剂局方》,由藿香、大腹皮、紫苏、茯苓、白芷、陈皮、白术、厚朴、半夏曲、桔梗、甘草 11味中药组成。方中藿香辛温,理气和中,辟秽止呕;外散表邪,内祛秽浊,兼治表里,是本方主药;紫苏、白芷、桔梗散寒利膈,佐之解表邪;厚朴、大腹皮行气利水消满;陈皮、半夏逆燥湿祛痰,佐之疏里滞;茯苓、白术、甘草健脾祛湿,扶助正气,使表里同治则寒热胀满可除,升降复常则呕吐泄泻可止,邪气去正自安,正气复则足以御邪^[1],故为暑令良药。近年来,临床实践进一步扩大了本方应用范围,发现正气水还可治疗某些变态反应性疾病,如对药疹、春季结膜炎也有较好疗效^[2,3]。我们的资料也进一步证明此疗效,正气水观察组总有效率为 67.8%,与克敏对照组相比,经统计学处理差异无显著性意义,患者用药后初为口唇血管性水肿及风团,持续时间缩短,程度减轻,以后皮肤划痕征转为阴性,痒感消失,尤为有意义的是,正气水尤其对寒冷性荨麻疹疗效较佳。

慢性荨麻疹病机多因禀赋不耐,又食鱼虾等腥荤动风之物,或因虫积脾胃,饮食不节,卫表不固,复感风热,风寒之邪,郁于肌肤所致^[4]。其因与风、寒、湿与正气亏损有关。故得益于藿香正气之芳香辟秽,升清降浊,扶正祛邪,散寒除湿之功效来清除慢性荨麻疹患者之风、寒、湿气,进而使正气回复(增强自身

修复功能),风团消退,瘙痒自瘥。

现代医学已证实,本组方中多种药如紫苏、陈皮及甘草等具有抗过敏作用^[5],全药方尚能稳定肥大细胞膜,阻止炎性介质释放^[6];抑制由组胺、乙酰胆碱及氯化钡所致的豚鼠回肠收缩;并且,正气水对八叠球菌、金葡菌等具有抑制作用^[7],这种抗过敏、解痉及抗菌抗炎作用为正气水治疗过敏性疾病奠定了一定的理论基础,也是正气水与抗组胺药作用环节不同之处。

通过观察得知,正气水平均治愈时间(d)为 26.1±14.9,对照组为 16.9±7.1,提示正气水治疗疗程较克敏组为长,服药后起效缓慢,须坚持服药一定时间,这符合中药性情平和特点。资料曾报道极少数过敏体质者服正气水可引起休克,药疹等过敏反应^[8],但本组观察病例无一例出现不良反应,且由于该药完全无中枢抑制、口干、乏力及头昏等副作用,不影响患者日常生活、工作及学习,价格低廉,此为该院治疗本病优势所在,值得进一步观察研究。

参 考 文 献

1 成都中医学院方剂教研组编. 中医治法与方剂. 北京: 人民卫生出版社, 1972 122

2 莫文林. 中国民间疗法, 1995, 28(6): 11

3 朱寿彭. 中国中医眼科杂志, 1996, 6(4): 204

4 刘辅仁编. 实用皮肤病学. 第 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 1996 266

5 邓文龙编. 中药方剂药理与应用. 重庆: 重庆出版社, 1990 426

6 余传星,等. 中医药研究, 1994, 8(4): 60

7 刘中煜,等. 中草药, 1984, 15(12): 543

8 李淑文. 中成药, 1995, 17(6): 23

(1999-03-02收稿)

稳心颗粒剂治疗快速心律失常的临床疗效观察

天津市第一中心医院 (300192)
天津医药工业销售公司

刘宏胜 白雪歌 崔 桅
王铭革

由党参、黄精、三七、琥珀、甘松等组成的纯中药制剂——稳心颗粒剂是防治冠心病引起的心律失常的中成药。临床上对窦性心动过速、房结性早搏、房颤、室性早搏等冠心病引起的心律失常具有显著的治疗效果。现将 48例病例总结报道如下:

1 临床资料

48例病例中男性 28名,女性 20名;年龄在 25~75岁;病程半年~4年;其中窦性心动过速 27例,房结性早搏 15例,房颤、室性早搏各 3例。诊断依据心电图。临床主要表现:心悸不宁(动则尤甚),气短乏力,夜寐不安,头晕心悸,胸闷胸痛;脉促,或结或

代,或涩细数;舌质淡暗或暗红,瘀点或瘀斑,苔薄白或少苔;中医辨证为气阴两虚、心脉瘀阻所致。

2 治疗方法

治疗前停用影响心率的中药及西药。记录心率、心率、血压、心电图、24h动态心电图。开始口服稳心颗粒剂,每次 1袋(9g),每日 3次,4周为 1疗程。治疗结束时同样进行上述各项检查。治疗期间每日服药前后测心率、心率,观察服药后有无副作用,每 2周检查 1次心电图。

3 疗效标准

参照 1995年中华人民共和国卫生部制定的《中

药新药研究指导原则》关于中药治疗病态窦房结综合征的疗效标准 临床痊愈:症状消失;动态心电图 24 h 心率低于 100 次/min 显效:主要症状消失;动态心电图 24 h 平均心率比治疗前降低 10 次/min 有效:主要症状部分消失;动态心电图 24 h 平均心率比治疗前降低 5 次/min 无效:各项检查指标均无变化

4 治疗结果

临床痊愈 10 例,均为窦性心动过速 显效 18 例,其中窦性心动过速 8 例,房结性早搏 8 例,房颤室性早搏各 1 例 有效 11 例,其中窦性心动过速 3 例,房结性早搏 6 例,房颤室性早搏各 1 例 无效 9 例,其中窦性心动过速 6 例,房结性早搏 1 例,房颤室性早搏各 1 例 治疗结果表明稳心颗粒剂治疗冠心病引起的窦性心动过速和房结性早搏疗效显著 临床症候的起效时间平均为 2.4 d,心电图最快起效时间为 2 d,最长为 7 d,平均为 5.4 d 本组病例治疗期间无明显不良反应,口服即有效

5 典型病例

患者 男性,52 岁,1997 年 1 月 18 日初诊,阵发性心前区痛伴心悸 1 d 住院 症见心悸不宁,胸闷胸痛,气短乏力,心烦不寐 舌质淡暗,苔薄白,脉结 心电图示:急性前间壁心肌梗死,频发室上性早搏,

Holter 24 h 房性早搏 2 592 次,平均每小时 108 次 阵发室上速 16 次 辨证属气阴两虚 心脉瘀阻型心悸 入院后予稳心颗粒口服,每次 1 袋(9 g),每日 3 次,4 d 后诸症减轻,服药 1 周,心悸不宁消失,心电图早搏消失 继服 3 d 后诸症消失 舌质淡略暗,苔薄白,脉沉细 复查心电图示房性早搏消失,遗留病理 Q 波,ST-T 段恢复等电位线 Holter 24 h 房性早搏 28 次,平均每小时少于 2 次,病人痊愈出院

6 讨论

快速性心律失常的临床表现为心悸不宁,胸闷胸痛,气短乏力,脉促,舌质暗红,有瘀点,苔薄白为主 此乃为气阴两虚心脉瘀阻所致 稳心颗粒剂通过增加冠脉血流量,扩张微血管,减少心肌耗氧量,降低血管通透性,防止红细胞聚集,降低全血粘度,抑制血小板聚集等功效来改善心功能,增加有效血流量,提高每分输出量,提高心脏指数,减少外周阻力,从而降低心率使上述临床症候得以缓解达到有效的临床治疗目的

稳心颗粒剂具有益气养阴、宁心复脉、活血化瘀、定悸安神之独特功效,对由冠心病引起的心律失常确有良好的临床疗效

(1999-05-12 收稿)

双黄连粉针剂致荨麻疹 1 例

山东省枣庄市北坛皮肤病防治院(滕州 277500) 赵银安 燕洪平

1 案例

杨某 男,14 岁,先患感冒,而后腰部出现数群绿豆大疱疹,水泡透亮,周围有红晕,诊断为:带状疱疹。予双黄连粉针静滴,每日 1 次,静滴浓度小儿不超过 0.5% (g/mL)。将 1.8 g(3 支)双黄连溶于 5% G S 400 mL 中缓缓滴入,20 min 后出现局部瘙痒 大小不等的红色丘疹,继而形成丘斑延至全身,见皮肤潮红 遂停滴对症治疗,3 h 后丘疹消失 当再次给药,约 5 min 后发生上述过敏反应 后改用双黄连口服液内服,阿昔络韦针静滴,一周治愈

2 讨论

双黄连粉针剂中金银花含有绿原酸,而绿原酸有致敏原性 注射用药可致过敏反应,但口服无此现象^[1]。此例,由感冒促发带状疱疹,钱起丰认为带状

疱疹患者存在细胞免疫功能缺陷^[2]。我们在用双黄连粉针治疗带状疱疹患者时,曾有数例发生过敏反应,特别是 15 岁以下的少年儿童发生率高,提示这可能与上述因素有关 据报道双黄连粉针致变态反应占 76.77%,其中皮肤反应为 49.68%,占变态反应的 64.70%^[3]。

目前,双黄连粉针剂使用说明书,均未载明不良反应及注意事项,因此,我们建议有关部门应加强双黄连粉针使用说明书的监督管理,让使用者了解有关注意事项,预防和减少不良反应的发生

参考文献

- 1 李仪奎,等主编.中药药理学.北京:中国中医药出版社,1992 63
- 2 钱起丰.中华皮肤科杂志,1995,28(4): 241
- 3 方世平,等.中国药房,1998,9(4): 176

(1999-04-29 收稿)