图 1 葫芦素 B 对照品(A)、葫芦素滴丸(B)和葫芦素片(C)的 HPLC 图

Fig. 1 HPLC of cucurbitacin B (A), Hulusu Dropping Pill (B), and Hulusu Tablet (C)

据 HPLC 测定结果,计算出各取样点的溶出度,溶出度公式见下式,结果列于表 2。

$$D = \frac{m_{\text{样}} A_{\text{样}}}{m_{\text{样}} A_{\text{对}}} \times 100\%$$

$m_{\text{对}}$: 对照品质量 $A_{\text{样}}$: 样品峰面积

$m_{\text{样}}$: 滴丸中葫芦素 B 的总质量 $A_{\text{对}}$: 对照品峰面积

表 2 葫芦素片和葫芦素滴丸的溶出度测定结果 (n=6)

Table 2 Dissolution in Hulusu Tablet and Hulusu Dropping Pill (n=6)

时间 /min	0.1 mol/L HCl/%		水/%		pH=6.8 磷酸盐缓冲液/%	
	滴丸	片剂	滴丸	片剂	滴丸	片剂
5	32.13	2.51	46.25	0	35.67	0
15	60.59	8.76	70.68	1.43	71.12	0
30	72.60	32.57	83.84	1.93	84.00	0.35
60	78.32	45.86	84.87	3.37	86.16	4.12

3 讨论

心宁是治疗冠心病、心绞痛的中药五类新药,主要为降香黄酮类化合物。按照《药品注册管理办法》的要求,中药五类有效部位的质量分数应大于 50%。为了富集黄酮化合物,实验采取正丁醇萃取。按照《ICH》(人用药物注册技术要求国际协调会议)“关于药品中溶剂残留量的指导原则”的要求,规定正丁醇有机溶剂的残留量 ≤ 0.5%。为确保心宁提取物中的正丁醇残留量符合要求,本实验参照《中华人民共和国药典》2000 年版二部附录 VIII P 有机溶剂残留量测定法,对心宁提取物中的正丁醇残留量进行

在滴丸制剂中,药物与水溶性基质形成固体分散,在体内基质溶解时,药物以微细结晶、无定型微粒或分子形式释出,因而溶解快,吸收好,生物利用度高。葫芦素片在 0.1 mol/L HCl 中 30 min 时,葫芦素 B 溶出量只有 30% 左右,在 60 min 时,溶出度不超过 50%;而在水和 pH=6.8 磷酸盐缓冲液介质中,30 min 内几乎不溶出,在 60 min 时溶出极少。葫芦素滴丸不论在 0.1 mol/L HCl 中,还是水和 pH=6.8 磷酸盐缓冲液中,葫芦素 B 的溶出在 30 min 时,都能达到 80% 左右。这说明滴丸制剂与葫芦素片相比,溶出度增加明显。

References:

- [1] Hunan Reaseach Institute of Pharmaceutical Industry. Studies on the antihepatitis active constituents from tiangudi (the fruit base of *Cucumis mele*) [J]. *Chin Tradit Herb Drugs* (中草药), 1979, 10(3): 1.
- [2] Hunan Reaseach Institute of Pharmaceutical Industry. The pharmacological studies on the antihepatitis active constituents from Tiangudi (the fruit base of *Cucumis mele*) [J]. *Chin Tradit Herb Drugs* (中草药), 1979, 10(9): 30.
- [3] Hu R S, Hou X J, Peng Y G, et al. Studies on the antihepatitis principles from Tiangudi (the fruit base of *Cucumis mele*) — preparation and assay of gudisu and cucurbitacins B and E [J]. *Chin Tradit Herb Drugs* (中草药), 1982, 13(10): 26.
- [4] Ren F B, Hu M. Advances in pharmacological and clinical research of cucurbitacin treatment of hepatitis and primary hepatic carcinoma [J]. *Chin J Integrated Tradit Chin West Med* (中西医结合杂志), 1986, 6(10): 633.

GC 法测定心宁提取物中正丁醇的残留量

孔伶俐,伊惠贤,崔青娟

(天津丹溪国药研究所,天津 300061)

了测定。

1 仪器与试剂

HP-6890 气相色谱仪(美国惠普公司), Agilent 7694E 顶空进样器。正丁醇、二甲基亚砜(分析纯);心宁提取物(自制,批号为 020722、020724、020726)。

2 方法与结果

2.1 色谱条件:DB-624 毛细管柱(30 m × 0.53 mm, 3.00 μm);采用程序升温,起始温度 50 °C 维持 2 min,升温速率 40 °C/min,终了温度 200 °C 维持

1.5 min;载气: N₂;检测器: FID。理论板数按正丁醇峰计算应不低于3 000。

2.2 对照品溶液的制备:精密吸取正丁醇 193.0 μL (156.25 mg)置 100 mL 量瓶中,以二甲基亚砷溶解并稀释至刻度,摇匀。分别精密量取 4.0 mL 置 25 mL 量瓶中,以二甲基亚砷稀释至刻度,摇匀。取溶液 2 mL 置 10 mL 顶空瓶中,密封。

2.3 供试品溶液的制备:取本品约 100 mg,精密称定,置 10 mL 顶空瓶中,加二甲基亚砷 2 mL,密封,加热使溶解,即得。

2.4 标准曲线的制备:精密吸取正丁醇 193.0 μL (156.25 mg) 置 100 mL 量瓶中,以二甲基亚砷溶解并稀释至刻度,摇匀。分别精密量取 0.1、0.4、0.8、4.0、8.0、16.0 mL 置 25 mL 量瓶中,以二甲基亚砷稀释至刻度,摇匀。按上述色谱条件及顶空进样条件分别测定,记录峰面积值。以对照品溶液的质量浓度(C)为横坐标,峰面积积分值(A)为纵坐标,绘制标准曲线,得回归方程: $A = 465.6 C - 0.58$, $r = 0.9999$ 。结果表明:正丁醇在 0.006 25~1.0 mg/mL 时,进样质量浓度与峰面积呈良好的线性关系。

2.5 空白试验:取二甲基亚砷溶剂 2 mL,按上述色谱条件测定,在正丁醇处无峰,不干扰测定。

2.6 最小检出质量浓度:在上述色谱条件下,正丁醇的最小检出质量浓度为 0.006 25 mg/mL (为供试品溶液质量浓度的 0.0125%)。

2.7 精密度试验:取 0.25 mg/mL 正丁醇对照品溶液按上述色谱条件及顶空进样条件平行测定 6 次,

结果峰面积的 RSD 为 2.17%。

2.8 稳定性试验:取供试品溶液于 0、2、4、6、8、24、40 h 测定其峰面积值,结果峰面积的 RSD 为 0.31%。表明试验溶液在 40 h 内稳定性良好。

2.9 回收率:取批号为 020726 样品 100 mg,6 份,分别置 10 mL 顶空瓶中,加入正丁醇对照品溶液 2 mL,密封,加热使溶解。取上述两种溶液分别测定,以对照品溶液为对照,计算回收率。结果平均回收率为 100.7%,RSD 为 1.79% ($n=6$)。

2.10 样品中正丁醇的残留量测定:取供试品溶液 2 mL 置 10 mL 顶空瓶中,密封,100 °C 平衡 15 min,取顶空气 1 mL 注入气相色谱仪,测定,结果见表 1。结果表明样品中正丁醇残留量很少,均低于《ICH》规定的小于 0.5% 的要求。

表 1 心宁提取物中正丁醇残留量的测定结果 ($n=3$)

Table 1 Determination of *n*-butanol residues in Xinning extract ($n=3$)

批号	正丁醇/%
020722	未检出(0.0125%以下)
020724	0.061
020726	未检出(0.0125%以下)

3 讨论

本实验采用正丁醇萃取的方法制备的心宁提取物,总黄酮质量分数大于 50%,通过顶空进样气相色谱法测定正丁醇的残留量,3 批样品结果均小于 0.5%,符合《ICH》的规定,证明工艺是可行的,同时也保证人用药的安全。

HPLC 法对精制银翘解毒胶囊中连翘苷的定量分析

潘莹¹,江海燕²,卢忠朋²

(1. 广西区人民医院 药剂科,广西 南宁 530021; 2. 广西中医学院,广西 南宁 530001)

精制银翘解毒胶囊是由连翘、金银花、桔梗等药味组成。具有显著抗菌、抗病毒、抗炎、镇痛、散风、退热作用,对于流行性感、头痛咳嗽、咽喉疼痛、温毒发颈、两腮赤肿具有很好疗效。连翘苷是方中主药连翘的主要成分之一,具有较强抗菌作用和抗病毒作用,并能抑制 CAMP 磷酸二酯的活性。连翘药材中的连翘苷含量测定方法有薄层扫描法、HPLC 法

等^[1~3]。本实验采用 HPLC 法测定精制银翘解毒胶囊中连翘苷的含量,该方法灵敏、准确,可作为精制银翘解毒胶囊的质量标准。

1 仪器与试剂

日本岛津 LC-10A 液相色谱仪,SPD-8A 紫外检测仪,岛津 C-R10A 数据处理机。连翘苷对照品(中国药品生物制品检定所提供,批号:709-2008,

收稿日期:2003-12-04

作者简介:潘莹(1967-),女,主管药师,1990年毕业于广西中医学院药学专业,主要从事医院制剂与药理研究。