莪术中姜黄素在大鼠体内的药动学研究

陆兔林,毛春芹,卞慧敏,宋 申,滕建东*

(南京中医药大学,江苏 南京 210029)

摘要:目的 研究莪术中姜黄素在大鼠体内的药动学。方法 采用高效液相色谱法测定姜黄素的血药浓度。色谱柱:Lichrospher-5-C₁₈(250 mm×4.6 mm, 5 μm);柱温:25 ℃;流动相:乙腈-5%醋酸水(45:55);体积流量:1 mL/min;检测波长:420 nm。结果 姜黄素在6.5~104 μg/mL与峰面积呈良好的线性关系($r=0.9995$)。平均回收率为98.5%,RSD为2.41% ($n=5$)。采用药动学计算程序处理,姜黄素的药动学参数: k_a 为0.53/h, k_e 为0.10/h, $t_{1/2ka}$ 为1.32 h, $t_{1/2k}$ 为6.89 h, t_{peak} 为3.89 h, C_{max} 为93.15 ng/mL,AUC为1369.38 ng/mL。结论 本法稳定、简单、可靠,可用于姜黄素的血药浓度分析及其药动学研究。

关键词:莪术;姜黄素;药动学;高效液相色谱

中图分类号:R284.02; R285.61

文献标识码:B

文章编号:0253-2670(2005)08-1157-02

Pharmacokinetic studies on curcumin in *Curcuma phaeocaulis* in rats in vivo

LU Tu-lin, MAO Chun-qin, BIAN Hui-min, SONG Shen, TENG Jian-dong

(Nanjing University of Traditional Chinese Medicine, Nanjing 210029, China)

Abstract: Objective To study pharmacokinetics of curcumin in *Curcuma phaeocaulis* in rats in vivo.

Methods HPLC method was used to determine the curcumin in rat plasma. The conditions were column: Lichrospher-5-C₁₈(250 mm×4.6 mm, 5 μm); column temperature: 25 ℃; mobile phase: CH₃CN-5% HAc water solution (45:55); flow: 1 mL/min; detection wavelength: 420 nm. **Results** The calibration curve was liner ($r=0.9995$) at the range of 6.5—104 μg/mL. The average recovery was 98.5%. RSD was 2.41% ($n=5$). The pharmacokinetic parameters of curcumin were as follows: k_a was 0.53/h, k_e was 0.10/h, $t_{1/2ka}$ was 1.32 h, $t_{1/2k}$ was 6.89 h, t_{peak} was 3.89 h, C_{max} was 93.15 ng/mL, AUC was 1369.38 ng/mL. **Conclusion** This method is stable, simple, and reliable, which can be applied for the determination of curcumin in plasma and pharmacokinetic studies.

Key words: *Curcuma phaeocaulis* Val.; curcumin; pharmacokinetics; HPLC

莪术为姜科植物蓬莪术 *Curcuma phaeocaulis* Val. 的根茎,味辛、苦,性温,具有行气破血、消积止痛的功效,主治气滞心痛,饮食积滞,脘腹胀痛,血滞经闭,痛经,微痕痞块,跌打损伤。莪术含有挥发油、姜黄素、胡萝卜苷以及锌、铁、钛、镍等微量元素^[1]。莪术具有抗炎、镇痛、抗肿瘤、抗早孕、抗菌、升高白细胞、对心血管、胃肠平滑肌的作用、保肝、对急性肾功能衰竭的作用、抑制血小板聚集和抗血栓形成等作用。莪术可以治疗冠心病、消化性溃疡、宫颈糜烂、宫颈癌、真菌性阴道炎、婴幼儿秋季腹泻、小儿急性上呼吸道感染、皮肤溃疡以及预防放射性皮肤烧伤^[2]。莪术醇及姜黄素均为莪术中主要活性成分,莪术醇口服吸收迅速、完全,大鼠服用后5 min血中即可测出,15 min达高峰,可维持1 h左右,半衰期 $t_{1/2a}$ 为33 min, $t_{1/2\beta}$ 为12.5 h^[1]。而莪术中姜黄素具有

抗血小板聚集、调节血液流变学及降血脂等生理活性^[2]。本实验对莪术中姜黄素进行药动学研究,为莪术的临床应用及阐明其作用机制提供依据。

1 材料与仪器

SD大鼠,250 g左右,雌雄各半,由南京中医药大学实验动物中心提供。姜黄素对照品由中国药品生物制品检定所提供(批号0823-9802),肝素钠注射液(江苏万邦生化医药股份有限公司),色谱纯甲醇,其余试剂均为分析纯。蓬莪术购自四川省双流县,经本校鉴定教研室陈建伟教授鉴定。

TGL-16G离心机(上海安亭科学仪器厂),Waters515高效液相色谱仪(美国Waters公司),SZ-1型快速混匀器(江苏金坛市金城国胜实验仪器厂),PPP自动平衡电脑血小板聚集仪及血黏度测定仪(上海医科大学仪器厂)。

收稿日期:2004-10-13

基金项目:国家“十五”攻关课题(2001BA701A11)

*本校药学院98级实习生

2 方法与结果

2.1 药液的制备:取莪术饮片,粉碎成粗粒,95%乙醇回流提取 3 次,2 h/次。醇提液回收乙醇后,用麻油、聚山梨酯-80、蒸馏水按体积比 1:1:8 配成乳化剂,使含生药 5 g/mL,备用。

2.2 血浆样品的提取分离:取血浆 1.0 mL,置于肝素化的 Eppendorf 管中,用甲醇提取,充分沉淀蛋白,用旋涡混合器振荡 2 min,使与血浆结合的姜黄素因蛋白变性而充分释放。3 000 r/min 离心 5 min,合并甲醇提取液,蒸干,残留物用 0.8 mL 甲醇溶解,旋涡混合 5 min,离心,即得。

2.3 色谱条件^[3]:色谱柱:Lichrospher-5-C₁₈(250 mm×4.6 mm, 5 μm);柱温:25 ℃;流动相:乙腈-5%醋酸水(45:55);体积流量:1 mL/min;检测波长:420 nm;进样量:20 μL。色谱图见图 1。

图 1 姜黄素对照品(A)和含姜黄素血样(B)的 HPLC 图

Fig. 1 HPLC chromatograms of curcumin reference substance (A) and plasma sample with curcumin (B)

2.4 标准曲线的制备:取空白大鼠血浆 1.0 mL,精密加入不同量的姜黄素对照品溶液,按照“血浆样品的提取分离”项下操作,使最终质量浓度为 6.5、13.0、26.0、52.0、104.0 ng/mL,分别进样,测定,记录峰面积。以峰面积(A)对质量浓度(C)作直线回归,结果姜黄素 6.5~104 μg/mL 与峰面积呈良好线性关系,回归方程为 $A=79.3013C-88.0417$, $r=0.9995$ 。

2.5 最低检测限的确立:取对照品溶液用流动相稀释 100 倍,再逐步稀释,分别取 10 μL 进样测定。当对照品溶液质量浓度为 0.1 μg/mL 时,S/N=3,故最低检测限为 1 ng。

2.6 精密度试验:用空白血浆配制含姜黄素 26 ng/mL 的对照品血样,提取分离,连续进样 5 次,测定峰面积,其 RSD 为 2.89%。

2.7 回收率试验:空白血浆中加入姜黄素,配制含姜黄素 26 ng/mL 的血样,提取分离,进样,测定 5 份,平均回收率为 98.5%,RSD 为 2.41% (n=5)。

2.8 姜黄素在大鼠体内药动学研究:SD 大鼠 10 只,体重(250±20) g,给药前禁食 12 h,全程不禁饮水,取药液,按 0.5 g/kg ig 给药,在不同时间点于眼底取血 1.0 mL,放于肝素化的 Eppendorf 管中,3 000 r/min,离心 15 min,分离得到大鼠血浆,处理,进样测定,结果见图 2。采用中国药理学会 3P87 实用药代计算程序处理,自动进行推算、模型、权重选择,拟合的姜黄素的体内过程符合单室模型一级吸收,有关药动学参数见表 1。

图 2 姜黄素的血药浓度-时间曲线

Fig. 2 Blood concentration-time curve of curcumin

表 1 药动学参数 (n=5)

Table 1 Pharmacokinetic parameters (n=5)

参数	单位	数值
k_a (吸收速率常数)	h^{-1}	0.53
k_e (消除速率常数)	h^{-1}	0.10
$t_{1/2ka}$ (吸收半衰期)	h	1.32
$t_{1/2k}$ (消除半衰期)	h	6.89
t_{peak} (达峰时间)	h	3.89
C_{max} (药峰浓度)	ng/mL	93.15
AUC(曲线下面积)	ng/mL	1 369.38

3 讨论与小结

实验测得姜黄素的吸收半衰期为 1.32 h,消除半衰期为 6.89 h,达峰时间为 3.89 h,药峰质量浓度 93.15 ng/mL。本实验建立了血浆中姜黄素的测定方法,共存组分不干扰、出峰时间合适和方法灵敏度高。研究结果对莪术的临床合理应用、提高疗效提供了有价值的实验数据,对进一步的临床药理研究和药动药效学结合研究具有较大指导意义。

References:

[1] Su C Y, Liu J Y, Xu H X, et al. The metabolism of ³H-curcuminol in normal rats and tumour bearing mice [J]. *Acta Pharm Sin* (药学报), 1980, 15 (5): 257-262.
 [2] Han T, Mi H M. Advances in research of chemical constituents and pharmacological activities of curcumin [J]. *Pharm J Chin PLA* (解放军药学报), 2001, 17(2): 95-97.
 [3] Liu T Z, Qian Z Y. Pharmacokinetics of crocetin in rats [J]. *Acta Pharm Sin* (药学报), 2002, 37 (5): 367.