党参转录组中 SSR 位点信息分析

王 东, 曹玲亚, 高建平*

山西医科大学药学院, 山西 太原 030001

摘要: 目的 采用生物信息学方法分析党参转录组文库 EST 序列简单重复序列 (SSR) 位点, 快速、大规模鉴定党参功能性 SSR。方法 使用 MicroSATellite (MISA) 软件分析党参高通量转录组 SSR 的分布频率和重复基元的类型特征, 利用软件 Primer3 设计引物, 并通过 SSRFinder 校验 SSR, 筛选 SSR 引物。结果 从 45 511 条 Unigenes 中共搜到 7 327 个 SSR 位点, 分布在 6 017 条 Unigenes 序列中, 发生频率为 12.22%, 共有 415 种重复基元, 平均每 4 520 bp 含 1 个 SSR 位点, 二核苷酸重复占主要地位, 发生频率为 58.67%, 在所有重复基元中, AG/CT 出现频率最高。共获得 4 329 条 SSR 引物。结论 大规模的 SSR 分子标记开发将有助于党参遗传多样性与分子育种研究。

关键词: 党参; 转录组; SSR; MicroSATellite 软件; 引物

中图分类号: R282.12 文献标志码: A 文章编号: 0253-2670(2014)16-2390-05

DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2014.16.021

Data mining of simple sequence repeats in *Codonopsis pilosula* transcriptome

WANG Dong, CAO Ling-ya, GAO Jian-ping

College of Pharmacy, Shanxi Medical University, Taiyuan 030001, China

Abstract: Objective To rapidly and largely identify the functional simple sequence repeat (SSR) in transcriptome dataset of *Codonopsis pilosula* based on bioinformatics analysis. **Methods** MicroSATellite (MISA) software was used to analyze the distributing frequency of high-flux transcriptome SSR and the basic characteristics of repeat motifs. Primers were designed using Primer3, and SSRFinder was used to check SSR and screen the SSR primers. **Results** SSR loci (7 327) were obtained from 45 511 unigenes, distributed in 6 017 unigenes (12.22%). There are 415 kinds of repeat motifs existing in *C. pilosula* transcriptome. On average, SSRs occurred every 4 520 bp in length. Dinucleotide repeats predominated with an occurrence frequency of 58.67%, and AG/CT was the most frequent one among all the repeat types. A total of 4 329 primer pairs were designed for marker development. **Conclusion** The large number of SSR genetic markers developed in the present study should contribute greatly to research into genetic diversity and germplasm characterization in *C. pilosula*.

Key words: *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.; transcriptome; simple sequence repeat; MicroSATellite; primer

党参为桔梗科党参属党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.、素花党参 *C. pilosula* Nannf. var. *modesta* (Nannf.) L. T. Shen 或川党参 *C. tangshen* Oliv. 的干燥根, 性平、味甘, 具有补中益气、健脾益肺之功效^[1]。党参产地众多, 种类各异, 主产于山西、甘肃、陕西、四川、湖北等省, 主要为栽培品, 少量为野生。目前我国党参资源破坏严重, 野生资源逐渐变得稀少, 急需对药源进行保护^[2]。利用分子标记对其遗传学背景进行研究, 研究结果可对制定合理有效的保护策略提供科学依据。

目前尚缺乏党参遗传和基因组信息研究, 遗传多样性研究和分子标记研究也只有张建清等^[3]利用 RAPD 分析甘肃栽培的党参和素花党参在居群水平上的遗传多样性; 李忠虎等^[4]利用 g-SSR 技术分析发现党参野外居群具有较丰富的遗传多样性水平, 并且筛选出 5 对 g-SSR 引物能够在党参 4 个近缘物种成功扩增; 赵莎等^[5]曾采用党参药材中提取的 ITS/ITS2 序列对党参药材及其混淆品进行鉴定, 但不能成功鉴别党参 3 个基原物种; He 等^[6]利用 ITS/ITS2 序列分析从甘肃和重庆搜集的 65 个党参样

收稿日期: 2014-03-24

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (81072987); 国家“十二五”科技支撑计划 (2011BAI07B07)

作者简介: 王 东 (1989—), 男, 山西阳曲人, 在读硕士, 研究方向为中药资源及其活性成分研究。

*通信作者 高建平 (1963—), 女, 山西阳泉孟县人, 教授, 硕士研究生导师, 研究方向为中药资源及其活性成分研究、中药鉴定新技术与中药质量评价。Tel: (0351)4690345 E-mail: jpgaol23@sina.com

本, 成功鉴别党参 3 个基原物种; 苏强等^[7]初步建立党参 AFLP 分析体系。目前还缺乏能够大量应用于党参种质鉴定、遗传图谱构建、功能基因定位等研究的简便、高效、稳定且具有种属特异性的分子标记体系。

简单重复序列 (simple sequence repeat, SSR) 又称微卫星 DNA, SSR 标记是较为理想的遗传标记, 具有数量丰富、分布广泛、多态性强和共显性遗传易于分析等特点^[8]。SSR 按来源分, 有基因组 SSR (g-SSR) 和转录组来源的 SSR (EST-SSR), 相对于 g-SSR, EST-SSR 标记无需构建基因组文库、杂交、测序, 避免了大量人力、物力和时间的投入, 同时 EST-SSR 多态性可能与基因功能直接相关, 在相近植物间具有良好通用性^[9], 而且转化率也高。目前药用植物中已有人参^[10]、丹参^[11]、西洋参^[12]和金银花^[13]等借助现有测序数据开发了 EST-SSR。研究主要集中于遗传多样性评价、种质鉴定、标记通用性等方面。为此, 本研究基于党参转录组文库高通量测序结果, 利用 MicroSATellite (MISA)^[14]软件搜索党参 SSR 位点, 分析其分布、组成特征, 并进行初步可用性评价, 以期对党参遗传图谱构建、遗传多样性分析、功能基因定位和比较作图等研究提供理论基础。

1 材料和方法

1.1 党参转录组数据来源

转录组测序样本采自于山西省晋城市陵川县党参 GAP 基地, 原植物由山西医科大学药学院高建平教授鉴定为党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. 党参转录组数据来自于课题组前期利用 Illumina 高通量测序平台对党参进行的全转录组测序, 共有 45 511 条 Unigenes。

1.2 党参 EST-SSR 的筛选

为了检测党参中的 SSR 位点, 使用软件 MISA^[14]对组装得到的 Unigene 序列进行 SSR 分析。所检测 SSR 位点包括单核苷酸重复、二核苷酸重复、三核苷酸重复、四核苷酸重复、五核苷酸重复和六核苷酸重复 6 类。判断标准为单核苷酸重复至

少 12 次; 二核苷酸重复至少 6 次; 三核苷酸重复、四核苷酸重复至少 5 次; 五核苷酸重复和六核苷酸重复至少 4 次。

1.3 党参 EST-SSR 引物设计

使用软件 Primer3 对 SSR 重复单元前后的序列设计引物, 每条 SSR 产生 5 条引物。主要的引物设置参数如下: 扩增产物长度 80~300 nt, 引物序列长度 18~28 nt (最适宜长度为 23 nt), 退火温度为 55~65 °C (最佳退火温度为 60 °C), GC 量为 40%~65% (最适宜为 50%)。

1.4 党参 EST-SSR 引物筛选

将设计出的引物通过以下方式筛选: (1) 引物不能存在 SSR; (2) 将获得的引物比对到 Unigene 序列, 引物的 5'端允许有 3 个碱基的错配, 3'端允许有 1 个碱基的错配; (3) 去掉比对到不同 Unigene 上的引物, 筛选唯一匹配的引物; (4) 使用 SSRFinder 校验 SSR, 使用产物序列来寻找 SSR, 检验结果是否与 MISA 结果相同, 并筛选出相同的 SSR 产物。

2 结果与分析

2.1 党参转录组中的 SSR 位点的数量与分布

利用软件 MISA 对党参转录组中的 45 511 条 Unigenes 的 cDNA 序列进行搜索。结果显示, 7 327 个 SSR 分布于 6 017 条 Unigenes 序列中, SSR 发生频率 (含有 SSR 的 Unigene 数目与总 Unigene 的数目之比) 为 12.22%, 出现频率 (检出 SSR 个数与总 Unigene 数目之比) 为 16.10%。平均每 4 520 bp 就含有 1 个 SSR 位点 (表 1)。其中 5 006 条 Unigenes 只包含单个 SSR 位点, 1 011 条 Unigenes 包含 2~4 个 SSR 位点。

党参 EST-SSR 重复类型丰富, 单核苷酸至六核苷酸重复都可以发现。从 SSR 位点数量上看, 出现最多的为一至三核苷酸重复, 占到总 SSR 位点数量的 94.1%。其中二核苷酸重复比例最高, 可以占到 58.7%; 其次为三核苷酸和单核苷酸重复, 分别为 21.6%和 13.8%。四、五、六核苷酸重复类型的数量很少, 总计不足 6% (表 1)。

表 1 党参 EST-SSR 不同重复基元分布情况

Table 1 Distribution of different repeat motifs in *C. pilosula* transcriptome

重复类型	SSR 数	占总 SSR 比例 / %	发生频率 / %	平均长度 / bp	总长度 / bp	平均距离 / kb
单核苷酸	1 012	13.81	2.22	15.42	15 601	32.74
二核苷酸	4 299	58.67	9.45	16.03	68 896	7.71
三核苷酸	1 585	21.63	3.48	16.75	26 547	20.91
四核苷酸	71	0.97	0.16	20.85	1 480	466.70
五核苷酸	109	1.49	0.24	20.64	2 250	304.00
六核苷酸	251	3.43	0.55	24.00	6 024	132.01
总计	7 327	100.00	16.10	16.49	120 798	4.52

党参转录组中 SSR 位点的序列总长度达到 120 798 bp, SSR 位点平均长度为 16.49 bp, 各类型 SSR 位点的平均长度分别为 15.42、16.03、16.75、20.85、20.64、24.00 bp。党参转录组中 SSR 位点重复次数以 6 次 (1 466) 最多, 占总 SSR 的 20%; 其次为重复次数 7、5、10、9 和 8 次, SSR 位点个数在 706~1 006。统计 4~10 次重复的 SSR 位点共有 6 101 个, 占 83.2%; 11~24 次重复的 SSR 位点共有 1 226 个, 占 16.7% (图 1)。

2.2 党参 EST-SSR 的特性

在党参转录组 7 327 个 SSR 位点中, 共发现到 415 种重复基元, 其中一至六核苷酸重复基元分别有 2、4、10、18、48 和 122 种 (表 2)。以二核苷酸重复基元 AG/CT 最多, 总 SSR 的 43.78%; 其次为二核苷酸重复基元 AC/GT 和单核苷酸重复基元 A/T, 分别占

图 1 党参 EST-SSR 重复次数分布图

Fig. 1 Distribution of EST-SSR repeat frequency in *C. pilosula* transcriptome

11.83%和 10.65%; 二核苷酸重复基元中, 以 AG/CT、AC/GT 和 AT/AT 出现的数量最多, 三者共占二核苷酸 SSR 的 99.88%, CG/CG 出现次数最少, 仅占到二核苷酸 SSR 的 0.12%。在三核苷酸重复基元中,

表 2 党参 EST-SSR 重复基元的类型

Table 2 EST-SSR repeat motifs in *C. pilosula* transcriptome

重复类型	重复基元	重复个数	发生频率 / %	所占比例 / %	
单核苷酸	A/T	780	1.71	10.65	
	C/G	232	0.51	3.17	
二核苷酸	AG/CT	3 208	7.05	43.78	
	AC/GT	867	1.91	11.83	
	AT/AT	219	0.48	2.99	
	CG/CG	5	0.01	0.07	
	AA/AA	1	0.00	0.00	
三核苷酸	AAG/CTT	439	0.96	5.99	
	ACC/GGT	311	0.68	4.24	
	ATC/ATG	226	0.50	3.08	
	AGG/CCT	180	0.40	2.46	
	AGC/CTG	122	0.27	1.67	
	AAC/GTT	112	0.25	1.53	
	CCG/CGG	72	0.16	0.98	
	AAT/ATT	59	0.13	0.81	
	ACG/CGT	33	0.07	0.45	
	ACT/AGT	31	0.07	0.42	
	四核苷酸	AAAG/CTTT	13	0.03	0.18
		ACAT/ATGT	12	0.03	0.16
AAAT/ATTT		7	0.02	0.10	
AGCC/CTGG		7	0.02	0.10	
AAAC/GTTT		5	0.01	0.07	
剩余四核苷酸		27	0.06	0.37	
五核苷酸		AAAAG/CTTTT	10	0.02	0.14
	AAAAT/ATTTT	10	0.02	0.14	
	AAAAC/GTTTT	8	0.02	0.11	
	AAGAG/CTCTT	8	0.02	0.11	
	AAATC/ATTTG	6	0.01	0.08	
	剩余五核苷酸	67	0.15	0.91	
六核苷酸	AAAGAG/CTCTTT	11	0.02	0.15	
	AAAAAG/CTTTTT	7	0.02	0.10	
	AAGAGG/CCTCTT	7	0.02	0.10	
	AAGCCC/CTTGGG	7	0.02	0.10	
	AAGGAG/CCTTCT	7	0.02	0.10	
	剩余六核苷酸	212	0.47	2.89	

AAG/CTT 出现次数最多占三核苷酸 SSR 的 27.7%；其次是 ACC/GGT、ATC/ATG 和 AGG/CCT，分别为 19.62%、14.26%和 11.36%。其他四核苷酸、五核苷酸和六核苷酸重复基元类型较多，数量较少，出现频率均较低。

2.3 党参 EST-SSR 的可用性评价

SSR 分子标记的多态性是判断其可用性的重要依据^[15]。SSR 的长度是影响其多态性高低的重要因素，当 SSR 长度大于或等于 20 bp 时多态性较高，长度在 12~20 bp 的 SSR 多态性中等，而长度在 12 bp 以下时多态性极低^[16]。党参 EST-SSRs 的长度在 12~25 bp，其中长度在 12~20 bp 的 SSR 有 6 483 条，占 SSR 总数的 88.48%，这类 SSR 位点具有中等多态性；而长度在 20 bp 以上的 SSR 达到 844 条，占 SSR 总数的 11.52%，这类 SSR 具有较高多态性。此外，根据 Dreisigacker 等^[17]的发现，高级基元 SSR

多态性普遍比低级基元的低。经统计发现，长度在 20 bp 以上的党参 EST-SSR 中，包含低级基元一、二、三核苷酸 SSR 共 564 条。可以预计这部分多态性潜能高的 SSR 在党参上应具有较高的利用价值。

2.4 党参 EST-SSR 引物设计与筛选

为进一步在实验中利用筛选出的党参 EST-SSR，本课题组使用 Primer3 软件对上下游序列均不小于 150 bp 的 EST-SSR 设计引物，每条序列产生 5 对引物，共有 1 484 条党参 EST-SSR 序列获得 7 420 对引物。通过去除不符合条件的引物，并将产物序列利用 SSRFinder 校验，检验结果是否与 MISA 结果一致，最终筛选出引物。结果表明，共有 848 条党参 EST-SSR 序列成功设计出 4 329 对引物（表 3），占到党参 EST-SSR 总数的 8.6%。其中 20 bp 以上 EST-SSR 序列且包含低级基元一、二、三核苷酸共设计 226 对引物。

表 3 党参 EST-SSR 引物序列

Table 3 EST-SSR primer sequences in *C. pilosula*

重复基元及类型	上游引物 (5'-3')	下游引物 (5'-3')	产物长度 / bp
TCA (3*5)	TAAAGAATCACTTGGGGAGTCTG	ATGGACAGAACATTGCAAAACTT	127
AG (2*9)	GAGAATTATGACCTTGAGAAGCG	GATTCTGCGCTACAATCAAATC	128
TGA (3*6)	ATAAGGACAATACATCCACAGGG	CTTCAAGTTCATTCAACTCGTCC	129
AACGAA (6*4)	AGGACCCGTTCTTTGATGATATT	CAATAGCAATGGCTGACTTATCC	154
GAA (3*5)	GCACTTTATGGATATGATGCTCC	GTGCTTCTGCTTCATCTCTGTTT	153
AG (2*9)	GCGACATGAACTTGAAGAACTTT	TGATCTAGTCATTCATGCTCTTCC	135
GAAGGA (6*4)	GGTAGAAAAGACCTCCACCCTAA	ACCCTTTTCTTTTCCTTCTCCT	147
TCC (3*5)	GGAATTCATCCTTACCATCAACA	AAGAAGATCGTCCTAACCTCGTC	149
TCA (3*6)	ACTTAGACTGCTCCACTTTCATGC	GGGTCTAGAACCAACTTGAGAG	133
GA (2*9)	AGTAAGTGGGATGATGAAAAGCA	CGATTTCTCCATTTCTCTTCTAT	116
GAG (3*6)	TTTTCTAAGGACAGTTGTGGTGG	CTTATCATCAGTGCTGACCTGTG	132
TGG (3*5)	GGAAGTAGACCAAGAGTGGGAGT	TTGATTCTCAAACAAGTGTCACG	132
CAC (3*6)	TCATCCATTGCAACCTAATCAGT	TTAGAACTAGGAGCTGCACCATT	138
GA (2*10)	TCTTGCTTCTCAAAGATACGACC	CTAGCAGGTGAAAGCAAACACTA	134

3 讨论

党参转录组中共搜索到 7 327 个 SSRs，平均出现频率为 1/4 520。与其他药用植物比较，党参 SSR 出现的频率低于丹参（1/2 100）^[11]，高于人参^[10]（1/5 800）、金银花^[13]（1/7 490）、西洋参^[12]（1/7 500）和杜仲^[18]（1/11 610）；同时与模式植物比较，也高于拟南芥（1/13 830）、大豆（1/7 400）、杨树（1/14 000）和棉花（1/20 000）^[19]等植物，这表明党参转录组中 SSR 数量很丰富。

根据已有报道，大多数植物的 EST-SSRs 以三核苷酸和二核苷酸重复类型为主，但主要的重复基元类型有所差异^[15]。研究发现党参 EST-SSR 以二核

苷酸为最多的重复基元，其次是三核苷酸重复，这与人参、丹参以及茶树 EST-SSR 中的优势重复类型是一致的。从出现的频率来看，各种不同的重复基元出现最多的是 AG/CT，其次是 AC/GT 和 A/T。GC 重复基元在多数植物中很难见到，但出现频率都极低^[15]。在党参转录组中仅找到 5 个 GC 重复，出现频率也极低。此外，党参转录组中长度在 20 bp 以上的 SSR 达到 844 条，占 SSR 总数的 11.52%，并且其中有 66.82%是多态性潜能高的低级基元一、二、三核苷酸 SSR，这部分 SSR 可能具有较高的利用价值。

对遗传学背景研究取决于合适的遗传分析工具

的选择。而分子标记技术中, RAPD 技术重复性差、不稳定; AFLP 虽然稳定可靠, 但成本高、对 DNA 质量要求高, 实验程序复杂、工作量大; ITS 条形码仅可用于药用植物及其易混伪品的鉴定。相比之下 SSR 标记具有共显性、高度可重复、多态性丰富、对 DNA 质量要求低、可通过 PCR 快速检测, 是遗传学背景研究非常有效的工具。缺点是 SSR 标记具有特异性, 必须进行 PCR 检测, 存在引物开发问题^[20]。本实验对所获得的党参 EST-SSR 利用软件设计引物, 方法快速、通量大、成本低, 并通过筛选共获得 4 329 对 SSR 引物, 为党参的 SSR 分析奠定数据基础。

本研究结果表明党参转录组数据是 SSR 重要来源之一, 与基因组 SSR 相比, EST-SSR 反映了基因组的编码区域, 可直接获得基因表达的信息, 省去了 SSR 引物开发过程中的克隆和测序步骤, 充分利用了现有测序数据, 降低了开发成本。同时也明确了党参 EST-SSR 的基本特征, 为进一步开发新的党参功能基因 SSR 标记奠定了基础。党参 EST-SSR 对于党参功能基因资源的开发利用、遗传资源评价、丰富其分子标记、种质资源改良和比较基因组学研究都具有重要的价值。

参考文献

- [1] 中国药典 [S]. 一部. 2010.
- [2] 张向东, 高建平, 曹铃亚, 等. 中药党参资源及生产现状 [J]. 中华中医药学刊, 2013, 31(3): 496-498.
- [3] 张建清, 苏雪, 吴琼, 等. 药用植物党参的 RAPD 分析 [J]. 中药材, 2006, 29(5): 417-420.
- [4] 李忠虎, 刘晓东, 王小琦, 等. 党参微卫星引物筛选及群体遗传多样性研究 [J]. 中草药, 2013, 44(2): 210-214.
- [5] 赵莎, 辛天怡, 侯典云, 等. 党参药材及其混伪品的 ITS/ITS2 条形码鉴定研究 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2013, 15(3): 421-428.
- [6] He J Y, Zhu S, Komatsu K, *et al.* Genetic polymorphism of medicinally-used *Codonopsis* species in an internal transcribed spacer sequence of nuclear ribosomal DNA and its application to authenticate *Codonopsis Radix* [J]. *J Nat Med*, 2014, 68(1): 112-124.
- [7] 苏强, 杨静, 王哲, 等. 党参 DNA-AFLP 分析体系建立及条件优化 [J]. 药物生物技术, 2010, 17(4): 326-330.
- [8] Liu T, Zhu S, Fu L, *et al.* Development and characterization of 1 827 expressed Sequence tag-derived simple sequence repeat markers for ramie (*Boehmeria nivea* L. Gaud) [J]. *PLoS One*, 2013, 8(4): e60346.
- [9] 张利达, 唐克轩. 植物 EST-SSR 标记开发及其应用 [J]. 基因组学与应用生物学, 2010, 29(3): 534-541.
- [10] Li C, Zhu Y, Guo X, *et al.* Transcriptome analysis reveals ginsenosides biosynthetic genes, microRNAs and simple sequence repeats in *Panax ginseng* CA Meyer [J]. *BMC Genomics*, 2013, 14(1): 245.
- [11] 邓科君, 张勇, 熊丙全, 等. 药用植物丹参 EST-SSR 标记的鉴定 [J]. 药学学报, 2009, 44(10): 1165-1172.
- [12] 杨维泽, 金航, 赵振玲, 等. 西洋参 EST 资源的 SSR 信息分析 [J]. 西南农业学报, 2011, 24(1): 275-278.
- [13] 蒋超, 袁媛, 刘贵明, 等. 基于 EST-SSR 的金银花分子鉴别方法研究 [J]. 药学学报, 2012, 47(6): 803-810.
- [14] Lu X, Wang H, Liu B, *et al.* Three EST-SSR markers associated with QTL for the growth of the clam *Meretrix meretrix* revealed by selective genotyping [J]. *Mar Biotechnol*, 2013, 15(1): 16-25.
- [15] 李珊, 周天华, 赵桂仿, 等. 马蹄香表达序列标签资源的 SSR 信息分析 [J]. 中草药, 2010, 41(3): 464-468.
- [16] 杨华, 陈琪, 韦朝领, 等. 茶树转录组中 SSR 位点的信息分析 [J]. 安徽农业大学学报, 2012, 38(6): 882-886.
- [17] Dreisigacker S, Zhang P, Warburton M L, *et al.* SSR and pedigree analyses of genetic diversity among CIMMYT wheat lines targeted to different megaenvironments [J]. *Crop Sci*, 2004, 44(2): 381-388.
- [18] 黄海燕, 杜红岩, 乌云塔娜, 等. 基于杜仲转录组序列的 SSR 分子标记的开发 [J]. 林业科学, 2013, 49(5): 176-181.
- [19] Cardle L, Ramsay L, Milbourne D, *et al.* Computational and experimental characterization of physically clustered simple sequence repeats in plants [J]. *Genetics*, 2000, 156(2): 847-854.
- [20] 李明芳, 郑学勤. 开发 SSR 引物方法之研究动态 [J]. 遗传, 2004, 26(5): 769-776.