槐定碱对永久性大脑中动脉栓塞大鼠脑细胞的作用及机制研究

薛玉梅¹, 李献军¹, 孟岩², 宋哲¹, 刘惠钦¹, 李晓兵^{2*}

1. 石家庄市人民医院 神经内科, 河北 石家庄 050027

2. 石家庄市人民医院 药学部, 河北 石家庄 050027

摘要: 目的 探究槐定碱对永久性大脑中动脉栓塞(permanent middle cerebral artery occlusion, pMCAO)大鼠脑细胞的作用及机制。方法 SD大鼠随机分为对照组、模型组和槐定碱低、中、高剂量(2.5、5.0、10.0 mg/kg)组,给予槐定碱5 d后,建立pMCAO大鼠模型。考察槐定碱对pMCAO大鼠神经功能评分的影响;考察槐定碱对pMCAO大鼠脑梗死率的影响;采用流式细胞术检测各组大鼠缺血半暗带区细胞凋亡率;采用苏木素-伊红(HE)染色法观察各组大鼠脑组织病理变化;采用Western blotting法考察各组大鼠脑组织B细胞淋巴瘤-2(B-cell lymphoma 2, Bcl-2)、Bcl-2相关X蛋白(Bcl-2 associated X protein, Bax)和半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶-3(Caspase-3)蛋白表达情况。结果 与模型组比较,槐定碱组大鼠神经缺陷症状改善,脑梗死率显著降低($P < 0.05, 0.01$),缺血半暗带细胞凋亡率明显降低($P < 0.05, 0.01$),脑组织损伤有所改善,脑组织Caspase-3和Bax蛋白表达水平显著降低($P < 0.05, 0.01$),Bcl-2蛋白表达水平显著升高($P < 0.05, 0.01$)。结论 槐定碱对pMCAO大鼠脑细胞具有保护作用,其机制可能与上调Bcl-2及下调Bax、Caspase-3蛋白表达水平,进而抑制细胞凋亡有关。

关键词: 槐定碱;永久性大脑中动脉栓塞;脑细胞凋亡;Bcl-2;Bax;Caspase-3

中图分类号: R285.5 文献标志码: A 文章编号: 0253-2670(2021)11-3306-06

DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2021.11.018

Mechanism of sophoridine on cerebral cell in rats with permanent middle cerebral artery occlusion

XUE Yu-mei¹, LI Xian-jun¹, MENG Yan², SONG Zhe¹, LIU Hui-qin¹, LI Xiao-bing²

1. Department of Neurology, Shijiazhuang People's Hospital, Shijiazhuang 050027, China

2. Department of Pharmacy, Shijiazhuang People's Hospital, Shijiazhuang 050027, China

Abstract: Objective To explore the effect and mechanism of sophoridine on brain cells in rats with permanent middle cerebral artery occlusion (pMCAO). **Methods** SD rats were randomly divided into control group, model group, low-, medium- and high-dose (2.5, 5.0, 10.0 mg/kg) sophoridine groups. After ip sophoridine for 5 d, pMCAO rat model was established. Effect of sophoridine on neurological function score in pMCAO rats were investigated; Effect of sophoridine on cerebral infarction rate in pMCAO rats were investigated; Flow cytometry was used to detect the cell apoptosis rate in ischemic penumbra of rats in each group; Hematoxylin-eosin (HE) staining method was used to observe the pathological changes in brain tissue of rats in each group; Western blotting was used to investigate expressions of B-cell lymphoma-2 (Bcl-2), Bcl-2 associated X protein (Bax), and Caspase-3 in brain tissue of rats. **Results** Compared with model group, neurological deficit symptoms of rats in sophoridine group were improved, cerebral infarction rate was significantly reduced ($P < 0.05, 0.01$), cell apoptosis rate in ischemic penumbra was significantly reduced ($P < 0.05, 0.01$), tissue damage was improved, expressions of Caspase-3 and Bax in brain tissue were significantly reduced ($P < 0.05, 0.01$), and Bcl-2 expression was significantly increased ($P < 0.05, 0.01$). **Conclusion** Sophoridine has a protective effect on brain cells in pMCAO rats, its mechanism may be related to up-regulation of Bcl-2 and down-regulation of Bax and Caspase-3 expressions, thereby inhibiting cell apoptosis.

Key words: sophoridine; permanent middle cerebral artery occlusion; cerebral cell apoptosis; Bcl-2; Bax; Caspase-3

收稿日期: 2021-01-12

基金项目: 石家庄市科学技术研究与发展指导计划项目(161460713)

作者简介: 薛玉梅, 女, 主治医师, 从事脑血管疾病基础与临床研究。E-mail: 3165078182@qq.com

*通信作者: 李晓兵, 男, 副主任药师, 从事心脑血管药理学研究。Tel: (0311)86907320 E-mail: 963685787@qq.com

脑梗死是临床中常见的脑血管疾病,组织缺血缺氧导致坏死或软化,严重危害人类的生命。细胞凋亡是脑梗死引起神经损伤的重要机制之一,缺血缺氧下凋亡相关信号通路激活,引起神经细胞凋亡,脑梗死灶体积和神经功能缺损严重程度与细胞凋亡程度呈正相关^[1]。槐定碱是从豆科槐属植物苦豆子 *Sophora alopecuroides* L.中提取分离的单体生物碱,具有抑制炎症因子分泌、抗氧化、抗癌、保护心脑血管等作用^[2-3]。槐定碱能够通过下调肿瘤坏死因子受体相关因子6 (tumor necrosis factor receptor associated factor6, TRAF6)、上调磷酸化细胞外信号调节激酶 1/2 (extracellular regulated kinase 1/2, p-ERK1/2) 表达,从而减轻大鼠脑损伤和脑水肿程度^[4]。本课题组前期研究表明,槐定碱能够抑制氧化应激和炎症反应,对局灶性脑缺血大鼠具有神经保护作用^[5]。本研究探究槐定碱对永久性大脑中动脉栓塞 (permanent middle cerebral artery occlusion, pMCAO) 大鼠脑细胞凋亡的影响,为槐定碱的临床应用提供依据。

1 材料

1.1 动物

清洁级 SD 大鼠 70 只,雌雄各半,8 周龄,体质量 240~275 g,购自宁夏医科大学实验动物中心,动物许可证号 SYXK (宁) 20100001。动物于温度 (24±1) °C、湿度 50%~70% 的环境中适应性饲养 1 周,自由进食饮水。动物实验经石家庄市人民医院伦理委员会批准 (批准号 2016017)。

1.2 药品与试剂

槐定碱 (质量分数 >98%, 批号 960324) 购自宁夏药物研究所; BCA 蛋白定量试剂盒、Annexin V-FITC/碘化丙啶 (PI) 细胞凋亡检测试剂盒购自江苏凯基生物技术股份有限公司; 2,3,5-氯化三苯基四氮唑 (TTC) 溶液 (批号 T8170) 购自北京索莱宝科技有限公司; 兔源 B 淋巴细胞瘤 2 (B-cell lymphoma 2, Bcl-2) 抗体 (批号 sc-492) 购自美国 Santa Cruz 公司; 兔源 Bcl-2 相关 X 蛋白 (Bcl-2 associated X protein, Bax) 抗体 (批号 2772s)、兔源半胱氨酸蛋白酶-3 (Caspase-3) 抗体 (批号 9662s)、 β -actin 抗体 (批号 4970s)、HRP 标记的山羊抗兔抗体购自美国 CST 公司。

1.3 仪器

PAC 1000 电泳仪、FACSCanto 流式细胞仪、GelDoc XR+凝胶成像仪 (美国 Bio-Rad 公司); TS-8S 型双层脱色摇床 (海门市其林贝尔仪器制造

有限公司); JY92-IIID 型超声波细胞破碎机 (南京贝帝实验仪器有限公司)。

2 方法

2.1 分组与给药

SD 大鼠随机分为对照组、模型组及槐定碱低、中、高剂量 (2.5、5.0、10.0 mg/kg) 组^[4], 每组 14 只。槐定碱溶于 0.9% 氯化钠溶液, 分别配制成质量浓度为 2.5、5.0、10.0 mg/mL 的溶液。各给药组 ip 相应溶液 (1 mL/kg), 对照组和模型组 ip 等体积 0.9% 氯化钠溶液, 1 次/d, 连续 5 d。末次给药后, 模型组和各给药组立即制备 pMCAO 模型。

2.2 pMCAO 模型的制备

采用 Longa 改良线栓法^[6]建立大鼠 pMCAO 模型, 大鼠 ip 20% 乌拉坦 (6 mL/kg) 麻醉后, 于颈部正中切口并进行动脉分离, 结扎右侧颈总动脉近心端, 在颈内动脉下方穿线备用; 在右侧颈总动脉距离分叉约 4 mm 处剪口, 将栓线经过颈内动脉插入大脑中动脉起始端 (栓线最远端距分叉处 18~20 mm), 阻断大脑中动脉供血; 结扎颈内动脉固定栓线, 记录时间作为大鼠局灶性缺血开始的时间, 线栓阻断血流 24 h。对照组仅进行动脉分离, 不插线。

2.3 槐定碱对 pMCAO 大鼠神经功能评分的影响

术后大鼠进行神经行为症状评分, 判定神经功能损伤程度^[6]。评分标准: 0 分为大鼠无神经功能缺失症状; 1 分为大鼠梗死对侧前爪内收、不能伸展对侧前肢; 2 分为大鼠前肢屈曲对侧抵抗推力下降, 行走时向偏瘫侧旋转; 3 分为大鼠行走时向偏瘫侧倾倒; 4 分为大鼠不能自发行走, 意识丧失。

2.4 槐定碱对 pMCAO 大鼠脑梗死率的影响

术后各组随机选取 5 只大鼠, 断头处死, 取脑, 去掉嗅球、小脑和低位脑干, 以 2 mm 为间隔行脑组织冠状切片, 于 2% TTC 染液中避光孵育 30 min, 于 4% 多聚甲醛溶液中固定 1 h, 拍照并观察梗死情况, 红色区域为正常脑组织, 白色区域为梗死病变的脑组织, 采用 Image J 软件计算脑梗死率^[7]。

脑梗死率 = 脑梗死体积 / 全脑体积

2.5 槐定碱对 pMCAO 大鼠缺血半暗带区细胞凋亡的影响

大鼠 ip 20% 乌拉坦麻醉, 打开胸腔, 用 200 mL 4% 多聚甲醛进行心脏灌注。大鼠断头处死, 取 60 mg 大脑缺血半暗带区组织, 即右侧大脑半球距离嗅球尖端 7~11 mm 额顶皮质上部, 制成单细胞悬液, 调整细胞密度至 $1 \times 10^6/L$, 2000 r/min 离心 5 min,

弃上清, 细胞沉淀加入 5 μL Annexin V-FITC 和 PI, 避光孵育, 再加入 490 μL 1×Binding Buffer, 采用流式细胞仪于 1 h 内检测细胞凋亡情况^[8]。

2.6 槐定碱对 pMCAO 大鼠脑组织病理变化的影响

大鼠断头取脑, 取缺血部位脑组织, 于 4% 多聚甲醛溶液中固定, 梯度乙醇脱水、无水乙醇及二甲苯透明、浸蜡、石蜡包埋后切片 (厚 5 μm), 冠状切片贴于载玻片上, 于 4 °C 保存; 石蜡切片经脱蜡、染色、脱水、透明后, 中性树脂封片, 于显微镜下观察脑组织病理变化。

2.7 槐定碱对 pMCAO 大鼠脑组织 Bcl-2、Bax 和 Caspase-3 蛋白表达的影响

取大鼠缺血部位脑组织, 于液氮中研碎, 加入裂解液提取总蛋白, 采用 BCA 蛋白定量试剂盒测定蛋白质量浓度, 蛋白样品经十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳, 转至 PVDF 膜, 于 5% 脱脂牛奶室温封闭 2 h, 分别加入 Bcl-2、Bax、Caspase-3 和 β-actin 抗体 (1 : 1000), 4 °C 孵育过夜; 加入 HRP 标记的山羊抗兔抗体室温孵育 2 h, 加入 ECL 试剂显影, 采用 Quantity One 软件分析。

2.8 统计学处理

数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 采用 SPSS 22.0 软件进行统计分析, 多组间均数比较采用单因素方差分析 (One-way ANOVA), 两两之间比较采用最小显著差数法。

3 结果

3.1 槐定碱对 pMCAO 大鼠神经功能评分的影响

如表 1 所示, 对照组大鼠神经功能正常, 模型组大鼠出现缺血对侧前肢不能伸直、转圈等不同程度的神经缺陷症状。与模型组相比, 各给药组大鼠神经缺陷症状得到改善。

3.2 槐定碱对 pMCAO 大鼠脑梗死率的影响

如图 1 所示, 与对照组比较, 模型组大鼠脑梗死率显著升高 ($P < 0.01$); 与模型组比较, 槐定碱中、高剂量组大鼠脑梗死率显著降低 ($P < 0.05$ 、 0.01)。

3.3 槐定碱对 pMCAO 大鼠缺血半暗带区细胞凋亡的影响

如图 2 所示, 与对照组比较, 模型组大鼠缺血半暗带细胞凋亡率明显升高 ($P < 0.01$); 与模型组比较, 各给药组大鼠缺血半暗带细胞凋亡率明显降低 ($P < 0.05$ 、 0.01)。

表 1 槐定碱对 pMCAO 大鼠神经功能评分的影响 ($\bar{x} \pm s, n = 14$)

Table 1 Effect of sophoridine on neurological score in pMCAO rats ($\bar{x} \pm s, n = 14$)

组别	剂量/(mg·kg ⁻¹)	神经功能评分				
		0分	1分	2分	3分	4分
对照	—	14	0	0	0	0
模型	—	0	0	3	8	3
槐定碱	2.5	0	1	6	7	0
	5.0	0	1	9	4	0
	10.0	0	3	9	2	0

与对照组比较: ## $P < 0.01$; 与模型组比较: * $P < 0.05$ ** $P < 0.01$, 下同
$P < 0.01$ vs control group; * $P < 0.05$ ** $P < 0.01$ vs model group, same as belows

图 1 槐定碱对 pMCAO 大鼠脑梗死率的影响 ($\bar{x} \pm s, n = 5$)

Fig. 1 Effect of sophoridine on cerebral infarction rate in pMCAO rats ($\bar{x} \pm s, n = 5$)

图2 槐定碱对 pMCAO 大鼠缺血半暗带区细胞凋亡的影响 ($\bar{x} \pm s, n = 9$)

Fig. 2 Effect of sophoridine on apoptosis of ischemic penumbra in pMCAO rats ($\bar{x} \pm s, n = 9$)

3.4 槐定碱对 pMCAO 大鼠脑组织病理变化的影响

如图 3 所示, 对照组大鼠大脑皮质结构完整, 神经细胞排列及形态正常, 胞膜完整, 胞质丰富, 核仁清楚; 模型组大鼠大脑皮质广泛水肿, 细胞排列紊乱, 胞质空泡样变, 部分核固缩, 核仁消失, 神经元数目明显减少, 间质血管扩张充血, 炎性细胞浸润; 与模型组相比, 各给药组大鼠脑组织水肿减轻, 神经细胞形态有所改善, 核固缩和核溶解程

度减轻, 细胞凋亡与坏死减少, 神经元数目增加。

3.5 槐定碱对大鼠 pMCAO 脑组织 Bcl-2、Bax 和 Caspase-3 蛋白表达的影响

如图 4 所示, 与对照组比较, 模型组大鼠脑组织 Bcl-2 蛋白表达水平显著降低 ($P < 0.01$), Bax 和 Caspase-3 蛋白表达水平显著升高 ($P < 0.01$); 与模型组比较, 各给药组大鼠脑组织 Bcl-2 蛋白表达水平显著升高 ($P < 0.05, 0.01$), Bax 蛋白表达水平

图3 槐定碱对 pMCAO 大鼠脑组织病理变化的影响

Fig. 3 Effect of sophoridine on pathological changes of brain tissue in pMCAO rats

图4 槐定碱对 pMCAO 大鼠脑组织 Bcl-2、Bax 和 Caspase-3 蛋白表达的影响 ($\bar{x} \pm s, n = 9$)

Fig. 4 Effect of sophoridine on expressions of Bcl-2, Bax, and Caspase-3 in brain tissue of pMCAO rats ($\bar{x} \pm s, n = 9$)

显著降低 ($P < 0.05$ 、 0.01), 槐定碱中、高剂量组 Caspase-3 蛋白表达水平显著降低 ($P < 0.01$)。

4 讨论

缺血性脑卒中是临床上常见且多发的疾病, 其病理过程涉及脑组织能量代谢障碍、神经细胞内钙超载、氧化应激损伤、炎症反应、细胞凋亡等多个环节, 其中神经细胞凋亡是脑缺血损伤的重要环节^[9]。脑细胞缺血缺氧后, 脑梗死区域与正常脑组织间存在以细胞凋亡为主的缺血半暗带区, 通过调节该区域神经细胞的凋亡, 能够有效减少神经细胞坏死数量和梗死区域面积, 减轻神经功能损伤^[10]。因此, 及时、有效地阻止脑缺血后神经细胞凋亡, 对减轻脑缺血损伤尤为重要。研究发现, 中药能够通过调节线粒体凋亡途径抑制细胞凋亡, 从而发挥脑神经保护作用^[11]。课题组前期研究发现, 槐定碱对局灶性脑缺血大鼠模型具有神经保护作用。

Bcl-2 家族蛋白在线粒体介导的细胞凋亡中发挥着关键性作用, 能够通过控制线粒体膜的通透性, 影响凋亡相关因子的释放, 进而调控细胞凋亡^[12]。由线粒体释放的细胞色素 C (cytochrome C, CytC) 与凋亡蛋白酶激活因子-1 (apoptotic protease activating factor 1, Apaf-1) 结合形成凋亡小体, 进而促进 Caspase 前体活化, 启动 Caspase 级联反应^[13]。Caspase 家族是细胞凋亡的效应器, 能够引发细胞骨架重排、DNA 断裂等细胞生化和形态学的改变, Caspase-3 是 Caspase 级联反应下游最关键的凋亡执行蛋白酶, Caspase-3 的活化可引起细胞凋亡^[14]。Bax 为促凋亡蛋白, 能够增加线粒体外膜通透性, 促进凋亡相关因子的释放; Bcl-2 为抗凋亡蛋白, 通过与 Bax 形成异源二聚体, 抑制 Bax 的促凋亡作用^[15]。研究发现, 急性脑梗死患者血清中 Bcl-2 表达明显下降^[12]。Bcl-2 与 Bax 之间的平衡维持着细胞凋亡的稳态, 脑缺血后 Bcl-2/Bax 下降, Caspase-3 被激活, 进而导致凋亡的发生^[16]。

本研究结果显示, 脑缺血 24 h 后大鼠神经功能缺陷症状明显且细胞凋亡率显著增加, 槐定碱能够明显改善 pMCAO 大鼠的神经功能症状, 减小脑梗死率, 降低缺血半暗带处细胞的凋亡率, 减轻 pMCAO 大鼠病理性损伤, 维持细胞的正常形态, 抑制神经细胞凋亡和坏死。大鼠局灶性脑缺血后神经细胞的死亡可能与 Bcl-2、Bax 和 Caspase-3 凋亡途径的激活有关, 本研究发现, 槐定碱能够抑制 pMCAO 大鼠脑组织 Bax 的上调和 Bcl-2 的下调,

维持 Bcl-2 与 Bax 之间的平衡, 从而抑制 Caspase-3 的上调, 从而抑制脑缺血后神经细胞凋亡。

综上, 槐定碱能够通过改善脑细胞凋亡情况、减轻 pMCAO 大鼠神经损伤程度, 从而发挥神经保护作用。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

- [1] 张海燕, 杨磊. 脑梗死患者 MRI 病灶体积与神经损害、氧化应激反应、细胞凋亡程度的相关性 [J]. 海南医学院学报, 2018, 24(3): 405-408.
- [2] 抗晶晶, 刘晓宁. 槐定碱和氧化槐定碱对心脑血管疾病药理作用的研究进展 [J]. 药物评价研究, 2019, 42(4): 794-798.
- [3] Ur Rashid H, Rasool S, Ali Y, et al. Anti-cancer potential of sophoridine and its derivatives: Recent progress and future perspectives [J]. *Bioorg Chem*, 2020, 99: 103863.
- [4] Liu Z J, He D, Zhang X J, et al. Neuroprotective effect of early and short-time applying sophoridine in pMCAO rat brain: Down-regulated TRAF6 and up-regulated p-ERK1/2 expression, ameliorated brain infarction and edema [J]. *Brain Res Bull*, 2012, 88(4): 379-384.
- [5] 薛玉梅, 李晓兵, 薛占苍, 等. 槐定碱对大鼠局灶性脑缺血损伤的保护作用 [J]. 中国临床药理学杂志, 2020, 36(15): 2250-2253.
- [6] Longa E Z, Weinstein P R, Carlson S, et al. Reversible middle cerebral artery occlusion without craniectomy in rats [J]. *Stroke*, 1989, 20(1): 84-91.
- [7] Nematipour S, Vahidinia Z, Nejati M, et al. Estrogen and progesterone attenuate glutamate neurotoxicity via regulation of EAAT3 and GLT-1 in a rat model of ischemic stroke [J]. *Iran J Basic Med Sci*, 2020, 23(10): 1346-1352.
- [8] 朱红灿, 孙圣刚, 李红戈, 等. 3-硝基丙酸预处理对大鼠局灶性脑缺血 caspase-3 活性和神经细胞凋亡的影响 [J]. 中华老年医学杂志, 2004, 23(5): 328-331.
- [9] 刘小军, 吴开毅, 刘南午, 等. 巴曲酶注射液联合丁苯酞注射液治疗急性进展性脑梗死的临床研究 [J]. 中国临床药理学杂志, 2018, 34(15): 1751-1754.
- [10] Saito T, Hayashi K, Nakazawa H, et al. Clinical characteristics and lesions responsible for swallowing hesitation after acute cerebral infarction [J]. *Dysphagia*, 2016, 31(4): 567-573.
- [11] 魏霞, 祝清芬, 王海莘, 等. 珍龙醒脑胶囊对大鼠局灶性脑缺血再灌注损伤的保护作用 [J]. 中草药, 2015, 46(12): 1791-1796.
- [12] Cheng C Y, Tang N Y, Kao S T, et al. Ferulic acid administered at various time points protects against

- cerebral infarction by activating p38 MAPK/p90RSK/CREB/bcl-2 anti-apoptotic signaling in the subacute phase of cerebral ischemia-reperfusion injury in rats [J]. *PLoS One*, 2016, 11(5): e0155748.
- [13] 张红艳, 翟丽, 王婷婷, 等. 胡黄连苷 II 通过抑制 cyto C/caspase-9/caspase-3 通路发挥神经保护作用 [J]. 中国药理学通报, 2017, 33(5): 668-674.
- [14] 应夏丽, 钟晓明, 徐慕蝶, 等. 哈巴苷对急性脑缺血小鼠神经保护作用及线粒体保护机制的研究 [J]. 中国药
- 学杂志, 2015, 50(12): 1026-1031.
- [15] 蔡静, 黄文静, 刘时喜, 等. 基于 TGF- β 1/Smad3 信号探讨红景天苷对缺血性脑卒中大鼠的神经保护作用机制 [J]. 中草药, 2020, 51(24): 6294-6301.
- [16] Aboutaleb N, Shamsaei N, Khaksari M, *et al.* Pre-ischemic exercise reduces apoptosis in hippocampal CA3 cells after cerebral ischemia by modulation of the Bax/Bcl-2 proteins ratio and prevention of caspase-3 activation [J]. *J Physiol Sci*, 2015, 65(5): 435-443.

[责任编辑 李亚楠]